

COMMENTARII
DE REBUS
IN
SCIENTIA NATVRALI
ET
MEDICINA
GESTIS.



VOLVMINIS XVIII. PARS III.

LIPSIAE. MDCCLXXIII.

PVD IOH. FRIDERICVM GLEDITSCH.

Venduntur etiam

Amstelodami apud I. Schreuder, Londini apud Io. Nourse, Parisiis apud
Briasson, Venetiis apud I. B. Pascali, Patavii apud Io. Manfrè,
Holmiae apud L. Saluium.

COMMUNION
OF THE

MEMBERS OF THE

CHURCH



OF THE

MEMBERS OF THE
CHURCH
OF THE



I.

Medical Observations and Inquiries by a Society of Physicians in London. Vol. IV. London printed for T. Cadell MDCCLXXI. 8. mai. alph. 1. pl. 6. Tab. aen. 4.

h. e.

Observationes et disquisitiones medicae, a Societate medicorum Londinensium editae Vol. IV.

Societas medicorum Londinensium ex collectis hucusque observationibus novum tradit volumen, et in posterum lubenter accipiet disquisitiones medicas. Monet vero, nihil cum ea communicare debere Auctores, quod in aliis collectionibus iam impressum est. Observationes de cicuta, quas Cl. W A D E Vlyssiponensis promiserat, nondum ei traditae sunt.

I.) *De morbo singulari cruris observatio*, Auctore p. I. Cl. BALFOUR Chirurg. Edinburg. ex literis D. HOPE ad GUILLIELMUM WATSON transmissis. *) Puella sex annorum sana, sed tenerioris corporis habitus, mense martio 1767 sub genu in eminenti tibiae percutiebatur. Primis diebus parum incom-

B b 2

com-

*) lect. d. 18. Aprilis 1768.

commodi inde percipiebat; postea autem, tumore nuncis magnitudine excrecente, dolor augebatur. Et si vero cataplasmata emollientia externe applicabantur, et interne pulvis cum aethiope minerali, et singulis hebdomatibus lene laxans sennatum, pro potu autem ordinario infusum sassafras propinabatur; tumor tamen mense maio et junio, sine cutis mutatione, lente increfcebat. Julio vero, tumore valde increfcente, dolor quoque augebatur, venis varicosis nunc in cute conspicuis, aegra vero interea lenta febre corripiebatur. Sub initium augusti tumor, in magnitudinem capitis infantilis auctus, passim tactu mollior, passim durior erat: incisione tunc in parte inferiori facta, non nisi sanguiuolentus ichor effluebat, vulnere mox liuido facto. Tandem amputatio cruris super genu suscipiebatur; aegra autem, vix in lectulum reposita, vomitu corripiebatur, laudano vix compescendo, et versuss vesperam moriebatur. Tumor ambitum viginti quatuor pollicum referebat, et, spongiae instar, in cellulis coagulatum sanguinem continebat, tibia & fibula ad superiorem et inferiorem articulationem usque massa coagulata ex sanguine et muco impletae erant, vestigiis ossis et muscutorum vix vllis.

P. 7.

2) *Tentamina super analysin et virtutes aquae Selteranae, instituta a RICHARDO BROCKLESBY Societ. Reg. et Coll. Med. Socio.* *) Defitu fontis et analysi chemica nonnulla praemittit, quae ratione originis satis cognita, repetere nolimus; ea vero, quae, de analysi copiose proponuntur, ideo non recensemus, quoniam non ad fontem ea instituta est: sufficiet igitur, quaedam ex observationibus de viribus annotare.

Femi-

*) lect. d. 5. Iulii 1768.

Feminae, in febrim hecticam iam procliui, p. 25.
tussi molesta continua, sudoribus nocturnis, aliis-
que symptomatibus vexatae, quae insuper aliquo-
ties calcaream materiam ex pulmonibus excreuerat,
mederi voluit Noster, cum diaetam inprimis lacte-
am et vegetabilem recte ordinaret, infusum corticis
Peruiani in aqua fluuiatili pro potu ordinario ex-
hiberet, spermatis ceti particulam et aliquot guttas
tincturae ipecacuanhae vinosae, ad excretionem ex
glandulis pulmonum iuuandam, adderet. Sed aegra
ne minimam quidem dosin huius medicamenti
ferebat: alium itaque medendi modum elegit Cl.
Auctor. Lac asininum bis de die, aquas Selteranas
pro potu ordinario ita tamen exhibuit, vt cuili-
bet vitro triginta, vel quadraginta guttas elixirii
vitrioli dulcis instillaret. Hac methodo cum fructu
usa est aegra; cum vero potum aquarum Seltera-
narum negligeret, calor hecticus et reliqua
symptomata redierunt, donec usu harum aquarum,
per aliquot menses continuato, ita conualesceret,
vt per plures annos sine incommodo viueret.

Femina, leuiori febre inflammatoria, paulo post, p. 28.
excretionem larga cutanea, vesiculari debilitata, nec
corticis Peruiani, nec aliorum remediorum usu, a
debilitate et lenta febre liberari poterat, donec usu
continuato aquae Selteranae penitus instauraretur.
Cum ab initio, ob nauseam tincturae ipecacuanhae
vinosae vnciam semis cum grano semis tartari eme-
tici propinauerit: Noster monet, moderatum ho-
rum medicamentorum antimonialium usum, sine
effectu vomitus, inprimis si salia media addantur,
in initiis febrium acutarum maxime conuenire.
In nostra femina largam diaphoresin excitauit, et
aliquot deiectiones alvinas. Copiosam miliarium
eruptionem regimine temperato subfrigido exce-
pit, cum, criticam eam non esse, intellexerit.

p. 34. Femina ex decubitu ad fauces viscido, mucoso, diu laborans, cum appetitus ciborum plenaria prostratione, variis medicamentis incassum tentatis, tandem, post excretiones largas, usu diuturno aquarum Selteranarum, conualuit. Concludit itaque Noster, non solum sub finem, sed etiam in vario progressu morborum acutorum et chronicorum usum harum aquarum tentari posse.

p. 40. 3) *Annotationes de hydrocephalo interno*, Auctore Cl. IOH. FOTHERGILL. Reg. societ. socio*) Ea, quae de hoc morbo hucusque obseruauerat Cl. Auctor, studiose cum iis contulit, quae Cl. WHYT propofuerat. Ipse vero cognouit, hunc morbum raro accidere ante tertium annum, vt plurimum inter quintum et decimum, raro tardius. Quemadmodum vero in ea aetate, et morbi vermiformi, et dentitio, molesta saepe symptomata excitant: sic etiam hydrocephalus internus, siue extravasatio aquae in ventriculos cerebri, iisdem se immiscet, et ab initio obscuris symptomatibus se prodit, donec, grauioribus obortis, miseri sine auxilio pereant.

p. 45. Cum vero varietas horum symptomatum medicum disquirentem vehementer confundat, Cl. Auctor in iis iudicandis maxima cum cura versatur, cephalalgia tamen, et dolor crurum praecipua videntur. His accedit somnus brevis, turbatus, pulsus irregularis, palpebrae oculorum distentae, vt albuginea

p. 50. tunica solito magis appareat. Ratione methodi medendi, ab initio, et cum symptomata leuiora sunt, Noster similem semper, quam vermibus infantum adhibemus, curam elegit; quae vero nulla est, nisi omnes secretiones blande conseruentur, in tam nobili parte tamen resorptio difficulter fit. Lecta hac tractatione, Cl. HUCK commemorauit quaedam exempla hydrocephali interni.

4) *Rela-*

*) lect. d. 18. August. 1768.

4) *Relatio de ruptura vesicae, ex suppressione urinae in grauida*, communicata a Cl. HEY Chirurgo, Cl. GUILLIELMO HUNTER. *) p. 58. Femina triginta octo annorum, primipara, difficili partu per aliquot dies agitata, infantern mortuum tandem enixa est. Etsi vero interea alius libera erat, et parum vrinae excernebatur; imus venter tamen valde intumuit, variis symptomatibus, quae illo morbo propria sunt, intercurrentibus. Venaesectio, eaque repetita, levamen aliquod, sed breue attulit; lenia laxantia alium satis mouerunt, aegra tamen, die nono post partum editum, mortua est. In sectione cadaueris magna copia aquae reperiiebatur, quae vrinam redolebat, et in superiori parte vesicae foramen, digitum admittens, inventum est, cuius ora subnigra erant, vesica de reliquo sana inuenta. Vterus et reliquae partes abdominales a sano statu parum recedebant.

5) *De cura morbi ischiadici*. Auctore Cl. ION. FOTHERGILL, *) p. 69. Vir quadragenarius ex lumbagine, non satis discussa, morbo ischiadico ita afficiebatur, vt, sine summo dolore, nec se ipsum mouere, nec ab aliis moueri posset: lectulo igitur semper affixus, opii dosibus haud exiguis sumtis, dolorem tamen parum temperabat. Noster ei calomel cum terebinthina, in pilulas reductum, ad granum vnum vespere propinabat, alio matutino tempore, si opus erat, leni purgante mota. Auxit postea dosin ad duo et tria grana, tandem ad sex, tria vespere, tria mane, sic tandem, sine saluatione succedente, dolor discussus, et aeger ad liberum motum idoneus redditus est. Cum vires mercurii, mixtione mercurii cum terebenthina, infringi viderentur, in similibus ischiadicis affectionibus sequenti medicamento forma cum fructu vsus est. Rec. Calomel
Bb 4 leui-

*) lecta die eodem.

**) lecta d. 22. Aug. 1768.

leuigatum gr. X. conferua rofar. q. f. f. Pil. X. capiat
vnam omni nocte, superbibendo haustum seq. Recc.
aquae alexit. simpl. vnciam vnam semis, spirituofae
drachmam vnam semis, vini antimoniatu gt. XXX.
tincturae theb. gt. XXV. syrup. commun. drachmam
vnam, misce. In continuata cura dosin calomel
ad aliquot grana auget; antimoniatum vero et opia-
tum medicamentum minuit, dolore non nihil cef-
fante. Etsi vero interdum salua mouetur, regimi-
ne tamen apto facile cessat.

p. 78. 6) *Obferuatio de hydrocephalo interno.* Auctore
Cl. GUILLIEMO WATSON. *) Puella sex annor-
um, vagis febris accessionibus debilitata, de dolore
capitis potissimum conquerebatur, lucemque ferre
non poterat. Ea vero, ante nouem menses in ter-
ram delapsa, caput vehementer concusserat, sine vllis
tamen subsequenter incommodis; symptomatibus
vero abortis, anthelminticis medicamentis vfa erat,
sed sine fructu. Noster accersitus in hydrocephalo
interno causam morbi positam esse perhibuit, et
recte quidem; postquam enim die sexto, sine vero
auxilio conuulsa periit, sectione instituta, inter cal-
uam et membranas nullae aquae, sed in ventriculis
quinque vnciae, et in quarto ad minimum vncia semis
aquae pellucidae deprehensae sunt. Etsi vero in
hac puella causa in capitis percussione posita esse
videtur; refert tamen Noster, in aliis duabus puellis
nouem et quatuordecim annorum, idem, sine vlla
capitis contusione, euenisse. Hydrocephalus igitur
internus iunioribus magis, quam adultis infensus est,
et, nisi forte sub initium per laxantia et diuretica
medicamenta resorptio, vt in aliis hydropis specie-
bus, iuuari potest, haec, aucta internarum tenerri-
marum membranarum distensione, nunquam succedit,
sed morbus sine vlllo auxilio letalis fit.

*) lect. d. eodem.

7) *Relatio de spasmo maxillae et opisthono, ad p. 89.*
ditis quibusdam observationibus de usu cicutae inter-
no. Auctore Cl. GUILIELMO FURR, Chirurg.
 Plymutensi, communicata a Cl. WATSON *) Opium,
 vt optimum auxilium spasmi maxillae, commendatum
 quidem est; Noster autem arbitratur, non semper in
 ea dosi, quae requiritur, sed in minori semper dari,
 quam rem obseruatione sequenti illustrat. Vir vi-
 ginti sex annorum, non solum tussi et dolore pecto-
 ris laborabat, sed spasmus maxillae, cum rigiditate
 extremitatum, morbum augebant. His succedebant
 spasmus cynicus, rigiditas ceruicis, spinae dorsi et
 extremitatum inferiorum; abdomen contractum
 erat, hi vero spasmi, qui per minuta quinque ho-
 rae durabant, decies et vltra quotidie recurrebant,
 leni tandem sudore finiti. Post euacuationes pri-
 marum viarum, sperma ceti cum sale cornu cerui,
 et tincturae thebaicae guttis decem, praeterea pro
 potu ordinario decoctum pectorale, exhibebantur.

Sic morbus a iunii primo die usque ad septi- p. 93.
 mum increuerat; octauo autem, spasmis cum sudo-
 re frigido auctis, maiores opii doses, granum nimi-
 rum vnum omni hora, cum confectione cardiaca
 mixtum, propinabat, ita, vt versus vesperam nonae
 diei quatuordecim grana cum aliquo symptomatum
 leuamine sumisset. Balnea itaque calida, emulsio-
 nes, et omni bihorio vnum opii granum non sine
 fructu adhibebat. Interea tamen aluus obstructa,
 et retentio urinae morbum grauiorem reddebant.
 Cum moschum, opio iunctum, in aliis aegris inca-
 sum exhibuerat Noster, camphorae gr. V. assae foetid.
 gr. iij. praeterea opii gr. iij. et balneum calidum
 vespere ordinauit. Cum autem cura non recte suc-
 cederet, opii dosibus continuatis et auctis, eam susti-
 nuit.

B b 5

*) lect. d. 17. Octobr. 1768.

nuit. Die 14. iunii gr. XX. et similem dosin d. 15. die autem 16. gr. XXVI. d. 17. et 18. gr. XXII. d. 19. vsque ad 25. singulis diebus gr. XIV. d. 26 et 27. gr. XXVIII. exhibuit. Datum simul est iulapium, cum camphora et aceto, et alia medicamenta. Sic sensim, consopitis symptomatibus, opii dosin imminuit Noster, et, cum a die iunii 28. ad 30. opii gr. XXXVI. exhibuisset, tandem a 1. ad 6. iulii, gr. VI. quotidie, et postea ad 21. iul. vsque gr. iij. vespere propinauit.

Mirum uidetur Cl. Auctori, aegrum tribus circiter hebdomatibus, numerando gr. XIV. per diem, ultra quinque drachmas opii sine vlllo stupore et dolore capitis fuisse: et nos magis miramur, qui profundum somnum ex gr. ij. et ab duabus circiter unciiis laudani liquidi SYDENHAMI, intra aliquot hebdomadas omni vesperi ad somnum conciliandum, viginti ad triginta guttas inscio medico hauistis, somnum et stuporem letalem vidimus. Monet tamen Noster, veram opii dosin, in eiusmodi spasticis affectionibus, non nisi ex effectu definiri posse. Etsi vero epistotonus non rediit, tussis tamen, et reiectio materiae ex pectore, aliaque symptomata aegrum nostrum in nosodochio retinuerant.

p. 104. Observationes de effectu cicutae nunc commemorandae sunt. Vir, tussi vehementi et febre tertiana affectus, in anasarcam et ascitem incidit, et, cum aquae paracentesi bis subducerentur, tumor hepatis et lienis abunde apparebat. Rebus sic se habentibus, vsum corticis Peruuiani neglexit, et primis viis satis purgatis, abdomini decoctum saturatum cicutae, vt fomentum, et paulo post emplastrum e cicuta et gummi ammoniaco applicauit; extractum autem cicutae bis de die, primum ad scrupulum vnum, postea drachmani semis exhibuit, et intra tres hebdomadas maximum auxilium percepit. Sequenti tamen

tamen anno, aeger demum ex nosodochio vegetus dimissus est, et subsequenti etiam anno, praeter consuetum abdominis tumorem, nulla incommoda sensit. Tumores scrophulosos parvis et continuatis cicutae dosibus ad scrupulum semis subinde discussit; in cancro autem non nisi apparens et breue auxilium percepit.

8) *Hemiplegiam, singularibus symptomatibus stipatam*, descripsit Collegii Socius. *) Femina sexaginta octo annorum, paralyti dextri lateris affecta, ab initio optimis medicamentis usa est, sed sine fructu: ideoque illa ab omni medicina externa et interna abstinuit. Appetitus ciborum tum auctior erat, quam antea in statu sano fuerat, et digestio etiam bona. Urina inuoluntaria succedebat, obstructio alvina pertinacissima, quae, cum aegra auxilia vera recusaret, purgantibus clanculum cum potu exhibitis, interdum leuabatur.

9) *De paracentesi in hydropicis tempestive admissanda*, Auctore Cl. FOTHERGILL **) Multae sunt et efficaces medicinae, quae, aucto morbo, sine fructu applicantur, cum citius exhibitae salutares fuissent. Inter operationes chirurgicas paracentesis, quam timor aegrorum saepe iusto longius differt, eodem modo considerata est. Si in ascite imminente diuretica nullum effectum edunt, et purgantia fortiora crebrius exhibita, systema partium solidarum nimis debilitant, ab iis omnino desistendum est, cardiacis solis et sufficiente potu exhibitis, usque dum ea plenitudo aquae adsit, quae paracentesin admittit: qua facta, roborantia et cardia-

ca

*) lect. d. 31. Octobr. 1768.

**) lect. d. 14. Novembr. 1768.

ea excretionem vrinae saepe sustinent. Hanc rem variis obseruationibus illustrat Cl. Auctor, et de scarificatione in anasarca monet, eam tutius et melius instrumento consueto, quam largioribus incisionibus fieri: in his enim nimis cito effluit aqua, et vulnera in cute, per anasarcam extensa, difficilius curantur. In hac tamen scarificatione non opus est cucurbitulas cum multa flamma applicare; si enim non satis profunda efficiat vulnuscule, lanceola quodammodo dilatari possunt.

p. 123. 10) *De obstructione aluina difficillima ex fecum duritie.* *) De quibusdam aegris refert, qui, scybalis induratis, et in intestino recto, et paulo altius haerentibus, dolores et tenesmos vehementer perceperunt, etsi interdum et tenues feces per diarrhoeam quasi excreuerint. His mechanica opera succurrendum erat, ita, vt concretiones durae, tandem in partes diuisae, secederent. Causam huius morbi in nimium corticis Peruuiani vsum coniicit, neglectis interea lenioribus laxantibus; monet enim, puluerem hunc non digeri, sed in successiuo transitu per canalem intestinorum, in massas irresolubiles cogi, vi motus peristaltici non expellendas.

p. 132. 11) *Relatio de putridis morbillis, Londini 1763 et 1768. obseruatis, Auctore Cl. GUILIELMO WATSON* **) Morbillos ad exanthematicos benignos morbos referri in aperto est; si tamen epidemici fiunt, non raro malignitatem acquirunt, quod et aliorum et sua declarat experientia. Oculi tunc lacryman-
tes et inflammati, tussis vehemens cum debilitate vniuersali; febre aucta morbilli celerius erumpunt,
sym-

*) lecta die eodem.

**) lect. d. 9. Ianuarii 1769.

symptomata tamen persistunt, et respiratio difficilis sine expectoratione succedit; cutis sicca, fauces profunde rubicundo colore conspicuae, lingua sordida, pulsus celer, vix plenus, inflammatoria symptomata continuant. Haec in primo stadio eueniunt; in altero, febre remittente, symptomata tamen perdurant cum magna anxietate, pulsus celer, debilis et irregularis, deiectiones aluinae crebriores, deliria tandem accedentia mortem praenuntiant. In disquisitione cadauerum apparebat, sphacelum varias partes occupasse, inprimis pulmones, in quibus ater sanguis et sanies stagnabant. Postquam pro p. 146. gressum morbi varium in nonnullis aegris descripsit, de remediis, et primo quidem de venaesectione agit, quam in principio copiosam et repetitam administrabat, sed sine fructu; in altero stadio quoque nullus eius usus est. Monet hic iuniores practicos, ne nimiae venaesectioni in putridis insistant, quoniam, plethora vniuersali nimis imminuta, debilitas succedit, et plethora et obstructio in aliis partibus, praecipue pulmonibus non tollitur; ventriculus et intestina postea lenioribus dosibus tartari emetici purganda sunt, quo methodus antiphlogistica subiungi possit. In altero stadio varia pro ratione symptomatum curatio est, quam exemplis illustrat.

12) *Observatio de biliosis febribus, in itineribus ad p. 156. Indiam orientalem solemnibus, Auctore Cl. B A D E N O C H, Cl. W A T S O N communicata.* *) Aerem nocturnum in calidioribus climatibus causam esse ostendit, cum illi, qui, scorbuto affecti, in terram descenderint, hoc quidem curato, febre tamen biliosa correpti perierint. Ideam morbi non satis, sed curationis modum magis definit. Sanguinis missio, nifi

*) lect. d. 20. Febr. 1769.

nisi in robustis et sub initium fiat, minus conuenit. Euacuationes, tartaro emetico factas, magis laudat: spiritum MINDERERI, vel similia medicamenta, postea exhibet, quo paroxysmos intermittentes obtineat, quos cortice Peruuiano coerces, debilitate autem accedente, hic citius exhibendus est.

p. 168. 13) *Relatio de noua methodo amputandi pedem paulo supra malleolos, cum descriptione machinae, ad amputationis locum adaptandae.* Auctore CAROLO WHITE, chirurgo, Cl. HUNTER communicata. *) In laesionibus pedis methodum, crura mox sub genu amputandi improbat, nouam hanc et aliorum, et suam describit, et quatuor iconibus tabula quarta illustrat.

p. 178. 14) *Bubonocelen cum insolitis symptomatibus ortam descripsit, monita de usu cataplasmatum e radice dauci satiui subiunxit, et cum Cl. HUNTER communicauit, Cl. HENRICUS GIBSON chirurgus. **)* Exigua bubonocèle, grauissimis tamen symptomatibus herniae incarceratae stipata, nullis auxiliis exhibitis cedebat; aeger uero operationem recusabat, et paulo post subito moriebatur, etsi externae inflammationis signa non adessent. In disquisitione post mortem, intestina tenuia, ex parte inflammata, apparebant, ileon, in parua ab hernia distantia, processum lateralem, digiti magnitudine, ostendebat, et in hernia ipsa, quae omentum praecipue continebat, similis paruus sinus intestini, sensim formatus, omento inuoluebatur.

In altera huius tractationis parte variae morborum historiae recensentur, quae usum cataplasmatidis radi-

*) lect. die eodem.

**) lecta d. 31. Octobr. 1768.

radicis dauci satiui et infusum polentae, (*Maltz*) quod in nosodochio decoctum brasii dicitur, declarant. Ex his perspicimus, non semper quidem sanationem certam; in summo tamen foetore et dolore ulcerum venereorum, scorbuticorum, scrophulorum et cancroforum, longe serpentium, leuamen attulisse. Monet Noster, autumnii tempore cataplasmatibus usum, radicibus egregie succulentis, efficacius fuisse, quam aestate, qua radices aquosae, et hyeme, qua minus succulentae, reperiuntur.

15) *Tentamina cum cerumine aurium, eo fine instituta, ut optima methodus illud dissoluendi detegatur, quando surditatis causa est.* Auctore Cl. IOH. HEYGARTH. Cl. WATSONO communicata. *) Cerumen hoc immisit in aquam, acidos et alkalinos liquores, salia neutra soluta, saponaceos liquores et inflammabilia, et ab acidis indurari, ab aliis saepe in granulofam vel mucosam massam dissolui vidit. Cum vero aqua brunum vel flauum ceruminis colorem in album mutet, et postea dissoluat, optimum soluens dicit, quae quo magis calida, sine laesione tamen meatus auditorii, immittitur, eo magis soluit.

16) *Observatio de cura haemoptoes, et de equitatione phthiæ remedio.* Auctore THOMA DICKSON M. D. Nitrum paruis, sed repetitis dosibus, ut remedium, haemoptoen, vel interdum alias haemorrhagias coercens, laudat, hancque virtutem ei soli tribuendam esse vrget, cum et conserua de rosis rubris, et spermate ceti exceptum, similes virtutes ostendat. De equitatione in phthisi non, nisi ea habet, quae SYDENHAMUS suasil.

17) a

*) lect. d. 4. Septembr. 1769.

p. 214. 17) a. *Monita quaedam de relationibus Londini de-
mortuorum, et tentamen propositum de relationibus his
annis uniuersae nationis concinnandis.*

p. 223. 17) b. *Relatio de iliaca passione letali, Auctores
Cl. M. GARTHSCHORE RICHARDO HUCKE
communicata. Quamquam ileus morbus ex diuer-
sis caussis oritur, idem tamen semper progressus
symptomatum est. Noster morbum hunc in virgi-
ne viginti et vnus anni, die decimo sexto morbi le-
talem recenset, in qua omentum cum mesocolo con-
cretum inueniebatur; ex hoc nexu, chorda variae
erassitie ad ileum intestinum, paulo supra insertio-
nem in coecum ita accrescebat, vt duplicata ilei
pars non tantum vehementer constringeretur, sed
in parte, mesenterio apposita, discinderetur, ita, vt
contenta intestini in abdomen effunderentur. Va-
rias similes constrictiones, ex obseruationibus chi-
rurgorum, commemorat, et declarat, quam difficile
sit, ad eiusmodi stricturas referandas, gastrotomiam,
vt vltimum remedium, tentare.*

p. 231. 18) *Obseruationes de usu balsamicorum medicamen-
torum incurtabidorum. Auctore Cl. FOTHERGILL. *)*
Recenset primum varia balsama natia, et non-
nulla composita: vires eorum breuiter definit, in-
deque declarat, nec in externis vulneribus et vlce-
ribus sanandis, quod stimulando et calefaciendo agant,
eorum vsum semper posse admitti; multo minus in
internis partibus, ad quas vel non pertingunt, vel,
si tandem integris viribus eo deriuarentur, plus lae-
derent, quam sanarent. Hoc praecipue pulmonum
exemplo, in phthisi, declarat, et iuniores practicos
adhortatur, ne hanc, a multis receptam medendi
methodum, sequantur.

19) De-

*) lect. d. 16. Octobr. 1769.

19) *Defensio methodi medendi SYDENHAMII* p. 247.
in morbillis. Auctore Cl. THOMA DICKSON.
 Inuenit nimirum Cl. MEAD, SYDENHAMUM reprehendere, quod non in principio, sed tandem sub finem, si tussis cum peripneumonia molesta fuerit, sanguinis missionem administrauerit. Ostendit autem Noster, SYDENHAMUM semper, et omni morbillorum tempore sanguinem detraxisse, si morbi indoles hoc exegerit, imprimis, si calidioribus medicamentis febris vltra modum aucta fuerit.

20) *Defensio relationis SYDENHAMII de morbillis, contra MORTONUM,* Auctore EODEM. Ostendit praecipue, numerum hoc morbo demortuorum a MORTONO minus recte, a SYDENHAMO autem accuratius definitum esse.

21) *Descriptio sectionis caesareae.* Auctore Cl. p. 261.
 GUILLIELMO COOPER M. D. Cl. HUNTERO communicata. *) Femina grauida, triginta trium annorum, propter singularem peluis angustiam, omnibus etiam artis obstetriciae auxiliis adhibitis, fetum viuum eniti non poterat. Ad operationem itaque caesaream deueniendum erat, quae, etsi recte administrata, felicem tamen euentum non habuit; magna potius in abdomen effusi et coagulati sanguinis copia inuenta est. Fetus quidem, viuus extractus, nutrimentum sumsit et deiectiones aluinas habuit, sed tumor, ad radicem nasi ortus, sanguinolentus, serosus paulo post mortis causa fuit. Accuratae pelvis delineationes Tab. II. III. et IV. traduntur.

22) *Relatio de caesarea operatione recte efficienda,* p. 272.
additis annotationibus. Auctore Cl. HENRICO THOMSON. Nosed. Lond. Chirurg. Cl. HUNTERO D. M. com-

*) lect. 1769.

communicata. Describit primum omnem operationem, quam ad normam praestantissimorum chirurgorum administrauerat. Infans viuis eductus est; post aliquot tamen horas obiit mater, in cuius infimo ventre magna copia sanguinis coagulati, vt causa mortis, inuenta est. Annotationes, quas subiungit, diuersas chirurgorum, de operationis huius successu, sententias tradunt, locum incisionis abdominis diiudicant, et difficultatem compescendae haemorrhagiae declarant.

p. 289. 23) *Annotationes de cura tabidorum.* Auctore CL. FOTHERGILL *). Obseruationes de vsu balsamicorum in cura tabidorum, No. 18. Nostrium ad vltiorem et ampliorem hanc tractationem deduxit. In qua praecipue in phthysicos initia inquirunt, quae in infantibus, et tenerioris habitus corporibus, post morbillos, scarlatinas aliasque febres exanthematicas, catarrhalibus similes, et in catharrhalibus ipsis, acri sero, ad pulmones conuerso, tussim excitant. Ad hanc tussim praecipue respiciendum est, quae non, nisi exquisita diaeta, cohiberi potest. Hanc dietam, non solum ratione copiae, sed etiam selectus, studiose disquirunt: monita praeterea de sanguinis missione, opiatorum vsu, et aliis medicinis interdum exhibendis immiscet, ita, vt lectionem huius tractationis, in vniuerso nexu, practicis iunioribus quam maxime commendemus.

p. 305. 24) *Relatio de morbo epidemico, ex literis, ad CL. CLARKE datis, excerpta.* Auctore GUILLIELMO SANDIFORD Med. Barbadosi, communicata a CL. FOTHERGILL **). Mense maio, iunio et iulio su-

peri-

*) lect. d. 11. iunii 1770.

**) lecta d. 16. aprilis 1770.

perioris anni febris putrida remittens, et albos incolas et nigritas insulae Barbados corripiebat. Caput potissimum cum organis sensoriiis, obnubilationes, stupores, et deliria afficiebant, et, quando, largo sudore oborto, symptomata graui cessabant, imbecillitas tamen summa, et frigus extremorum remanebant. Symptomata reliqua accurate describit, et, idea morbi proposita, de curatione agit. Venae-sectio non conueniebat, nisi forte in initiis morbi, in plethoricis et robustis, quo tempore etiam lene laxans non inutile erat. Vomitoria magis conueniebant, cum viridem, porraceam materiam copiose euacuarent. Hoc facto, mox ad cardiaca et analeptica progrediendum erat, ex quibus cortex praecipuas partes habebat. Vesicatoria euacuationes seriacris vehementes efficiebant, ulcera excitabant, sed imbecillitatem augebant. Sub finem usum largiorem vini Maderensis, vt optimi cardiaci et alexipharmaci medicamenti, commendat. Humida et calida tempestas praecipua causa fuit: ii etiam, qui depressa, vmbrosa, et humida loca inhabitabant, praecipue morbo affecti sunt.

25) *Appendix ad obseruationes de hydrocephalo*, p. 321. No. 6. huius voluminis traditas. Auctore Cl. WATSON *). De morbo pueri refert, qui, per plures dies, vehementissimis, hydrocephalum indicantibus, symptomatibus excruciatuſ est, quae vero paulo post subinde euanuerunt, et aegri sanitas integre restituta est. In alio puero morbus letalis fuit. Aqua, ex ventriculo educta, et in cochleari igni admota, nullum coagulum, sed perspirationem sine residuo offerebant.

Cc 2

26) *Ex-*

*) lecta d. 30. aprilis 1770.

P. 330.

26) *Excerptum ex literis* Cl. GUILIELMI THOMSON, M. D ad Cl. GUILIELMUM HUNTERUM. M. D. *sistens relationem, de effusione letali sanguinis in cavum pericardii.* *) Vir quadraginta duorum annorum, in iuniori aetate crebriores haemorrhagias passus, et saepius leni tussi cum palpitatione cordis, postea vero rheumatismis inflammatoriis affectus, sub finem ianuarii 1769. simili rheumatismo vexatus, in sinistra praecipue thoracis cavitate tumorem et anxietates percipiebat; venae-sectiones repetitae nullum, vesicatoria tamen aliquod levamen afferebant: palpitatione cordis et febre vehementi postea semper affectus, spatio trium hebdomadum, quinquaginta sanguinis unciae subinde subductae sunt, febre tandem et symptomatibus quodammodo imminutis. Recrudescibat tamen morbus die decimo octavo februarii, cum summa pectoris oppressione et aucta debilitate, per intervalla parum mitigatus, morte tandem die vicesimo secundo accedente. In sectione cadaueris, pericardium, vehementer distentum, pulmones reprimebat, et ex eo educitae sunt tres mensurae (pint) sanguinis fluidi, praeter grumos coagulatos, sat copiosos. Cor flaccidum erat, sed nullo in loco ruptum, ita, ut tanta sanguinis copia tantum subinde transpressa esset.

P. 338.

27) *Relatio, de bono successu incisionis aponeuroseos musculi bicipitis, in vulnere dilacerato.* Auctore Cl. B. WILMER, in literis ad D. HUNTERUM contenta. **) Femina contuso et dilacerato vulnere, in flexura brachii laesa, insigni huius tumore doloribus inde et vehementi febre affecta, non, nisi incisione fas-

*) lect. d. 25. Iunii 1770.

**) lecta d. 1. Octobr. 1770.

fasciae bicipitis tensae et dilaceratae iuuari poterat; hac tamen facta, dolor et febris cessabant, et suppuratione blanda succedente, curatio reliqui vulneris exacte successit.

28) *Observatio, de insensibilitate tendinum.* Auctore p. 343.
re IOHN TECKEL Chirurgo, cum introductione
Cl. HUNTERI M. D. *) In breui introductione
controuersia, de hac re mota, declaratur, et, obseruationem hanc insensibilitatem tendinum luculenter confirmare, dicitur. Chirurgus vero partem dilacerati tendinis forfice, sine aegri sensu, praescidit.

29) *Relatio, de conuenienti methodo in sanandis* p. 347.
ulceribus crurum. Auctore IOSEPHO ELSE, communicata a Cl. FOTHERGILL. **) Ulcera crurum, frequentissimum morbum nosodochiorum, pauperes magis afficere: in curatione per medicamenta varia, interdum quidem supprimi, sed iterum recrudescere, res notissimae sunt. Noster, post curationem internam, et callum, emollientibus cataplasmatibus discussum, tincturam myrrhae, vel aquam vegetabilem GOULARDI medicamentum saturninum applicat: ulcus plumbea lamina premit, et fasciis, crebrius circumductis, et ad genu usque continuatis munit, et haud exiguum commodum, in sanandis ulceribus, inde promittit. Interim sub finem monet, diu iam cognitum hoc auxilium non semper succedere, cum saepe materia, si hic coercetur, ad pulmones ruat, et maiorem noxam adferat.

30) *Relatio, de hernia singulari et letali.* Auctore p. 355.
EODEM. ***). Tumor in inguine, cum dolore obortus, et tactu, et ex indole morbi, glandula

Cc 3

lym-

*) lecta d. eodem.

) lect. d. 15. Octobr. 1770. *) . lect. die eodem.

lymphatica indurata esse videbatur, ideoque cataplasmatibus emollientibus mouebatur, aeger vero subito obiit, et in disquisitione cadaueris, glandulam, facile separandam, nullaue herniae vestigia ostendit, attamen laesione, sub ligamento P O U-
P A R T I I disquisita, aliqua tamen pars intestini ilei intercepta erat, ex quo euentu cognoscebatur, et eas hernias, quae non totum intestini tubum intercipiunt, letales esse, nec, operatione instituta, semper tolli posse.

P. 358. 31) *Relatio, de effectu cicutae et cataplasmatibus dauci sativi, in cura canceri mammae, ex literis Cl. ARTHUR NICOLSON. M. D. ad Cl. RICHARDUM HUCK. M. D. *)* Femina quadraginta quatuor annorum, teneri corporis habitus, variis rheumaticis doloribus, aliisque symptomatibus, crebrius vexata, scirrhus in mamma sinistra affecta, eo tamen, aliquot annorum spatio, subinde dissipato, in dextra similem contraxit. Hic grauior erat, et vehementer pectori adhaerebat. Noster itaque, doloribus auctis, cicutam, et interne exhibuit, et in externis epithematibus applicauit, tanta etiam copia, ut ducenta et decem grana extracti quotidie deglutiret. Morbus tamen non sanatus est, sed carcinomaticum vlcus subinde increuit, ita, ut nono mense demum e vita secederet. Etsi vero hoc in casu vera curatio a cicuta frustra expectata est, Noster tamen hoc medicamentum non prorsus contemnit, cum multa incommoda leuauerit, et tum etiam, cum caput stupore affecerit, effectus tristes non reliquerit. Cataplasma ex dauco satiuo foetorem ulceris correxit.

32) *Rela-*

*) lect. d. 5. Nouembr. 1770.

32) *Relatio, de egregio usu decocti polentae* *) p. 367.

(Wort) in ulceribus malignis, ex literis Cl. BENIAMIN RUSCH M. D. et Prof. chem. in Philadelphia, ad D. HUCK *). Femina, venerea labe infecta, praeter alia symptomata, corpus passim ulceribus obfessum, offerebat. Noster vero salivationem, quae iam sine fructu tentata erat, repetere noluit, sed largiorem usum decocti polentae suavit, ex cuius usu intra mensem femina vires ita recuperavit, ut sine ulteriori medicina, post septem menses, sanitas constans persisteret.

Alia femina, abscessu in dextro hypochondrio oborto, paulo super os ileum, hic suppurationem quidem subiit, sed, incisione facta, non pus bonum sed sanguinolentum praebuit; ulcere itaque impuro relicto, usus decocti, nunc indicati, largior, et in hoc maxime salutaris erat. Quanquam enim sinus laterales ulceris aperiendi erant, tamen et hi tandem puri redditi et sanati sunt.

33) *Tumorem cysticum, in orbita ortum, a chirurgo* p. 371.

Cl. BROMFIELD et INGRAM operatione sublato, describit Cl. R. BROCKLESBY M. D. Tumor, ad glandulam lacrymalem natus, bulbum oculi depresserat, palpebra superiori, parum sursum allata, sed hiantem et a superiori remota. Non coecitas solum, sed dolores aegrum urgebant, ut ubique auxilium quaereret, quod tandem nominati chirurgi praestiterunt. Palpebra inferiori itaque, quantum fieri poterat, sursum ducta, incisio per integumenta ad

Cc 4

na-

*) Praeparatur hoc ex tribus vel quatuor cochlearibus pulveris polentae, (Malz.) in mensura ebullientis aquae exceptis, addito tandem uno vel altero cochleari vini, et pauxillo sacchari bruni.

*) lect. d. eodem.

nasum tanta efficiebatur, vt digitum chirurgi admitteret, qui, tumorem disquirens, eum scalpello acuto perforabat, ita, vt ex eo liquor pellucidus efflueret, vitro, ex quo vinum bibitur, vix excipendus, quiete aliqua aegro concessa, sanguineque deerso, cystis hamulis protracta et tota excissa est. Et si vero operationem hanc insignis inflammatio excipiebat, eius tamen symptomatibus sopitis, aeger recte curatus est. Post quinque enim menses palpebra liberum motum acquisiuerat, et oculus lucem et tenebras discernere poterat.

P. 377. 34) *Epistolae duae, de varicoso aneurysmate*, a Cl. W. WHITE ad Cl. GUILLIELMUM HUNTERUM M. D. scriptae, et societati communicatae. Traditur in iis descriptio venae basilicae pertusae, cum vulnere arteriae brachialis subiectae. Coalitione enim vtriusque vasis facta, sanguis ex arteria in venam refluxit, vtrumque vas magis extensum erat, et motus, pulsui similis, in vena crebrius percipiebatur, pulsu ad carpum exiguo.

P. 382. 35) *Epistola* Cl. THOM. ARMIGER chirurgi ad Cl. HUNTER *super varicosum aneurysma*. Similis ferme arteriae et venae tumor in flexu cubiti describitur: compressa arteria humerali, deplebatur vena hucusque turgida, mox repleta, si compressio arteriae cessaret: in hac aegra, arteria humeri et carpi, aequali vi pulsabant. In addito Cl. HUNTERI monito legimus, se hanc feminam postea examinasse, et sequens tentamen instituisse: ligato nimirum sub tumore brachio, ne sanguis ab extremitate reflueret, et paulo post compressa arteria humerali, omnem tumorem euanuisse, cessante autem arteriae compressione, tumorem venae illico repletum esse.

36) *Rela-*

36) *Relatio, de letali inuersione uteri, cum ruptu- p. 388.*
ra vesicae in grauida. Auctore Cl. IOH. LYNN chi-
 urgo, communicata a Cl. HUNTERO M. D. Fe-
 mina quadraginta circiter annorum, mater plurium
 liberorum, decima quinta circiter hebdomade gra-
 uida, prolapsum vaginae, quem saepius passa erat,
 denuo percepit, nunc vero difficiliter, quam alias re-
 mittere potuit; partibus tamen, auxilio chirurgi
 denuo repositis, post decem dies in terram delapsa,
 similia percipiebat incommoda, sine prolapsu va-
 ginae, sed cum sensu corporis cuiusdam, ex abdo-
 mine versus dorsum delapsi. Longius nunc recenset
 Noster disquirendi modum et auxilia; sed iudi-
 cium difficile erat, nec urina villo modo per cathe-
 terem subduci poterat. Aegra autem interea sensit
 dolorem partis cuiusdam, in abdomine ruptae, quo
 facto, melius se habuit, et sibi ipsi abortum praedixit,
 qui etiam breui sequutus est, secundinis simul cum
 fetu secedentibus. Etsi vero postea catheter facile
 in vesicam admittebatur, nulla tamen urina sub-
 ducta est, incommoda potius, sine leuamine villo, in-
 crescebant, vesicam igitur ruptam esse chirurgus
 praecidit, quod etiam post mortem, breui subsequen-
 tem, sectione confirmatum est. In abdomine nimi-
 rum decem circiter mensurae vrinae deprehensae
 sunt, vesica flaccida, foramine rotundo, in margine
 gangraenoso, versus fundum reperto; vterus totus
 adeo retrorsum flexus erat, vt vix conspiceretur,
 sed inter vaginam et intestinum rectum impactus
 delitesceret, orificio vteri versus os pubis directo.
 Cl. Auctor sub finem multa proponit, de auxilio, in
 simili casu ferendo; sed praeter puncturam vesicae,
 supra os pubis, quam tamen aegra nostra admittere
 volebat, nullum auxilium fuisset.

In appendice Cl. HUNTER similem ferme ca- p. 400.
 sum recenset, quem tamen hic indicare nolumus,

cum ipse moneat, melius intelligi posse, conspecta
icone, quam in tabula operis maioris iconum vteri
dedit, quod splendidum et vtile opus auide
expectamus.

P. 410. 37) *Relatio, de simplici fractura tibiae, in femina
grauida, in qua callus non nisi post fetum editum for-
matus est.* Auctore Cl. EDWARD ALANSON
chirurgo, communicata a Cl. HUNTER. *) Femina
viginti duorum annorum, teneri corporis habitus,
in qua ante graviditatem femoris fractura apte sa-
nata erat, dum altero mense gravidam se sentiret :
simplicem tibiae fracturam passa est, quae tamen,
molli semper loco fracturae relicto, sanari haud
potuit, pede tandem oedematoso reddito. Cura
itaque sanitatis in vniuersum habita, et inprimis
cortice Peruuiano crebrius propinato, vsque ad
partum seruata est ; fetu autem edito, oedema
subinde discussum est, et fractura ipsa coaluit, vt,
nona hebdomade, cruri firmiter insistere, et libere
obambulare posset.

*) lecta die 4. Septembr. 1769.

II.

DOMINIC. COTTUNNI regii anat. prof.
de sedibus variolarum *συγγαμα* Vien. apud
Rudolph. Graeffer. 1771. 8. c. f. pag. 274.
sine capitum summa, praefatione et iconis
explicatione.

Non nuper variolas, non solum cutem et exter-
nam corporis superficiem, sed etiam internas
partes occupare, a nonnullis medicis demonstratum,
atque exemplis confirmatum est. *) Cum autem,
hanc rem aliter se habere, cadaueribus variolosis
disquisitis, Cl. COTTUNNIUS, quem alio tempore
iam laudauimus, **) viderit, variolarum sedem
accuratius definire, ex sectionibus eiusmodi cada-
verum constituit. Praefatione igitur, quae ad
Cl. IOANNEM PRINGLE directæ est, præmissa,
a Nostro quaeritur de sedibus variolarum: Vtrum
cutem solam, an partes, cutis similitudinem pro-
dentes, subque cute sitas, praesertim quae ventri-
bus includuntur, variolae occupent, ibique simul
sint aut esse possint; porro, qualis locus earum
partium, quae variolas excipiunt, iis fouendis sit
aptus?

Ad hanc rem, eo melius definiendam, cadaue-
rum variolosorum nonnullorum sectiones praemit-
tit Cl. COTTUNNIUS. Ac primum legitur hic
aegri

*) Legi hac de re inprimis meretur praeter eos, quos
Cl. COTTUNNIUS collegit, diss. inaug. de sede
variolarum non in sola cute Auctore CASIMIR.
CHRIST. SCHMIDELIO Resp. *Friedric. Au-
gust. Lammers*, Erlang. 4. v. comm. nostr. primae
decad. supplem. IV. p. 694.

**) EIUSDEM de ischiade nervosa commentarius.
Vienn. 1770. 8. comm. nostr. Vol. hoc p. 125.

aegri adulti variolosi historia, qui, ob variolarum malignitatem ac symptomatum grauitatem, mortuus est conuulsionibus validissimis. Ad cadauer hoc aperiendum, quod tantam articularum ostendebat flexibilitatem, quanta, in viuo corpore, aegre observatur, indeque summam solidorum laxitatem ac fluidorum resolutionem prodebat, non solum mortis grauitas, sed etiam casus ab alto, non diu ante eius mortem, Cl. COTTUNNIUM impulerunt.

p. 20. Integumenta tumebant ita, vt in oedemate, a cuticula satis crassa erat, qua incisa, pinguedo ubique deprehendebatur. Pustulae ichore, puri, seu lymphae sublaeteae simili et pauco, erant impletae, ideoque eas variolas refert ad crystallinas. Indivisibile facile et fieri potuisse Noster putat, vt, timore percussio aegro, ob ictum capitis, nullo autem modo, vti ex sectione patet, periculosum et letalem, hic ichor, in sanguinem resorptus, nervos petierit, atque conuulsionibus his mortiferis inseruiuerit. Id quod proficisci a timore, nec non a variolis crystallinis, cuius ichor imprimis ad resorbendum pronus est, ad nervos male afficiendos, aptus cernitur, Nostro affirmatur. Nec minus ab hoc retrogressus ichore deriuat Noster cadaueris flexibilitatem a viscerum flacciditatem. Praeterea autem ne ullum quidem miasmatis variolosi, in internis corporis partibus, detexit vestigium.

p. 30. His addit, ex nonnullis adhuc aliis, quibus interfuit Cl. COTTUNNIUS, sectionibus cadauerum varioloforum, duo alia exempla, ex quibus pariter ac ex reliquis patet, variolas ibi solummodo federe, vbi aer externus penetret, ideoque nec in ventriculo nec in intestinis, nec in visceribus thoracis, ac abdominis variolas esse, etiamsi FERNELIUS, GUNTZLIUS, alique id asseruerint. In intestinis crassis quidem par

paruulae rotundae glandulae apparebant, minime tamen variolae. In aliis rursus vaporem admodum calidum Noster animaduertit.

Ventris fluxus, in variolosis aegris saepe salutaris est, non raro autem hepatis inflammationem arguit. Quod si vero hoc est inflammatum, hypochondrium oportet intumescere atque dolere. Ac tum suadet Noster, vesicatorium latum ibi externe applicare, atque interne inflammationi obuiam ire. Interna gangraena saepenumero moriuntur in morbis acutis ii, qui conuulsionibus post somnum subito corripuntur, seu alienatione mentis laborant. Porro in gangraena extremitatum inferiorum, locus, a vesicatorio exulceratus, immunis erat a gangraena. Idcirco laudat Cl. COTURNIUS cantharidum vim, solida stimulantem, fluida resoluentem, viresque vitales sustentantem, in gangraenosis febribus ac viscerum inflammationibus, earumque utilitatem super sedem affectam, ad gangraenam arcendam, expendit. Porro Noster vesicatoria, per duos tresue dies suppurantia, nisi sponte exsiccant, arte sanat, et deinde, vulnere consolidato, nouum vesicatorium ibidem applicat. Ita ter applicauit, cum felicissimo euentu, vesicatoria, in pleuritici parte affecta.

P. 45.

Sequitur iam pueri variolosi, qui benignas quidem habebat variolas, nihilominus tamen a causa verminosa, conuulsionem producente, obiret, historia quarta, ex cuius sectione iterum, internas partes corporis non variolis obsessas fuisse, apparet. Ceterum pectoris cavitatem dum Noster disquirere, in pulmonibus ligamenta multa, morbosa, foliacea, quibus pleurae adnati essent pulmones, ac per quae parua vasa sanguifera e pleura in pulmones transire reperiēbat.

P. 54.

Inter

p. 66. Inter signa verminosa in variolosis, pressionem circa umbilicum Noster refert. Nam lumbrici tenuia intestina occupant. Porro pedum crurumque variolae, aut rariae, aut ferotinae, aut plane nullae, in verminosus conspiciuntur. Quod si vero accidat, ut verminosi laborent variolis, commendat Noster lac, ac aethiopem mineralem, quem Cl. Auctor, non solum ad vermes necandos, et expellendos, sed etiam ad variolas paruas, depressas, varieque impeditas expediendas, et ad malignas, in benignas mutandas, magno cum fructu adhibuit. Adscribit enim aethiopi Cl. COTTUNNIUS vim variolosi miasmatis corrigendi. „ Vidi, inquit, nutritionem et complementum pustularum variolosarum feliciter promouisse aethiopem. „ Qua occasione praeterea laudat aethiopis mineralis usum, in asthma humorali, in tussi acriori, in diuturna rheumatica pectoris labe, in febribus lentis, obstructionibus glandularum mesentericarum, tuberosisque pulmonum affectibus.

p. 80. A mercurio, eiusque praeparatis, modicam in variolosis expectat Noster saluationem, eamque salutarem iudicat: Nec, uti alii sunt rati, mercurii ac potissimum aethiopis mineralis usum tam in initio, quam in progressu variolarum obesse putat. Ex negligentia adstantium aliquando factum est, ut vna vice drachma vna aethiopis mineralis sine ullo aegri incommodo, ac morbi variolosi perturbatione propinaretur, quem Noster, cum cortice Peruuiano coniunctum, semper in variolis utilissimum deprehendit.

p. 87. Ex horum itaque cadauerum sectione omnino apparet, variolas internas corporis partes non occupare, sed solam externam superficiem cutaneam; posse vero inflammationes partium internarum,
vt

vt pleuritidem et hepatitidem, superuenire variolis, quas cum variolis nullam alere coniunctionem, sed aliis ex causis proficisci, Noster arbitratur. Nam, secundum Nostri opinionem, facile fieri potest, vt duo miasmata morbosa simul, sine vnius alteriusue perturbatione, in corpore effectus suos prodant, nec vnum alteri officiat, aut profit. Pari modo non negat Cl. CORTUNNIUS, viscera apta esse quidem posse, ad variolas formandas ac fouendas, seque ipsum vesiculas paruas in hepate reperisse, quae hydatides erant; nunquam tamen veras variolas. Id quod etiam ex sexta variolosi adulti historia patet, in cuius cadauere praeterea intestinorum introfuspceptionem quoque reperit, ac de eius origine vtiliter disputat.

His itaque probatis, variolarum venenum ad p. 121. cutem solam adspirat, et a locis vitalibus ac internis arcetur. Cui accedunt os, palatum, pharynx, larynx, nares et similia. Omnia itaque ea loca, quae variolae occupant, libero aeri exposita esse oportet. Quapropter non quaerit Noster hanc variolarum sedem in fabrica cutis, sed in liberi aeris accessu, et inde nata exsiccatione superficiei. Nam narium cauitates, ob muci affluxum, rarius pustulis variolosis obsessae, spectantur; rursus et oculus, ob lacrymalem humiditatem, a variolis liber est. Quae loca, si sicca essent, multo magis illis pustulis fouendis inseruirent. Vidit tamen Noster palpebram inferiorem interne pustulatam. Porro haemorrhoides coecae variolis obsessae erant. Menstrua variolis accidentia mortem induxerunt, atque haemorrhagiae omnino eruptioni variolarum offecerunt.

Vbi itaque nulla cernitur humiditas, sed per p. 134. siccatio summa, ab aeris liberi accessu profecta, ibi variolae sedem figunt. Id quod experimenta declarant. Ne palpebrae variolis tententur, iuuat eas panno

panno humido, in eruptionis stadio, madefacere. Quapropter reiicit quoque Noster, et maximopere reprehendit balnea, eaque summe noxia, ac potius omittenda, quam admittenda iudicat, et eligit loca, quae aer perflat, humiditateque sunt destituta, ac tempestatem siccam, borealem, erumpentibus variolis amicam, humidam australem inimicam fuisse expertus est. Omnis enim humiditas impedit variolarum eruptionem. Contra humiditatem igitur, inter praesidia refert Cl. COTTUNNIUS omnia omnino, quae cutem refrigerant atque exsiccant, ut sunt tegumenta leuia, lectus puluinariaque non adeo mollia, quae perspirationem augent, liberi aeris accessus, in conclauius magnis siccisque, et id genus alia.

P. 147. Veris huius regiminis frigidi commodis monstratis ac ex DIMSDALIO aliisque probatis, expendit Noster, quousque hoc regimen tenendum sit. Aliud enim eruptionis stadium, aliud maturationis, aliud denique perficcationis exigit regimen. Quapropter humiditatem aliaque auxilia, ad tuenda loca, ne variolas capiant, inter eruptionis stadium solummodo concedit; dein veneno varioloso a sanguine segregato, et ad cutem translato, pustularum maturationis non est turbanda, sed fouenda. Id quod fieri putat Noster, libero sanguinis, ad tubercula cutanea, accessu, et vi vitae minime minuta. Atque tum hoc regimen vitandum est.

P. 151. Causa itaque, cur interiores corporis partes a variolis sint immunes, ponitur a Cl. COTTUNNIO in vapore, qui ubique interne exsudat, ac interiores corporis partes humectat. *) Cur autem perficcatio super-

*) v. eiusd. de ischiade nervosa, p. 50. comm. nostr.
Vol. hoc p. 127.

superficie cutaneae, per aerem liberiore infer-
viat variolarum sedi, nullam se posse reddere ratio-
nem Noster fatetur.

His itaque praemissis, Auctores, qui variolas p. 157.
internarum corporis humani partium obseruarunt
ac affirmarunt, examinat, eorum errores detegit,
atque eos refutat tredecim his obseruationibus,
quas antea colligit Noster, indeque probat, non in
partibus internis pustulas variolosas efflorescere.
Deriuat hanc controuersiam primum a FERNELIO,
quem dein MEAD, BOERHAAVIUS, GUNTZ,
LIEUTAUD alique sunt secuti. Dum porro
Noster considerat Auctores, qui asseruerunt, fetus
in vtero variolas pati, eos refutat, ac demonstrat, hoc
plane non fieri posse, ob nimiam humiditatem, quam
ferre oportet fetus, innatantes liquoribus in vtero.

Iam vidit Noster, quis locus in ipsa cute esset, quem p. 202.
venenum variolosum sibi eligeret. Atque est illud;
vti Noster cum Cll. ASTRUCCIO et GUNTZIO
arbitratur, mucosum, cuti ac cuticulae intermedium,
corpus Malpighianum. Tumet enim, variola
formata, corpus reticulare MALPIGHII, crassum
fungosumque fit gelatinae ad instar, atque cuticula
immutata. Variolosi veneni natura atque indoles
quamquam latet, pluries tamen corripere posse ho-
minem variolis negat. Aluiductiones variolarum
eruptioni non officiunt, ac, ob vim sedatiuam ac
anodynā salis Anglici, mauult illud aliis laxantibus
praeferre, atque exhibuit hic cum felici successu.
In pulsu Noster reperit singularem frequentiam,
quae variolas annuntiaret. Per vrinae vias, sudo-
rem aluumque variolosa lues non potest expelli, sed
abscedere eam oportet in cute: Acetum aliter atque
Vol. XVIII. Pars III. Dd aliter

aliter temperatum conuulsis, aut ad conuulsiones pronis, expertus Noster est semper inimicum.

p. 235. Multum autem iuuant variolosos vesicatoria, quorum vim, a Nostro iam declaratam, non diu ante commemorauimus. Solet ea brachiis et cruribus applicare, ac laudat eorum vtilitatem magnam in omnibus stadiis variolarum. Pari modo ea quoque morbillorum ferociam moderantur, ac pectus praecipue in morbillis tuentur. Ad variolas eleuandas laudat fotum recens mactatorum animantium iteratum.

p. 245. Tres sunt, secundum Nostri sententiam, variolae febres, nimirum febris eruptionis, maturationis ac tandem persiccationis. Eruptionis febris, quo mitior est, eo tutior. Reliquae enim duae pendunt ab hac prima, quae mitior reddi potest, si opus est, sanguinis missione, alui purgatione, libero regimine, et acidorum vsu.

p. 250. Variolarum constituit duo genera, atque dispecit variolas in umbilicatas, et vesiculares, quarum icones quoque adiecit, et octo figuris habitum interio-rem et exteriorum ab origine ad persiccationem ostendit. *Umbilicatae sunt, quae ab ipsis initiis, cum sunt aticulae assimiles, verticem habent retusum et veluti decurtatum, atque lenticulae propiores sunt, quam coni figurae, uti pleraeque solent, non variolosi generis pustulae.* Dein ad lenticulae magnitudinem accedunt variolae, ad quarum turgescentiam, plenitudinem, ac viuum colorem, Noster magis respicit, quam ad magnitudinem, quae saepenumero variat. Hae umbilicatae a Nostro idcirco nominantur, quoniam umbilicum, siue foveolam in centro habent. Quod si itaque umbilicatae degenerent, in quatuor species mutari eas vidit Noster, in residues nimirum siue gangraenosas, in corruptorias, crystallinas, et in verrucosas. Crystallinae summam produnt malig-
nita-

nitatem, inde iis laborantes iecur et lienem gangraenosum in cadaueribus monstrarunt, nec non gangraenosos pulmones. Alterum genus variolarum cernitur in vesicularibus, quae vmbilico carent, acrioris sunt indolis, quam vmbilicatae, ac quibus non raro petechiae sese iungunt. Earum autem degenerum vnam solummodo speciem Noster vidit, purpuraceam scilicet, qua tandem violaceae ac nigrae fiunt variolae.

Ad benignas igitur variolas pertinet, vt amb- p. 266.
tus earum eleuatus, circuli forma, circa vmbilicum in purulentum abscessum mutetur. Atque has appellat Noster naturales. Quapropter purpuraceas, gangraenosas, verrucosas crySTALLINASQUE non ad eas refert, sed ab alterius morbi, aut veneni consortio, in corpore affecto latente, deriuat. Inflammatione enim perfecta, in benignis vmbilicus eleuatur, planior ac plenior fit. Dein circa eum albidus annulus apparet. Putat namque Cl. Auctor, pustularum variolosarum suppurationem incipere a vertice, et ad pustulae basin sensim sensimque descendere. Benignas porro variolas nec cicatricem, nec foueam relinquere oportet. Etenim pus variolosum bonum cutem tuetur, pruritumque, a bono pure ortum, indicare putat variolas aperiri. Id quod tum aegris quoque concedit. Tandem Noster et inter obscuras refert res, cur eueniat, vt mater, variolas iam passa, fetum edat variolis obnoxium, atque vt quis semel variolista tantum laboreat, nec pluries.

Haecenus naturalem variolarum sedem ad cutem p. 271.
extimam pertinere, et pustularum fabricam extra vias sanguinis elaborari, h. e. extra animal esse Noster ostendit, eumque medicum optimum praedicat, qui a vitalibus organis citissime variolas expellat.

pellat. Atque fieri hoc putat Cl. COTTUNNIUS, impedimentis, quae ex superioribus patent, potius sublatis, quam remediis. His enim sublatis, curat se ipsum variolosus morbus.

III.

Traité des accouchemens en faveur des élèves,
dans lequel sont traitées les maladies des
femmes grosses et accouchées, et celles
des petits enfans : Par M. F. A. DELEURYE,
Membre de l' Acad. roy. de chir. Conseil-
ler - Chirurgien ord. du Roi en son Châ-
telet. à Paris chez M. Lambert et P. F.
Didot 1770. 8. 1 Alpb. 6 pl.

i. e.

**Tractatus de arte obstetricia, in usum discipulo-
rum conscriptus, in quo etiam de morbis
gravidarum, puerperarum, et infantum
agitur. Auctore F. A. DELEURYE.**

Systematicum hoc artis obstetriciae compendium
praecipuas artis obstetriciae regulas complecti-
tur, a celeberrimis nostri aevi huius artis magistris
propositas, quae Auctor Cl. in ordinem satis com-
modum redegit, variasque passim annotationes ad-
didit, quarum nonnullas speciminis loco hic ad-
duxisse sufficiet. In introductione breuiter artis ob-
stetriciae fata enarrat, nimium Gallis tribuens, ad
quos fere omnia, ad externos vero parum vel nihil re-
fert. Sic enim v. c. forcipis inuentionem breuissime
tantum indicat cet.

In

In duas vero partes totum hoc systema diuisum est, in quarum priore de partibus, generationi inservientibus, grauiditate et morbis grauidarum agit. In posteriore autem de partu naturali et praeternaturali, atque puerperarum et infantum morbis differit. Cartilagines, quibus ossium pubis symphysis fit, in omni partu diduci, contra Cl. SMELLIIUM defendit, qui hoc in praeternaturali tantum fieri assererat. Fit autem haec dilatatio ope humoris serosi, qui in telam cellulofam cartilaginum, vi vteri turgidi vasa comprimantis, effunditur. Carunculae myrtiformes in feminis, quae saepius pepererunt, sensim delentur. Antagonismum inter fundum et orificium vteri, a Cl. LEURETO propositum, nec non ligamenta vteri rotunda posteriora, quae nonnulli ex recentioribus Gallis describunt, assumit. Idem hoc quoque de situ capitis fetus, et descensu eius in partu, ad mentem Cl. OULDI, valet. Peculiari capite Cl. Auctor modum exponit, quo puellae gibbosae, num fetus gestando pariendoque aptae sint, examinari possint, sine explorationis proprie sic dictae ope. In grauiditate diiudicanda minime exploratio tantum instituenda est per digitum in vaginam immissum; cum nec ex loco, quem collum vteri occupat, nec ex longitudine eius, nec ex aperto vel clauso eius statu, nec ex altitudine vteri in pelui, nec ex pondere cet. de grauiditate certum ferri iudicium possit. Plurima enim haec signa incerta et fallacia sunt. Hinc aliam methodum Cl. Auctor commendat, qua vero tertio tantum grauiditatis mense uti possumus. In hac femina in dorso cubante, digitum in vaginam eius immittit, et orificio reperto, parti posteriori, seu corpori vteri digitum fortiter apprimit, alteram vero manum regioni hypogastricae imponit, et ita, vtero sursum pressio impetum vteri grauidi volae manus, hypogastrio in

- p. 89. cumbentis, ope persentiscit. Circa nutritionem fetus ita sentit, vt doceat, illum modo triplici, per funiculum, per os, et per inhalationem cutaneam nutriri; nullum, verum, circulum humorum inter vterum et placentam existere, sed placentam sanguinem spongiae in modum sugere, atque ex cellulis eius per venas funiculi hunc sanguinem resorberi. Qui vero per arterias funiculi ad placentam iterum defertur sanguis, non ad matrem redit, sed nouam in placenta praeparationem subit. Venaesectionem, quam sine vlllo fere discrimine in grauidis instituere solent, si nulla necessitas vrgeat, reiicit. Quae circa finem grauiditatis fit, partum quidem accelerat, sed felici euentu, cum partus, qui ante finem noni mensis contigit, felicior sit eo, qui post periodum partus naturalem fieri solet.
- p. 208. In versione vnicum pedem tantum attrahit, neque alterum quaerit, nisi obstaculo ex eius retentione nato; brachia autem semper soluit, nisi in eo casu, vbi fetus paruus, abortiuus vel putredine affectus est. Facies fetus in versione absoluenda, non versus os sacrum matris, sed versus os ilium eiusdem conuertenda est. In vniversum laudandus
- p. 226. est Cl. Auctor ex eo, quod neglectis, subtilioribus illis distinctionibus situs peruersi, quae tirones confundunt praecipuas tantum regulas, quae, tum in omni versione, tum in variis speciebus situs peruersi
- p. 230. obseruandae sunt, proponat. Si, vno brachio prolapso, non in vterum penetrare potest Cl. Auctor, alterum brachium quoque in vaginam trahit, quo artificio vt plurimum situs fetus ita mutatur, vt nunc facilius aditus manui pateat. Ea partus species, qua facies fetus orificium vteri respicit, non mala iudicanda est, si modo facies non obliquum situm habeat, cum plurimi eiusmodi partus naturae tan-

tantum ope terminentur. In situ vero faciei, aut p. 238.
 capitis obliquo, ubi dimidia tantum faciei, vel 240.
 anterior colli pars orificio obuertitur, statim versio
 institui debet, cum capitis in rectum situm directio,
 quam multi commendant, vix vnquam fieri possit.
 Si ex capite incuneato occiput fetus ita se offert, p. 246.
 vt pars eius inferior os sacrum, superior os pubis
 respiciat, femina genubus et cubitis innixa, forceps
 a posteriori eius parte introduci debet. Hac enim
 cautione adhibita, instrumentum hoc caput fetus
 melius comprehendit, et perinaei ruptura euitatur.
 Capite abrupto, ad eius extractionem forcipe p. 250.
 Auctor Cl. vtitur, et vnco infixo caput figit, quo
 forcipem applicare possit; eandem quoque, si in ver-
 sione caput retineatur, adhibere iubet. Si placenta p. 279.
 in abortu remanet, et iniectiones adhibentur, eae
 ita dirigendae sunt, vt in ipsum vterum, nec in va-
 ginam tantum penetrent. Nimis vniuersalem vsum p. 306.
 arcani duplicati, quod ad metastasin lacteam prae-
 cauendam in omnibus fere puerperis, sine vlllo discri-
 mine, in Gallia adhibent, Cl. DELEURVE taxat. Dolo- p. 342.
 res post partum non semper, vt Cl. LEURETVS
 asserit, a frustulis sanguinis coagulati, sed ex ipsa
 vteri dilatati contractione oriuntur. De morbis, ex p. 354.
 metastasi lactis (*depôts lacteux*) oriundis, fusius hic
 Cl. Auctor ex Cl. PUZOS, LEURETI aliorumque
 observationibus explicat. Febrem puerperarum
 miliarem in symptomaticam et idiopathicam distin- p. 368.
 guit. In priori casu eruptio exanthematis morbum
 soluit, et benignissima est. Atrophia infantum p. 412.
 quae ab obstructione viscerum (qui morbus Gallis
carreau dicitur) et glandularum mesenterii (*chartre*)
 oritur, arhachitide distinguendus est. Commendat
 in atrophia Cl. Auctor decoctum scrophulariae,
 vsum internum saponis, et ipecacuanhae in refra-
 cta dosi. Adhibuit quoque in fine morbi p. 413.
 Dd 4 oleum

oleum lini interne felici cum successu. In rhachitide lac noxium est. Rubia vero tinctorum, ipecacuanha, purgantia amara, balnea frigida cet. omnem curationem absoluunt.

IV.

An enquiry into the nature, rise, and progress of the fevers most common in London, as they have succeeded each other in the different seasons for the last twenty years. With some observations on the best method of treating them. By WILLIAM GRANT, M. D. London: Printed for T. Cadell. 1771. 8. mai pagg. 463. cum introductione pagg. 15.

i. e.

Disquisitio naturae, originis ac progressus februm, quae Londini frequentissimae sunt, prout in diuersis temporibus annorum viginti nuperrimorum se inuicem exceperunt. Accedunt observationes quaedam super optima eas tractandi methodo. Auctore GUILLIELMO GRANT, M. D.

Postquam in introductione Cl. Auctor necessitatem attendendi ad influxum, quem variae tempestates aerisque vicissitudines in morbos habent, demonstrauit, variasque inde cautelas, in praxi observandas, collegit, primo loco *de febribus intermittentibus* exponit. Ampla satis ea est tractatio, ex qua quae-

quaedam potiora momenta num breuiter tradere queamus, nunc dispiciendum est.

Febres istae fere epidemicae sunt, insigniter p. 1.

tamen pro anni tempore climatisque diuersitate variant, ad quae accedunt diuersus corporum habitus et variae caussae, ex rerum non naturalium varietate pendentes. Exacte notat signa, quibus febris intermittens anomala (*unformed ague*) a febribus p. 3.

aliis continuis ac remittentibus discernitur. Multum differt febris nostra vernalis, ab auctumnali : p. 6.

prior facile in continuam, auctumnalis contra remittens facile in intermittentem transit, prout vel frigus hibernum calore intensiori, vel calor aestiuus frigore acriori excipitur : quare mirum non est, morbos auctumnales minus exitiosos esse vernalibus, quod mortuorum numerus Cl. Auctorem docuit.

Auctumnales igitur morbi, quo propius ad ver, p. 7.

et vernaes, quo propius ad iulium accedunt, eo facilius curantur. Auctumnalium morborum sedes fere est in primis viis, vernalium contra in dispositione humorum putrida, quae saepe cardiacorum ipsiusque adeo corticis vsum non admittit. Febres auctumnales in australibus Europae regionibus rariores sunt vernalibus, neque sanguinis missio et purgantium vsum, aduersus has tam efficacia remedia, in borealibus aequae proficua censenda sunt.

Sequitur descriptio decursus paroxysmi p. 10.

febris tertianae, eaque accuratissima : sedimentum lateritium urinae in ea auctumnali saepius ob- p. 12.

seruauit Noster, numquam in vernali. Crisin eam demum completam dicit, quae, omnibus colatoriis liberis redditis, contingat, cum febris sit vniuersalis spasmus et constrictio. Differentiam febris intermittens exquisitae simplicis, et extensae seu productae : item febris hemitritaeae et duplicatae exponit : vltima in Belgio frequens est, non aequae p. 15.

- Londini, et a quotidianis distinguendae sunt febres
- p. 16. hecticae, quarum tres species adducit, nempe communem Anglorum, iunioribus tempore veris infestam: eam, quae a magnis euacuationibus, et eam, quae a resorpto pure, vel post febres inflammatorias oritur.
- p. 17. Febris intermittens auctumnalis, diutius subsistens, periculosa est; neque tamen minus consultum putandum, febres istas intempestive reprimere. Fufius nunc, de causis februm istarum, exponit, et plurimum, uti iam superius, aeris constitutioni tribuit: haec tamen aequae, ac symptomatum explanationem, repetere breuitas nos prohibet.
- p. 32. In intermittentibus sudorem copiosum euacuationem optimam efficere, et hac, liquoribus tenuioribus copiosius haustis, adiuta, omnem dyscrasiam sanguinis, ipsumque adeo venereum contagium, tolli existimat.
- p. 36. Succedit disquisitio diuersae rationis paroxysmorum, quam vero itidem transire cogimur, quò aliqua ad prognosin spectantia adducendi locus supersit.
- p. 38. In febribus anomalis saepius peccat medicus nimium, quam nihil agendo: expectandum ergo est, ad quam indolem morbus se inclinet. Inter
- p. 40. regulares tertiana saluberrima est, et medium tenet inter quartanas auctumnales, et quotidianas vernales. In curatione notari oportet, febrem anoma-
- p. 41. lam adhuc, neque typos regulares seruantem, vix umquam esse simplicem, sed plerumque cum aliquo quodam fomite morbofo coniunctam, v. c. vernalem, ex dispositione inflammatoria sanguinis et synocha non putri; auctumnalem contra, ex febre biliosa, seu atrabiliaria et intermittente oriri. Iterum de praepostera repressione februm intermittantium agit Noster, et, ad eas reuocandas, vna cum euacuatione primarum viarum extractum fuliginis commendat.
- p. 46. Ex altera vero parte saepius proficuum, imo necessarium

farium est, roborantibus vti, quum solida nimis relaxata sunt, aut debilitas visceris alicuius subest. Praeclara omnino et egregia sunt monita, quae de curandis his febribus proponuntur. Quotidianam p. 54.

veram in auctumno numquam vidit Cl. Auctor : quae in hoc anni tempus incidunt febres, in principio plerumque duplicatae sunt, cum tertianae, tum quartanae : sed multum interest scire, ad quamnam harum specierum referri debeant. Copiose ergo et exacte differentiae inter quartanam et tertianam recensentur. p. 55.

Generatim frigus in illa vehementius est, quam in hac : praesertim rigoris maior gradus signum characteristicum constituit, spasmus in quovis musculo, et rheumatismo in quovis articulo similis. Ex utraque hac febris specie, inter se collatis, concludit Cl. Auctor, febrem tertianam p. 56.

caeteris paribus, ut inflammatoriam ; quartanam contra ut nervosam, tractandam esse. Inde rursus transitus fit, ad veram specificam vim febrifugam medicamento huius vel illius, in dubium vocandam. Cephalalgia, symptoma febrium auctumnalium, potissimum duplicatarum, vel spastica est, sub horrore ; vel inflammatoria, sub calore accedens. p. 58.

Ultima venaesectione indiget, quae tum etiam saepe duplicatam febrem in simplicem vertit. Strangulatio, sub horrore, solo vesicatorio tollitur. Reliqua febrium curatio, admodum prolixè hic enarrata, penitus ad mentem SYDENHAMII p. 63. directa est.

Omnibus consideratis, quae de viribus corticis Peruviani dici possunt, vero similis est, illum p. 71.

effectus febris infringere, quam causam eius remove. Valentius ac citius eodem, in quartanis, quam in reliquis febribus, utendum est, quia illae remediis aliis obsurdescere fere solent, neque umquam salubres, uti tertianae, dici possunt : et si quoque a p. 73.

cor-

- corticis usu obstructions exortas videret Cl.
- p. 75. Auctor, semper tamen eas ope mixturae deobstruentis SWIETENII ex oxymelite scillitico, salibus mediis adiuncto, et superhausti decocti radicis graminis et taraxaci cum melle, resoluit, febre inter tertianam mutata, et tunc suo modo curata. Sed caute monet, nonnisi optimae notae corticem in usum vocari oportere. Postquam amplum locum, super modis, hoc remedium eiusque praeparata exhibendi; ex Cl. ALSTON transcripsit, tandem speciei cuiusdam, sibi communicati, ad febres intermit-
- p. 86. tentes regulares meminit, nempe aranei maioris conquassati, et cum gelatina simplici in bolum formati, post paroxysmum sumendi, et octaua quaque hora, donec nouus paroxysmus expectetur repetendi: quod remedium numquam fefellisse traditum est, et plerumque tribus dosibus, numquam ultra sex febrem profligasse.
- p. 88. 2) *De constitutione inflammatoria.* Sanguis in hac, ex vena emissus, crustam, non a causis externis induit, sed haec, ab ipsa textura sanguinis, certum gradum adepta, vna cum accedente gradu quodam
- p. 90. motus sanguinis in vasis, oritur. Differentia quoque, inter varias qualitates sanguinis, tactu detegipotest. Sanguis phlogisticus admodum elasticus
- p. 91. est, et magnae extensionis capax: vnde saepe iteratae venaesectiones turgescientiam eius vix satis cohibent. Duplicis generis inflammationes ponit Cl.
- p. 92. Auctor, nimirum simplices, quae in corpore plethorico, ceteroquin sano: et complicatas, quae in eodem, iam morbo quodam affecto, eueniunt, qui
- p. 101. tamen, vel a contagio externo cum corpore communicato, vel a deprauato statu fluidorum corporis ipsius oriri potest.

Nunc paucis de differentia causi inflammatorii p. 103.
 et biliosi praemissis, veram notionem methodi anti-
 phlogisticae Cl. Auctor exhibet, et eos arguit, qui
 medicamenta antiseptica, loco antiphlogisticorum
 in usum ducunt: siquidem vel acida mineralia aliena p. 105.
 esse euincit, multo magis corticem ac alia adstrin-
 gentia, refrigerantia. Cum febris iam eo usque de-
 ducta fuit, vt lentoris phlogistici copia generata sit, p. 107.
 numquam Cl. Auctor perfectam crisin observauit,
 quam non primo sensus frigoris alicuius, postmo-
 dum incrementum caloris, ac deinde signa coctionis,
 in hoc vel illo colatorio antecesserint. Rursus de
 noxiis effectibus corticis Peruuiani, sub ingressu sig-
 norum coctionis exhibiti. Cum depositionem pu-
 ris in loco minus apto timemus, resolutio venae-
 sectione, euacuantibus, diaeta tenui, cet. omni modo p. 108.
 tentanda est; cum vero nihilominus pus in hoc illo-
 ve loco colligitur, natura non turbanda, sed simulac
 excretionem molietur, in eadem sustentanda ac iu-
 vanda: inde venae sectionis et antiphlogisticorum
 limites constituendi. Ad febres inflammatorias com-
 positas tractandas, magis prodest nutrimenti paulo
 largior quantitas, simulac periodus suppuratoria p. 111.
 incipiat, quam medicamenta stimulantia, quibus
 nonnisi tunc, quando natura torpescere videtur, lo-
 cus est: imo ne cortici quidem Peruuiano Noster
 fidit.

3) *De constitutione catarrhali.* Haec, ex obser- p. 117.
 uationibus plurium annorum, ab Auctore nostro
 factis, versus finem ianuarii constitutionem inflam-
 matoriam excipit, et sub quadruplici morborum
 specie apparet: nimirum tussis, rheumatismi, erysipe-
 latis, ac dysenteriae. Causae, quae hos morbos
 Anglis perniciosiores reddunt, quam aliis populis,
 in subitis frigoris et caloris vicissitudinibus, vernali
 humi-

- humiditate, et abusu victus animalis, fermentatique
p. 119. potus quaerendae sunt. In eorum curatione, ad gradum inflammationis, et statum solidorum et fluidorum respici oportet, hisque rite consideratis, medendi methodum accommodari.
- p. 128.** Iuniores semel hunc morbum passi, fere semper, redeunte vere, ab eodem rursus afficiuntur, nisi per auctumnum et hyemem, remediis roborantibus, et antisepticis idem praeuertatur, aut, quod optimum est, febre intermittente rite tractata, fomes eius eradicetur: alias recursus hic usque ad vigesimum quintum aetatis annum durare solet. Febris autem intermittens, intempestive suppressa, phthisin pulmonalem inducit, quod exemplo maxime notabili, prolixissime enarrato, Cl. Auctor confirmat. Tu-
- p. 144.** tissimum remedium, ad praecauendas istas recidivas, in itinere in Americam inuenit, vbi eiusmodi aegros commorari oportet, donec vigesimum quintum aetatis annum superauerint. Tandem de auxiliis,
- p. 145.** quibus ii ipsi per tempus aestiui iuuandi sunt, et in acquirendo robore firmandi, differit.
- p. 148.** 4) *De syncho non putri.* Copiosa et prolixa comparatione sententiarum, ex scriptoribus antiquis et recentioribus instituta, apparet, hanc febrem eandem esse cum humorali, seu nervosa nostri aevi
- p. 165.** auctorum. Lentorem morbosum humorum, hanc febrem producentem, non in intestinis ipsis ab indigestione natum putat Noster; sed potius pituitam excrementitiam arbitratur, ex sanguine separatam, et illuc delatam, quae forte, durante vere, non satis euacuata, a natura versus glandulas faucium, et oesophagi, muco secernendo dicatas, determinetur, quum eundem morbum phlegmaticis corporibus sollemnissimum esse, et euacuationibus prophylacticis, quibus Angli uti solent, saepe verti
- con-

constet. Praecipuum auxilium in vomitu et purgatione aluina positum est; quibus administratis, sudores critici, quos levis frigoris sensus praecedat, p. 174. sequuntur: euacuantia vero neglecta, febrem prolongant; et anomalam reddunt, et si illorum loco medicamenta calida adhibentur, symptomata febris miliaris, petechialis et putridae; si autem methodo antiphlogisticae iusto diutius inhaeretur, signa debilitatis vniuersalis, morbum aegre superaturae, sequuntur. Optimum est, rite purgatis primis p. 177. viis, ab omni medicina desistere, et, quod superest febris, naturae soli relinquere. Fusioem horum omnium pertractationem, cui praeter historias morborum multa quoque praeter ordinem v. c. de abusu medicamentorum calidorum, potissimum chemica arte paratorum, de venae sectione euacuantibus praemittenda, de vera notione virtutis cardiacae, in victu et medicamentis, de febre miliari potissimum puerperarum, immixta sunt, nunc omittimus.

Quam diu, remittente febris violentia, signa p. 207. coctionis in vrina non apparent, neque antiphlogisticum regimen, neque purgantium, neque corticis usum aegri commode ferunt: vltimum praesertim medicamentum non, nisi in insigni debilitate, non pro scopo febrem fugandi, sed tamquam cardiacum exhiberi debet. Rursus obseruationes quaedam de febribus intermittentibus vernalibus. Hemicrania frequentior est in hoc anni tempore, quam in reliquis: quodammodo ad indolem synochi non putris p. 212. accedit, et vomitorio adhibito, typum vere intermittentis morbi assumit; febris nonnisi symptomatica eam comitatur aequae, ac inflammatio, et aucta sensibilitas oculorum: venae sectio, sub principium morbi administrata, tempore verno proficua est, auctumnali inutilis; vomitoria morbum mitigant, purgantia exasperant: in auctumno infusum florum cha-

chamaemeli cum elixirio vitrioli: in vere contra cortex Peruvianus morbum leuat, vtrumque tamen remediorum genus in opposito anni tempore noxium est. Hirudinum et vesicatoriorum vsus parcus est: liquorum fermentatorum noxius. Diaeta tenuis vegetabilis, et electuarium ex radice valerianae sylvestris, cortice Peruviano, theriaca, sale absinthii, rheo, syrupo croci, pro re nata variandum, maximam vtilitatem exferunt.

p. 222. 5) *De constitutione putrida.* Humorem flauum, in sanguine praesentem, et bilem, ex eo secernendam, praebentem supponit Cl. Auctor, quem succum biliarium dicit, et ex eo succi atrabiliarii, siquē hic ad intestina deferatur, humoris melancholici notionem declarat: humorem istum quauis aestate et auctumno copiosiore generari, ob varias causas in victu et potu potissimum, et prodere se vrina intensius flauescentis coloris, halitu fetido, cet. et inde originem morborum, quos nunc vberius pertractat, repeti oportere.

p. 228. 6) *De synocho putri.* Primo de notione putredinis in corpore viuo, apud veteres vsitata, differitur, et Cl. SYDENHAMI HUXHAMIQUE doctrina

p. 243. cum istis comparatur: postmodum varios putredinis gradus, a diuersa conditione fluidorum induci ostenditur, simulque de acrimoniis varii generis, inprimis de alcalina, sermo fit. Inter scorbutum, qui

p. 253. in mari, et eum, qui in terra continente grassatur, eam differentiam ponit Noster, quod in vtrouis quidem sanguis dissolutus adsit, sed in illo, a commistione putridi; cum acrimonia salina, in hoc au-

p. 255. tem, cum rancida. Mercurium et regulinam partem antimonii sanguini etiam quemdam putredinis gradum conciliare putat. Disquirat porro causas,

cur morbi putridi Londini nunc neque adeo frequentes, nec violenti sint, quam olim. p. 257.

Prima periodus constitutionis putridae, maio et iunio se manifestans fere a peruerse tractata synocha non putri priorum mensium oritur: SYDEN- p. 259.
HAMIIUS huic periodo generatim nomen febris variolosae imposuit, licet non semper variolae eidem iunctae sint. Varia curationis exempla Cl. Auctor p. 263.
adducit, et cum SYDENHAMII obseruatis comparat.

Signum pathognomonicum huius morbi, in dolore ad scrobiculum cordis adeo exquisito, vt tactum non ferat, ponit. Venaesectione et vomitoria, protinus administrata, ptisanæ acidulae, fructus horaei, serum lactis, mel cet. hisque interposita laxantia, ex manna et tartaro solubili, curationem absoluunt. Putrida istius morbi indoles, adeo contraria est acidis, vt nonnumquam acidam acrimoniam in corpore praedominantem inuertisse ac sustulisse, obseruata sit.

Secundum stadium constitutionis putridae sistit p. 275.
colica biliosa SYDENHAMII: haec non adeo venaesectionibus, quam acidorum vsu indiget: opiatis non, nisi post debitas euacuationes, vtendum esse, serio monet Auctor noster. De aliis colicae speciebus, hysterica seu spasmodica, pictonum, demoniensi, flatulenta, cet. et de signis earum diagnostici-
cis, curandique modo fuse differit, praecipue quod
vsum opii spectat.

Tertium stadium dysenteria putrida constituit, p. 288.
vel simplex, vel cum febre. Vomitorio in hoc morbo tunc demum Auctor noster vtitur, quum de- p. 291.
iectiones serosae, nec adeo multum leuantes, bilis effluxum impeditum esse monstrant; in genere illud magis septembre et octobre, quam iulio necessarium putat, quod in hoc bilis nondum adeo crassa sit, et a maturis tunc temporis fructibus horaeis facilius resoluatur. Vt in omnibus morbis tractandis

- SYDENHAMII vestigia premit : sic etiam in hoc,
 p. 295. omnia experientia confirmata se vidisse, asserit, quae
 ille de eo tradiderit: Frequenter dysenteriae
 aphthae superueniunt, magisque, quam aliis morbis,
 quarum communissima causa, in neglectis ab initio
 morbi purgantibus, aut intempestiuo usu opii et ad-
 stringentium poni debet.
- p. 304. Quartum stadium cholera morbus efficit.
 Opium in ea tunc demum exhibendum est, quum
 materia morbosa potu diluente et clysteribus, vel
 penitus, vel maximam partem eliminata fuit: neque
 eo opus est, ubi vomitus per se cessauit, licet alui
 profluuium adhuc subsistat. In America spasnum
 vniuersalem, cum hoc morbo coniunctum, saepe
 miram quantitatem opii requirere referunt. Mo-
- p. 309. nita quaedam generalia, et annotata in varios erro-
 res, in curandis his morbis commissos, huius tracta-
 tionis finem faciunt.
- p. 321. 7) *De constitutione biliosa.* Origo eius in augu-
 stum incidit, et transitus ex constitutione putrida fit
- p. 327. per choleram, de qua iam dictum est. SYDENHA-
 MII descriptionem febris biliosae repetit, suisque
 annotationibus illustrat. Cl. Auctor. Quum corpus
 tenerioris habitus est, fluidis tenuibus et acribus,
- p. 340. solidisque laxis, corticis usus conducit, qui in sub-
 iectis aliis robustioribus, ubi debilitas a violentiori-
 bus euacuationibus, et defectu diaetae consuetae in-
 ducitur, non adeo conuenit. Sudor profusus utilis
- p. 341. non est, nisi materia biliosa prius cocta, et maxi-
 mam partem expulsa; purgantia autem vel ante
 signa verae coctionis adhibenda sunt, modo prius
 sanguinis missione circulus eius liberior redditus
- p. 342. fuerit. De differentia inter febrem biliosam sim-
 plicem, inflammatoriam, et inflammatorio peri-
 pneumonicam, ab anni tempore, ventorumque va-
 rie-

rietate pendentem, et de curatione, singulo morbo accommodanda. Pulsus, parvus licet, si corpus iunius et valde plethoricum fuerit, venaesectionem p. 343. tamen requirit, qua oppressio leuatur, eiusque effectus vel sub ipsa operatione, sese exserit. Vesicatoria in principio febrium omnium, maxime autem putridarum et biliosarum, aliena sunt, quia p. 344. inflammationem augent, humores acriores reddunt, procliuitatem in sudores symptomaticos promouent, et excretionem aluinam impediunt. Alia res est, cum febris decrescit, et tussis sicca nec sanguinis missioni, nec euacuantibus repetitis cedit. Sic p. 345. etiam opiatas non nisi in declinante morbo, cum diaphoresis requiritur, vtendum est. Catameniorum eruptionem, solito citiorem, in hoc morbo non p. 347. timet Noster, sed pro signo coctionis cognoscit, et saepe criticam fuisse obseruauit.

Debilitatem neruofam, quae post praegressas p. 350. euacuationes cardiaca exigit, melius parco vino, vel aliis potus fermentati generibus, quam opio sustulit. Acidis mineralibus non nisi tunc vtitur, quum p. 351. signa sanguinis dissoluti, seu petechiae adsunt: de reliquo acida vegetabilia, saponacea semper praefert. Cortex non, vt febrifugum, sed vt tonicum p. 353. adhiberi debet, nisi febris biliosa in intermittentem transeat: hoc enim accidere solet. nisi eadem per p. 358. gradus imminuatur, et nunc vndecimo die, nunc prius, nunc decimo quarto, et tunc febrem auctumnalem intermittentem anomalam sistit, duplicatam, vel tertianam, vel quartanam. Quum in febre biliosa, post longas et frequentes purgationes cutis p. 360. admodum dura, et sicca redditur, extremitates aqua calida lauandae, et postmodum, ad mentem veterum, oleo inungendae sunt. Opiata in parciore dosi ves- p. 361. peri danda sunt, cum febris longius durauerit, et aeger euacuationibus et diaeta tenui multum exhau-

flus est : neque tunc purgante opus est, nisi
vrina cum sedimento est, et tunc rheum sufficit.

p. 362. Pauca demum de erysipelate auctumnali addun-
tur, a vernali distincto, quod magis flauī coloris
est, sanguinis missionem non adeo facile fert; sed
e contrario melius purgantibus cedit, iisque post
habitis, facile in gangraenam transit, et, post tertiam
ab eruptione diem, eandem curandi methodum
quam febris biliosa exigit.

p. 364. 8) *De constitutione atrabiliaria.* Hanc ad men-
tem veterum Cl. Auctor, lentori bilioso auctumnali
versus hyemem tenaciori reddito, et obscuriorem
adepto colorem, adscribit. Constitutionem hanc
in duas partes diuidit; nempe in morbum hypo-
chondriacum, et hystericum, cum materia, seu me-
lancholiam veterum; et peripneumoniam notham

p. 367. SYDENHAMII. Ille corporibus strictioribus,
haec laxioribus frequentior esse solet. Arthritis et
haemorrhoides, hoc anni tempore magis, quam
reliquis solemnes, vtrique morbo se adiungunt, et
curationem eius adiuuant: post superatum paroxys-
mum vltimorum horum morborum, exhibitum
purgans crebro feces piceas educit, pariter ac
cum morbus hypochondriacus mitescere incipit:
facile etiam ex priorum genere in morbum alterius
transit v. c. peripneumonia notha in arthritidem
vagam cet. et vice versa. Morbus autem hypo-

p. 370. chondriacus, et hystericus cum materia, caute di-
stingui debent ab eo, qui sine materia est, et fere a
vitio cerebri neruorumque proficiscitur; ne, caus-
sarum scrutinio neglecto, neruina adhibeamus, vbi
deobstruentibus vtendum erat. Inde varia illius
morbi stadia vsque ad delirium chronicum descri-
buntur, causaeque mutationum harum indicantur.

p. 377. Optima curatio morbi, a superueniente febre inter-

mit-

mittente, expectanda est. Morbo hypochondriaco p. 379.
 sublato viso, saepe colica biliosa, imo cholera ipsa,
 licet mitior, accidit, diutius tamen durans, et cre-
 bro recurrens : quae tantum abest, ut antispasmodi-
 cis et antihysteriis cedat, ut potius iis exasperetur.
 In quouis morbo atrabiliario primum momentum
 curationis in diaeta positum est: euacuato humore
 morbofo, balnea frigida, ex aqua marina, imo inter-
 nus quoque eius usus conducunt, quae etiam erup-
 tiones criticas, quas interdum natura per cutim
 molitur, iuuant. Curatio autem quaecumque diu-
 turna est, numquam minor quadraginta diebus, p. 382.
 et interdum super vigesimum primum mensem ex-
 tendenda. In transitu diaeta eorum, qui in ecclesia
 romana vitae monasticae se dedunt, aequae, ac mo- p. 384.
 nachorum inter Turcas, ad praecauendos morbos
 atrabiliarios, et procurandam longaeuitatem aptissi-
 ma, laudatur. Curationis momenta eo redeunt:
 si plethora adest, venaesectio commoda est; sin p. 385.
 materia in ventriculo turget, vomitus aequae ac in
 febre biliosa ciendus; sin in canali intestinorum,
 apozema purgans per vices ingerendum; diaeta
 opus est vegetabili, saponacea, resolvente, prorsus
 exulantibus victu animali, potu fermentato, acidis
 austeris; quouis mane tartarus tartarifatus, ad di-
 midiam vnciam in aqua rosarum solutus, addita
 conuenienti dosi mannae, ut alius bis soluatur, ex-
 hibendus; vel si flatus vrgeant, aquae rosarum
 aqua menthae substituatur, et progressu temporis,
 loco mannae mel addatur; exercitium, viribus cor-
 poris adaequatum, sed semper per gradus augen-
 dum, quotidie suscipiatur, et demum, curatione ex
 voto succedente, aquae cuiusdam mineralis, qualem
 Cheltenhamensem commendat Noster, usus exter-
 nus et internus iungatur. Patientia autem et tar-
 ditate in curando uti oportet, ne praecipitato reme-

- diorum vsu recidiuae occasio praebeatur. Simili curationis methodo, in gutta rosacea inueterata, ipsaque arthritide, radicaliter sublatis, Cl. Auctori
- p. 389. vsus est. Difficillimus status est, si materia haec atrabiliaria ope febris in sanguinis circulo agitur. Nonnumquam tamen eam per vrinae vias excerni
- p. 390. Noster conspexit, adeoque vrinam nigram, non semper pro signo lethali habendam esse, sed interdum tantum morbum atrabiliarium indicare, monet.
- p. 391. Morbus niger HIPPOCRATIS plerumque incurabilis est, spem tamen aliquam curationis facit sapor sanguinis, per vomitum reiecti, si is acidus fuerit, non vero, si fetidus, vel admodum acris.
- A febre atrabiliaria transitum facit Cl. Auctor.
- p. 403. ad tractationem vltimam, quae strictius *de peripneumonia notha* exponit, quae, nunc cum febre atrabiliaria coniuncta, nunc seorsim, deprehenditur. In historia morbi tradenda SYDENHAMII verbis vtitur, eorumque commentarium quasi addit. In duo
- p. 414. stadia eum diuidit, nempe in statum cruditatis, vbi resoluentibus et euacuantibus vti oportet, donec intestina depurata, et atra bilis eliminata fuerint; et coctionis seu suppurationis, vbi residuum morbi in pulmonibus impactum haeret, et expectoratione educendum est: noxiis tum temporis omnibus reliquis euacuationibus, solo forte clysteris vsu, si necessitas postulauerit, excepto. Vesicatoriorum autem in hoc stadio eximius vsus est. Quae vero expectorationem iuuant remedia, vt scillitica, antimonia, mel, oxymel, serum lactis cum aceto vini paratum, halitus calidi, pulmonibus excepti cet. non
- p. 416. nisi eousque continuanda sunt, donec expectoratio rite stabilita fuerit, ne, euacuando materiam crudam, febremque nouam accendendo, aegro noxa inferatur. Eadem quoque cautio in reliquis auxiliis dieteticis ceterisque obseruanda est. Balsama, anodyna, opi-

opiata, ad sedandam tussim exhibita, maxime no p. 417.
cent: si iis expectoratio sublata fuerit, protinus
vena secanda, vesicatorium amplum dorso impo-
nendum, kermes minerale et oxymel scilliticum
crebro, usque ad leniorem vomitum interdum cien-
dum, exhibendum, sero lactis supra memorato, cum
melle remixto, loco potus vtendum, et halitus ex
aqua calida, vel oxycrato frequentius pulmonibus
applicandus est; donec expectoratio iterum succe-
dat. Versus finem morbi transpiratio largior inter-
dum salubris est: ea autem sponte eueniat, neque
villo modo extorqueatur: febris intermittens, non-
numquam morbo huic superueniens, ex solo effectu
in morbum primum diiudicari debet: nonnum-
quam enim eum ipsum, miro modo leuat, nonnum-
quam symptomatica est, expectorationem quocum- p. 421.
que paroxysmo intendit, sed puris non laudabilis,
tenuis potius et deprauati, viribus corporis interim
sensim magis magisque imminutis: tunc corticis
usus necessarius est, qui in priori casu noxius fuisset.
In conualescentia sinapi, et armoracia crebrius vten-
dum Cl. Auctor praecipit, vna cum exercitio cor- p. 422
poris, praesertim equitatione, et diaeta refrigerante,
saponacea, vegetabili, pauca carne, neque eadem pin-
gui addita, cet.

In fine praecipua momenta, ex toto libro colli-
guntur, varia inde adduntur, ac denique medica-
mentorum quaedam formulae subiunguntur.

V,

De phasco obseruationes, quibus hoc genus muscorum vindicatur atque illustratur.

Auctore D. IOH. CHRISTIANO DANIELE SCHREBERO. Ser. Marchioni Brandenb.

Onolzb. et Culmb. a Consiliis. Aul. Med.

Botan. et Oecon. Prof. Ord. in Academ. Erlangens.

Acad. N. C. Hist. Goetting. atque

Socc. Oecon. Lips. et Vdinens. Sodali. Lips.

siae, apud Sigfr. Lebr. Crusium. 1770. 4. pl.

3. Tab. aen. 2.

Singulari industriae Cl. Auctoris, omnibus historiae naturalis cultoribus notae, in structuram partium minimarum plantarum inquirendi, quam rem opus praestantissimum eius de graminibus, aliaque scripta luculenter testantur, debemus iterum nouum specimen disquisitionis, quam maxime accuratae et difficilis, generis cuiusdam muscorum, quod hucusque non satis succincte est descriptum atque traditum a scriptoribus, hoc in genere claris. Non itaque superuacaneum, imo maxime utilem nos suscepturos esse putamus laborem, si breuiter ea, quae in hoc libello continentur, cum Lectoribus communicamus. Occasionem vero ei edendo dedit oratio, qua aditum, ad professionem ordinariam botanices, in vniuersitate Erlangensi, clementissime ei concessam, sibi patefaceret; cui praemisit hanc descriptionem, quam deinde, vt ad omnes perueniret, sub forma singularis libelli, publici iuris fecit. Laudat sub initio eius disquisitiones microscopicas, et exterorum et Germanorum, quorum operam factum est, vt in plantis minima, antea incognita, essent detecta, quibus adhibitis, Cl. Auctor etiam eo peruenit, vt vascula sic dicta muscorum clarius videret;

deret, et inde accuratius reliquis determinare posset.

Omnia vero vascula muscorum, vt vocant, duplici vt plurimum theca composita sunt, altera externa, altera interna, vtraque vrceolata, apice demum aperta. Illius substantia crassior est, et apertura ciliis, seu corona e denticulis distinctis, iuxta se positis, constructa, ornatur, qui, dum hument, introrsum conuiuent, exsiccati dehiscunt et diuergunt. Haec multo tenerior, apice saepius, in lacinias, siue fimbrias plures tenuissimas, diuiditur, inferius cohaerentes, ab impressione ciliorum quasi plicatas, pedicello breuissimo supra fundum vasculi eleuari solet, qui intra thecam continuatur in columellam longam, puluere tenuissimo vndique circumdatum. Vasculi osculum obtegatur operculo conuexo, cilia occultante, tandem deciduo, cuius apici insidet membrana tenuis, conica, in longitudinem fissa, calyptra dicta, quae a maturo capitulo deinde decutitur. Haec in pluribus muscis obseruantur; sunt tamen quaedam varietates ratione ciliorum, quae autem rarius occurrunt. Merita imprimis hac in re Excell. SCHMIDELII praedicat, qui primus muscorum structuram disquisiuit, et exacte explicauit. Notas descriptas eximios exhibere characteres genera et species distinguendi, adeoque ad nouam methodum muscorum viam quasi aperire putat: qua in re etiam Ill. DE LINNE, vt ex litteris eius, ad Cl. Auctorem a. c. 1767. datis, apparet, consentientem habet. Genus vero elegit phasci, quod descripsit, vbi synonyma et species a veteribus traditas, enarrat, et docet, eos ac recentiores species huius generis, sub variis nominibus, ad diuersa genera amandasse, cui rei exemplo sit Ill. LINNAEUS, qui antea ad sphagnum retulit phascum, nunc generi Bryi annumerari id posse putat, in Syst. N. ed. XII.

Examinatis vero accurate capitulis specierum huius generis, omne dubium soluit Cl. Auctor, et proprium genus omnino constituendum esse, euincit.

P. 8. Distinguit vero quinque species, omissis caulescentibus Americanis, foli DILLENIO notis, et reliquis, ab aliis adscitis, plane tamen ab hoc genere alienis. Quas pro genuinis habet, sunt 1) *Phascum* scilicet *subulatum*, caulescens, foliis lanceolato lineari patulis; 2) *piliferum*, caulescens foliis oblongis piliferis erectis; 3) *cuspidatum*, caulescens, foliis ouatis, cuspidatis patulis, terminalibus, erectis, conniuentibus. 4) *muticum*, acaule, fol. ouatis, muticis, concavis, conniuentibus: 5) *serratum* acaule, fol. ouato lanceolatis, planis, serratis, erectis. Primam et tertiam speciem LINNAEUS in Sp. Pl. *Phascum* acaulon nominat, quartam, vt varietatem eiusdem considerat: secundam vero, et quintam speciem Cl. SCHREBER primus descripsit, et inde etiam eas Tab. I. f. 6. 7. et Tab. II. f. 1. 2. naturali magnitudine, atque etiam per microscopium auctas, viuis coloribus depinxit. Iconem porro exhibuit, *cuspidati* et *mutici*, Tab. I. f. 1. 2. et 11. 12. *Cuspidatum* vulgatissimum est, per omnem fere Europam in agris, hortis, ad fossas etc. crescens; praecipue tamen in arena nascitur. *Piliferum* et *muticum* in muris argillaceis, circa Dresdam et Lipsiam; *serratum* vero Lipsiae, in pratis pinguibus, limosis reperit Noster. Prima et tertia species magnitudine, et habitu admodum variant, ita, vt saepius nouas mentiantur species; altitudinem tamen octo linearum geometricarum, prima numquam superat: secunda paulo humilior est, quam tertia, minima quarta secunda porro caespitulos connexiores format, vasculisque granorum sinapis aemulis, flauis, aut rubicundis, minus occultatis, facile se prodit.

Quod

Quod ad partes singularum specierum, earumque mutationes attinet, observauit, radicem basi caulis annexam, nec foliis intertextam, simulque fibrosam esse. Caulis ob paruitatem, minus conspicuus omnibus phascis a Botanicis denegatur; sed eum distincte vidit in *subulato*, sex lineas longum, in *pilifero* et *cuspidato* multo minorem; *muticum* vero, et praecipue *ferratum*, vere acaulia esse, invenit. Caeterum sunt caules erecti, teretes, firmi, glabri, coloris ab initio viridis, demum fusci; cortex cuiuslibet reticulum sistit, substantia interiecta membranacea, crassa, rigida. Folia paucissima sunt, in *ferrato* et *mutico*, infimam tantum partem plantulae cingunt, in reliquis totum cauliculum; reticulum sistunt, ex multis venis, inter se anastomosi iunctis, contextum, longitudinalibus et transversalibus, quarum areolas replet membrana valde tenuis. Figura foliorum ut plurimum quadrata est, admixtis pentagonis, et hexagonis, in oblongum extensis.

Accedit nunc ad partes, fructificationi inferui-
tes, quas constituunt seta, seu pedunculus perbrevis, et capillo, fere tenuior; fila, bulbulo setae adiacentia, a Cl. SCHMIDELIO observata, a Cl. SCHREBERO autem non visa: calyptra porro, quae, ut videtur, cum vaginula bulbilli cohaeret: vasculum deinde gracile, filumque tenue aemulans; capsula, grani nomine etiam nota, ex meditullio setae orta, succo viscido imatura scatens, matura puluere, ex innumeris granis constante, plena; stylus denique, seu columella, basin capsulae intrans, tenera cylindracea. Com-
parationem ultimo loco instituit, inter partes fructificationis muscorum, et antheras pistillaque plantarum perfectarum; ac tempus, quo phasci species inprimis vigeant, definit, quod nempe est, vernale et autumnale. Addita demum est explicatio figurarum valde accurata.

VI.

D. IOH. CHRIST. DAN. SCHREBERI. Ser. Margr.
Brand. Onolzb. et Culmb. Consil. Aul. Med.
Bot. et Oecon. P. P. O. in Acad. Erlang.
Acad. N. C. et Hist. Goetting. Soc. Bot. et
Georgoph. Florent. Oec. Lips. et Vdin. Sod.
Spicilegium Florae Lipsicae. Lipsiae, apud
Dyck. 1771. 8. pl. 12.

Quem ante viginti et duos iam annos in se suscep-
erat operam digerendi stirpes, circa Lipsiam
sponte prouenientes, et quam, magnorum in scien-
tia botanica virorum egregiis subsidiis auctam et
ornatam floram, Lipsiae indigenam, ediderat olim
Noster Cl. BOEHMERUS: eam tamen nondum ex
omni parte perfectam, atque recensione singularum
plantarum absolutam esse, et cognouit, assidua sua
peruestigatione Ipse, et alii, florae deliciis capti ami-
ci, ex quibus nunc, quae in expolienda illa praeesti-
terit, publice proposito, docet Cl. SCHREBERUS
spicilegio. Erat enim Boehmerianum tentamen,
plantas sponte crescentes, ad methodum dispositas
exponendi primum, labore plenissimum, et difficile,
et intra vnus miliaris distantiam, ab vrbe occuren-
tes plantas tantum continebat, quum vero variae
mutationes, vt notum est, plantarum prouentui
nouo et faueant, et deleant alias, mirum esse non
potest, intra longinquum tempus faciem quoque
aliam botanices redditam fuisse, quo partim nouae,
et nunc detectae demum accederent; partim aliae
melius distinguerentur, in primis, quod Cl. SCHRE-
BERUS limites florae Lipsicae vltius proferre, et
ditioni eius subiicere, non dubitabat. Ad quod ac-
cedit, quod in minimis etiam plantulis perscrutan-
dis, ille studium posuerit, valde laboriosum, quod
con-

confirmat magna plantarum, nudo flore instructarum, cohors, hic larga admodum copia adiuncta.

In vniuersum eandem retinuit methodum Cl. SCHREBERUS, quae a Cl. BOEHMERO fuerat adoptata, id est, Ludwigianam, eademque nomina generum et numeros, vt suo quaeque planta loco facile posset inferi. Inter has autem, quae non satis erant determinatae, vel nondum accurate descriptae, studiose distinxit, tum Linnaeanis, Halleria-
nis, tum propriis additis nominibus specificis, quae vbi accesserunt, breuem et aptam simul secum habent plantae descriptionem, quoad eas nempe partes, quae differentias indicant. Nouae denique additae vltimum plantarum Boehmerianarum numerum serie sua sequuntur, ita quidem, vt accessionis ratio pateat. Erant nempe a Cl. BOEHMERO octingentae octuaginta et quinque descriptae, a Cl. SCHREBERO nunc in spicilegio his accedunt tot, vt numerus ad mille centum et sexaginta septem adscendat, hincque augmentum flora nostra, trecentarum et vltra nouarum acceperit plantarum. Ex his aliquae ante, non animaduersae sunt, ex rarioribus quidem Vtricularia, et Orchis coriophora, nec non, quae ad salinas crescunt, et inter marinas solent referri: porro nouum est Potamogeton heterophyllum n. 928. quod *foliis submersis linearibus sessilibus, natantibus lanceolatis petiolatis* sese distinguit, nec cum *natante* conuenit, ob teneritudinem suam, et Potamogetonis graminei latiusculi, foliis et ramificationibus dense stipatis, RAII varietas esse iudicatur. Inter Alines *viscosa* occurrit n. 945. *caule paniculato foliisque pubescentibus, petalis capsulisque calyce pubescente brevioribus*, quae, ob habitum villoso-viscosum, ab aliis similibus, et tenuifolia LINN. recedit. Auenae duae adiiciuntur, species nondum alibi descriptae, nempe strigosa n. 988. quae, *pani-*
culam

culam oblongam, contractam secundam, flosculis geminis, apice biaristatis, dorso arista geniculata ostendit, cuius mentionem in botanicorum scriptis nullam inuenit Cl. SCHREBERUS, et orientalis, n. 987. quae cum hac quodammodo conuenit, paniculis autem densioribus, et crassioribus spiculis differt, quamque panicula coarctata secunda, spiculis bifloris horizontalibus parallelis, seminibus laeuius instructam esse scribit, et quae nuper demum innotuit. Vt alias taceamus, quarum aliquae, in accurata graminum descriptione Cl. SCHREBERI iam propositae, et delineatae habentur. Nouis quippe descriptionibus inter alias, agrostis vniualuis, triticum caninum, festuca speciosa, carex praecox, flacca, cet. illustrantur.

Specierum denique nouarum numerosa admodum grex addita reperitur, inter quas si referantur, quae ad aliud genus pertinent, quam cui plerumque annumerantur, illas etiam nunc seiunctas fuisse obseruamus, vt v. c. Sphagni quaedam species DILLENII n. 777. 779. 780. ad Phasca deueniunt, quorum historiam tradidit singulari scripto Cl. SCHREBERUS. *) Elatine, foliis oppositis n. 932. accessit ad Elatinem, foliis stellatis BOEHMERI; Sium angustifolium, umbellis alaribus n. 505. ab Sio eiusdem numeri BOEHMER. seu nodifloro LINN. solis pedunculis umbellarum differt, in quorum longitudine tamen nobis videtur solum natale. aut incrementum differentiam facere. Phalangio ramoso substituitur Liliago n. 526. Antherici species LINN. quod folia latiora, multo maiora, corollas patentes, pistillum denique declinatum, vt discrepantes notas, offert. Chamaenerii f. *Epilobii* LINN, tres nouae species hic recensentur, n. 1164. sequ. parviflora, rosea, et obscura, quae habitu caulis glabro, villo-

*) vid. supra p. 440.

villosa, foliis sessilibus, petiolatis et decurrentibus, distinguuntur.

In plantis denique nudis, singula fere genera ingenti specierum novarum copia instruuntur, egregiis simul characteribus additis, in quibus detegendis aliorum etiam amicorum subsidia laudat Cl. SCHREBERUS, singulas quum hic recensere nequeamus, libet aliqua specierum nomina adiungere, quae singulari cura emendatae sunt, ut Polypodium molle n. 1027. Polytrichum commune n. 733. piliferum n. 1031. Bryum vnguiculatum n. 1037. deinde crispum, purpureum, pallidum, stellatum, nutans, crudum. Hypni variae species, ex quibus variae species, quae ad Mnium LINNAEUS retulerat, quoque emendatiores apparent, ut complanatum, trichomanoides, rutabulum, striatum, piliferum, stellatum, nitens, polyanthos, serpens, intricatum, attenuatum. Ex Jungermanniis eminet varia, bidentata, bicuspidata, reptans, barbata, pusilla, tamariscifolia. Porro additur Anthoceros punctatus. In fungis notari meretur, Elvela ceratospermum, in Lycopodis multifidum, in Lichenibus, quibus crustaceorum et filamentosorum HALLERUS nomen dedit, radiatus, aculeatus, granosus, pulverulentus, muralis, pullus, pallidus, seruposus, sabuletorum, orbiculatus, angulosus, croceus, flavus, incanus, viridis, roseus; in Byssis coriacea.

Sed satis haec notata specimina probant laboris adhibiti assiduitatem, et florum nostrae in minimis quoque diuitias, id quod ad continuandam industriam, in posterum quoque alios allicere queat debeatque.

Conspectus plantarum florum Lipsicae ordine Linneano, et indices, quibus nomina generum et specierum, tum latina et methodica, tum germanica pro-

proponuntur, faciliori vsui, totum hoc eximium adaptant opus.

VII.

Syſtema morborum ſymptomaticum ſecundum claſſes, ordines et genera cum characteribus propoſitum, a IOANNE BAPTISTA MICHAËLE SAGAR, circuli Iglauienſis in Morauia phyſico Regio. Impenſis Io. Pauli Kraus biblio-pol. Viennens. 1771. 8. plag. 4.

Praemiſit Cl. SAGAR clauem claſſium, ſyſtema ſuum morborum externorum ac internorum ſymptomaticum ſiſtentium, quam et nos hic breuiter tradamus: dein harum claſſium ordines et genera, cum characteribus proponit, ex quibus, vti ſolemus, ſingula ſolummodo ſeligamus. Claſſis *prima* continet vitia, ſeu morbos chirurgicos; *ſe- cunda* exanthemata; *tertia* cachexias, absque febre; *quarta* dolores, ad febres aut phlegmoſias non referen- dos, *quinta* fluxum ſ. exitum inſoliti cuiusuis ſolidi vel fluidi e corpore; *ſexta* ſuppreſſiones ſ. meatuum im- peditionem, hinc excretionum conſuetarum in ſanitate impedimentum, manu chirurgica non cu- randum; *ſeptima* anhelationes, motus ſpaſmodicos iteratos, defatigantes pectoris, cum reſpiratione ſonora, moleſta ſine febre notabili; *oſtaua* ſpaſmos, contractionem vel conſtantem, vel interpolatam, inuitam, muſculorum motum localem efficientium; *nona* debilitates, impotentiam, ſentiendi, appetendi, imaginandi, organa artusque mouendi, more ad ſan- itatem neceſſario; *decima* phlegmaſias, febres cum pulſu duro, dolore topico, inflammatione partis; *undecima* febres, frigus, calorem, pulſum frequentem, reſpirationem auctam, viribus artuum imminutis, de-

pra-

prauatis ; vel solam virium artuum notabilem imminutionem, sine pulsus mutatione, sine euacuatione notabili etc. *Duodecima* et vltima classis complectitur vesanias, errorem mentis in imaginatione, appetitu, iudicio.

His classibus constitutis, genera et ordines morborum Noster persequitur. Atque, cum omnia hic repetere instituti nostri ratio non ferat, in vniuersum monemus, Cl. Auctorem in hac symptomatologia conficienda imitatum esse Cl. SAUVAGES, insuperque nos viginti, et quod excurrit, morbos graecis nominibus, a Nostro iis impositis, nec in Cl. SAUVAGES nosologia methodica repertis, apud Cl. SAGAR deprehendisse. P. 5.

Exempli loco sit haematapoeia, seu macies p. 16.
ex inopia sanguinis, quae ita a Nostro describitur :
successu accedens, virium debilitas, pertinacior an-
gustium sibilus, appetitus languens, facies lurida, epider-
mide pallidissima, alui fluxus, diabetes, sudores subinde
profusi, lipothymiae, tibiae tumidae, quandoque
hydrothorax his succedens, vigiliae, suspiria, animi
depressio, moeror, mortis timor, pulsus vacuus, vti
Cl. LIEUTAUD ac DE HAEN quoque obserua-
runt.

His praemissis, de singulis videamus. Inter ex- p. 15.
anthemata contagiosa numerat aphthas, ac quaerit :
num eae in pudendis obseruatae sint, dum in ore
exstant ? Vidit hoc Noster in suis infantibus.

Ordo *primus* cachexiarum est macies. Atque p. 16.
huc refert phthisin, seu maciem cum amphimerina
tenta, tussi et anacatharsi purulenta, cuius vnam
medicinam forsan dulcamaram Noster iudicat.

Ordo *secundus* fluxuum continet inter alui flu- p. 28.
xus sanguinolentos melaenam, seu fluidi atrii per
superiora, vel inferiora reiectionem, quam Noster
Vol. XVIII. P. III. Ff fae.

saepius vidit. Porro inter feri fluxus pyuriam, seu purulentam, albescentem, aut viscido mucosae materiae mictionem. *Physice*, inquit, *castis bonis aui- bus subin accidit.*

P. 39. *Ordo quartus* spasmodum, spasmos clonicos generales complectitur, ac huc pertinent epilepsia ac hysteria. In hac laudat Noster inprimis oleum destillatum essenziale vulvariae; ac in illa oleum stil- latitium radice valerianae.

P. 43. In *ordine quinto* debilitatum, ubi comata per- tractantur, catalepsis ita describitur, ut sit status soporofus, cum artuum flexilitate, et ad quosvis no- vos situs retinendos aptitudine: Facies tum rubet, oculi fixi aperti, sudor frigidus, respiratio parua, lenta. Quinquies hunc morbum vidit apud mu- lieres, ac vltima vice apud suam uxorem.

P. 45. Phlegmasiae duos ordines constituit, nimirum phlegmasias diuidit, in membranaceas, ut in phre- nitide, atque in parenchymatosas, ut in myositide s. rheumatismo acuto, peripneumonia, hepatitide etc.

P. 48. Febres dispescuit Noster in tres ordines, in con- tinuas scilicet, remittentes et intermittentes.

P. 52. Nostalgiam Cl. Auctor ad vesanias refert. *Car- niolis*, inquit, *patriotis meis, innatus morbus; junior Crisi ipse hocce malo laboravi, anima vix corpori ad- haeret, commercium huius cum corpore fere est subla- tum.* Pari modo huc pertinet hydrophobia, in Cl. Auctoris vxore obseruata, ex metritide typhode h. e. inflammatione vteri, recurrente catalepsi supra de- scripta. Quaerit propterea: an rabies distinctum sit genus, uti Cl. LINNEO videtur?

Summa igitur generum est 340 in hoc syste- mate symptomatico, in vltima vero editione III. de SAUVAGES 315 constituerat; addidit ergo ge- nera 25. Est itaque hic libellus non solum imita- tio operis SAUVAGERI, sed et augmentum. Si vero.

vero nobis liceat dicere, quid nos sentiamus de hoc libello ac de Cl. SAUVAGES, omnibusque eiusmodi libellis, hac methodo conscriptis, intelligimus quidem insignem huius rei difficultatem, summamque in ea studii assiduitatem, potissimum in b. SAUVAGES nosologia methodica; tamen non possumus non fateri, has nimias symptomatum diuisiones plus confundere, quam erudire, atque vero diuisionis fundamento talia systemata destituta nobis videri.

VIII.

Mirum inter caput et viscera abdominis commercium, gradum doctoris medici ambiens, dissertatione, die VIII. iunii 1771. publice defendenda, expendit IOANNES HENRICUS RAHN. Helv. Tigur. Goetting 4. Typis Barmeieri. pl. 16. sine dedicatione.

Postquam in eleganti atque vtilissima hac dissertatione inaugurali, quae quidem multarum rerum nouitatem non prodit, summam tamen Cl. Auctoris studii assiduitatem, optimorumque profecto Auctorum cognitionem, nec non accuratam eorumlectionem prae se fert, partium consensum in corpore humano persecutus est, ac cum Ill. HALLERO exposuit; ad miram inter caput et viscera abdominis contagionem, ex praestantia viscerum abdominalium, et ex insigni humorum, qui ibi praeparantur, mutantur, fecernuntur et eliminantur, diuersitate ostendendam, progreditur, adeoque quosuis capitis morbos, in et externos, ex abdomine ortum suum ducentes, ita pertractat, vt inquirat in consensuales, dolores capitis, oculorumque morbos, narium affectus sympathicos, affectus faciei consensuales, dentium morbos sympathicos, glandularum salivarium

lium, linguae affectus consensuales, spasmus maxillae inferioris consensualem, vertiginem, agrypniam, astheniam, affectus soporosos atque paralyfes consensuales, deliria, paranoicem, maniam, melancholiam, enthusiasmum convulsionesque: ac omnium hic enarratorum symptomatum causam quaerit Cl. Auctor in abdomine, eamque monstrat, ac multis egregisque Auctorum exemplis illustrat. Nos vero, quibus per instituti huius rationem non licet omnia excerpere, quaedam solummodo annotemus, caeterum Lectores ad ipsam dissertationem amandemus.

p. 4. Ita Cl. Auctor incipit a morbis, qui externum caput afficiunt, ac primum quidem dolores capitis consensuales contemplatur. Quorum licet diuersissimae sunt causae, tamen in eo conuenire videntur Nostro, vt, aut circulum sanguinis in vasis abdominalibus impediendo, stricturis spasmodicis ac congestionibus inferuiant, aut stimulo suo ipsos nervos, per viscera abdominalia distributos, proxime afficiant. Quapropter refert inter causas has obstructionem aluinam, quamcunque vitiosam primarum viarum colluuiem, vermes, praeternaturalem sensibilitatem ac irritabilitatem ventriculi et intestinorum, quae spasmis ac convulsionibus producendis inferuiunt, plethoram vasorum abdominalium sanguiferorum, exulcerationes sensibilibus viscerum abdominalium, ac tandem, si earum causa non in cerebro latet, febres phreniticas, paraphreniticas seu neruofas acutiores, vel malignas, de quarum vltiori origine a Nostro differitur. Ex his omnibus Cl. Auctor denique concludit, dolores capitis magis esse sympathicos, quam idiopathicos, eorumque causas tunc in abdomine esse quaerendas.

Inter oculorum morbos consensuales numerat p. 20.
 Noster inflammationem, aliasque ophthalmiae species. Nec minus vero hic consensus cadit in interiores oculi partes, variasque visionis laesiones ac coecitatem ipsam inducit, e. c. mydriasin, quae saepe vermes, in intestinis latitantes, indicat; amblyopiam, scotomiam, nyctalopiam, hemeralopiam, amaurosin aliasque visionis laesae species. Saburra enim primarum viarum euacuata, seu irritabilitate ac sensibilitate nimia per corticem Peruvianum imprimis imminuta, seu spasms abdominalibus sopitis, pristina oculorum acies redibat.

His omnibus ex neruorum communicatione explicatis, atque exemplis declaratis, narium consensum cum abdomine ostendit Noster, ex odoratus vitiis, narium pruritu, sternutatione, haemorrhagiis narium, a causa verminosa pariter, ac ab aliis praecordiorum vitiis pendentibus. Porro huc pertinet grauedo et coryza, vbi Cl. Auctor, dum de curatione quaedam addit, multa habet contra diaphoreticorum vsum in eis. p. 31.

Cum membrana tubae EUSTACHII continua sit membranae internae oesophagi, ventriculi, et intestinorum, praetereaque nerui aurium atque abdominis in consensum rapiantur, facile Noster intelligi posse arbitratur, quomodo ex viscerum abdominalium laesione auditus organon laedi queat. Aurium itaque susurrum atque tinnitum, varias otalgiae species surditatesque inde declarat, atque exemplis confirmat. p. 46.

His perpenſis, ad enarrandos consensuales affectus faciei Cl. Auctor venit. Inter quos praecipue sunt conuulsiones musculorum faciei, ac potissimum quidem risus Sardonius, quem non ex diaphragmatis solum, vti eius inflammationis signum a nonnullis commemoratur certum, sed ex cuiuslibet visce-

ris, quod a neruo intercostali ramos habet, vitiis, spasnum illum per consensum oboriri posse, multis demonstrat exemplis. Nec minus huc pertinet, tremor labiorum, praesertim inferioris, circuli liuidi circa palpebras, faciei rubores, narium rubor, variae maculae, rubor alterius genae in feminis quibusdam, tempore debiti lunaris, genarum pallor; facies naevis, lentigine, baronibus deturpata, nec non et faciei erysipelas, quae omnia praecordiorum vitioforum certa sunt signa.

p. 52. Iam dentium morbos sympathicos cum Nostro tradamus. Esse et inter dentes abdomenque contagionem, apparet ex pusionibus dentientibus, vbi non raro acrimonia, in primis viis collecta, eruptionem dentis retardat. Pariter res sese habet, cum adultorum odontalgis, saepius ex abdomine suam originem ducentibus, vti ex Auctorum exemplis, a Nostro collectis, elucet.

p. 57. Tum glandularum saliuarum affectus consensuales a Nostro examinantur, ac in primis quidem salivationes sympathicae, quae ex stimulo quodam nervi intercostalis, ramis abdominalibus applicato, ad neruum quinti paris et eius ramos glandulis saliuaribus prospicientes propagato, humorum in ipsis circuitum et secretionem accelerante, oriri videntur. Caeterum de ptyalismis, vt crisi accessoria, aliis morbis sese adiungente, hic differitur.

p. 60. Linguae affectiones sympathicae, ex abdominis laesione profectae, sunt diuersissimae. Est enim non solum inter eam et ventriculum consensus, sed et inter reliquas abdominis partes. Hinc tremores linguae, balbuties, aphoniae consensuales considerantur, et sitim ipsam interdum esse affectionem consensualem, demonstratur. In signis linguae autem ad reliqua quoque signa esse respiciendum monet; fusca enim et nigra lingua etiam

in peripneumonicis, et ingratus oris sapor in phthi-
cis occurrunt.

Porro huc pertinet spasmus maxillae inferioris p. 65.
consensualis, infantibus recens natis maxime solemnis,
in calidioribus terrae regionibus frequentior, neque
tamen in nostris locis adeo rarus, pariterque e
vitiis praecordiorum ortum suum trahens. Atque
ita ad finem perducta est tractatio morborum, ex
imo ventre consensualium, qui in externas capitis
partes caderent.

Iam progreditur ad internos morbos cerebri p. 68.
sympathicos, ac incipit a vertigine consensuali, mu-
tuoque capitis cum abdomine, et huius cum illo con-
sensu e. c. vomitio excitata, ex capitis vulnere perpenso,
atque exemplis probato, ad agrypniam consensualem
transit. Quam omnia irritamenta, sanguinis ac spiri-
tuum nervosorum motum augentia, iustamque inde
in encephalo circuitum ac somnum turbantia produ-
cunt. Hoc autem efficit nimia ingurgitatio in
coena, aliaque praecordiorum vitia, a Nostro
collecta.

Vires in iis vigent, quibus venter infimus purus
est, ideoque astheniam consensualem, ab eius im- p. 73.
puritatibus aliisque vitiis profectam, contemplatur
Noster, ac sedulo ad hanc debilitatis causam
esse respiciendum putat, antequam ad cardiaca
aliaque confortantia confugiamus. Porro et eadem
caussa, morbis superatis, refectionem virium inter-
dum retardat, ac tunc omnia roborantia nocent, nisi,
caussa hac sublata, propinentur.

Pertractat hic Cl. Auctor affectus soporosos p. 78.
consensuales, quos saepe, illaeso cerebro, et caussa in
infimo ventre quaesita atque reperta, curatos fuisse,
exemplis multis docet; etiam si modum, quo sym-

pathici hi soporosi affectus oriantur, se nescire fate-
tur. Vtrum colluies intestinales sanguinem visci-
dum reddant, vt facilius vasis cerebri inhaereat, an
eadem et aliae caussae, vt suppressa menstrua,
haemorrhoides, arthridis anomala, mittimus reli-
quas, quas Noster hic collegit, spasmis excitatis,
congestionem noxiam ad caput deriuent, disquirat;
ac putat, posse hoc in quibusdam, non tamen in
omnibus fieri. Hystericarum enim apoplecticarum,
ac febris intermittente soporosa demortuorum alio-
rumque, hac ex causa defunctorum, cerebrum
sanum absque vlla laesione est inuentum. Num ergo a
nimio liquoris neruei, per irritamenta abdominalia,
deriuato flumine, vel ex impedito sanguinis versus
cerebrum affluxu, vel ex neruorum consensu com-
municato minimis medullae cerebri fistulis spasmis,
qui spirituum per illos motum difficiliorem reddit,
deriuandi sunt? Sed nimia obnubilata est caligine
morborum neruorum theoria, quam vt certi ali-
quid atque indubitati possit in iis statui.

p. 90. Causis, a quibus consensuales apoplexiae pro-
ficiscuntur, eae prorsus occurrunt similes, quibus
paralysees sympathicae adscribuntur. Quapropter,
breuiter his a Nostro consideratis, ad deliria con-
sensualia accedit.

p. 93. Atque hic assentitur Noster Cl. TISSOT, qui
inter viginti deliria, tam acuta, quam chronica, octo-
decim ex hypochondriis esse contendit. Quapropter
multa a Nostro hic collecta sunt exempla, ex
quibus, ipsa phrenitica deliria chronica ac acuta sae-
pissime oriri posse patet, illaeso cerebro eiusque
partibus. Caeterum autem minime dubitat de idio-
pathica illorum causa, post inflammationes, metasta-
sin, insolationem, variasque externas capiti illatas
violencias, inducta. Porro et chronica ac periodica
deliria sympathica non raro pendent a sola harum
par-

partium debilitate, ac nimia sensibilitate, spasmiſque inde excitatis, ex acrimonia ſanguini admixta, neruōs irritante aliisque cauſſis.

Multas tandem et diuerſiſſimas conuulſionum p. 110. conſenſualium cauſſas, in abdomine latentes, Noſter pertractat, nec non exemplis optimis, ex Auctōribus depromptis illuſtrat, atque cum Cl. BAGLIVII voto huic diſſertationi finem imponit: „vtinam medici omnium aegrorum hypochondria in morbis attenderent, pauciores certe committerent errores, quam ſp̄reta hypochondriorum obſeruatione. Qui bene nouerit hypochondriorum ſtatum in morbis, quam bene curare nouerit, quam bene praeſagire.”

IX.
Mémoires de l'académie de Dijon. Tome
premier. à Dijon chez Cauſſe. 1769. 8. Alph.
16. pl. Tab. aen. 2.

i. e.

Commentarii Academiae Diuionenſis. Vol. I.

Vti fere in omnibus primariis Galliae urbibus ſocietates et Academiae, ad modum regiae Academiae ſcientiarum Pariſinae inſtitutae ſunt, ita etiam Diuionum capitalis Burgundiae eiſmodi Academia ſuperbit, quae uero non ſcientias tantum, ſed liberales etiam artes colere, ſuiſque laboribus augere, in ſe ſuſcepit.

Praemiſſa eſt primo commentariorum huius Academiae volumini, quod nunc indicamus, hiſtoria eiſdem, ex qua patet Cl. POUFFIER, Decanum (*Doyen*) ſupremi magiſtratus Diuionenſis, anno huius ſaeculi uiceſimo quinto, legato in hunc finem factō, academiam et praemia, quotannis ab ea diſtribuen-

buenda fundasse. Mortuo vero, anno huius seculi trigesimo primo Cl. POUFFIERIO, academia haec, variis in instituto fundatoris mutationibus factis, erecta est. Primum vero conuentum habuit, anno quadragesimo primo, variisque, quae praemiis condecorauit, libellis seorsim in lucem editis, nunc commentariorum in ea praelectorum volumen primum, variarumque obseruationum sibi communicatarum summam publicare constituit. Cum vero in hoc volumine plura contineantur, quae artes spectant, quae ab humanitate nomen habent, iis omis- sis, ex eo tantum praecipua indicabimus, quae propius ad nos pertinent.

Ex obseruationibus historiae Academiae annexis
sequentia notamus :

Hist.

P. 42.

Meteori ignei historia hic traditur, quod a. 1761. d. 11. nou. in variis comitatus Burgundiae locis apparebat. Bolidem illud referebat, cum insigni fragore in plura frustula minora tandem diffi- lientem, ex quorum fragmentorum igneorum vno, in domum delapso, incendium ortum est. Qua oc- casione commemoratur, stellam lambentem, in qua vulgo nil igniferi esse putatur, domum quoque ante aliquot annos accendisse. In comitatu Bur-

P. 47.

gundiae (*Franche-Comte*.) ad locum, qui *Lous-le-Sau- mier* dicitur, insignis copia ligni fossilis, ad lithan- traces colore et odore, si accenditur, accedentis, ad trium quatuorue pedum altitudinem in terra reperitur. Composita vero est haec ligni fossilis fodina ex truncis arborum, in frusta minora ferrae ope diuisis, et fascibus, ita, vt probabile sit insignem aceruum lignorum ad vsum salinarum, quae ante seculum octauum post C. N. in his locis floruerunt, collectum, neglectis his salinis, exterioribus lignis

in

in terram mutatis, mineralisatum esse. Cl. NADAUT p.51:
 probare annititur, argillam ex arenae frustulis vel
 terra vitrescibili componi, et vice versa ex argilla
 arenam vel filices (*grais*) oriri posse, *) In Cam-
 pania Galliae, vbi nulli fere lapides reperiuntur,
 rustici filices minores in fossas profundas colligunt,
 in quibus per aquam pluuialem in pastam argilla-
 ceam rediguntur, ex qua deinde massas lapideas for-
 mant, quibus ad solem siccatis, ad aedificiorum ex-
 structionem vtuntur. Cl. LENOIR fungos non ex p.59:
 seminibus oriri, sed gallarum ad instar ex euo-
 lutione secundaria seminum frumenti oriri posse,
 aliqua obseruatione, in spicis secalinis facta, probare
 annititur. Cl. CHARDENON intersectionibus ten- p.84:
 dineis musculorum rectorum abdominis eundem
 fere vsum, quem Cl. BERTINUS iis adscripsit, ad-
 signat. Eodem fere tempore hic commentarius in
 conuentu Academiae lectus est, quo Cl. BERTIN p.86:
 suum academiae Parisinae communicauit **). Cl. MA-
 RET probat etiam *Diuioni* decimam partem eorum,
 qui variolis laborant, vi huius morbi interire.
 Idem vesicatoriorum in pleuritide et peripneumo- p.93:
 nia vsum commendaturus, monet in spuriis illa, sine
 praegressa venaesectione, applicari posse, quae in
 vera necessario requiritur. Egregios quoque effe-
 ctus ei in dolore inguinis pedumque, ex metastasi
 lactea orto, praestiterunt. Cl. CHAUSSIER mor- p.97:
 bum epidemicum, qui a. 1763. Nouierii (*Noyers*)
 grassatus est, describit. Cataractam radiatam, in p.104:
 qua filamenta alba, radiorum instar, ex nuclei centro
 oriebantur, Cl. HOIN obseruauit. Cum in cata-
 ractae

*) Argillam ex terra vitrescibili constare, magis adhuc pro-
 batum est per experimenta Cl. BAUME vid. EIUDEM
Mem. sur les argil. Conf. Comm. nostr. Vol. XVII. p. 436.

**) Anno 1746 vide Cl. BERTIN. Comment. in Mém. de
 l' acad. des scienc. 1746. p. 393. Comm. nostr. Vol. I.
 p. 300.

- Y 117 ractae depositione lens adhuc mollis, acus ope diuideretur, aeger per aperturam, hac diuisione factam obiecta videre per aliquot dies potuit, sed, post decem circiter dies, haec duo fragmenta iterum vniebantur, et aeger iterum coecus reddebatur. Post aliquot menses rursus lentis, olim diuisae, fragmenta secedebant, vere autem sequente concredebant, et cataracta, nunc firmiore facta, depositio secunda vice tentata, optime succedebat. In corde ouis in abscessu ibidem nato, acus quaedam reperta est.
- P. 109. Cl. HOIN singularem metastasin puris, post ictum, in capite acceptum, ad abdomen vidit. Post vehementes enim dolores, in capite ortos, subito frigidae quasi aquae descensum a capite ad pectus, et ex hoc ad abdomen aeger sensit, et deiectione purulenta facta optime conualuit.
- P. 110. Iuencula quaedam, quae menstrua experiebatur, ad coitum vi adacta est, ex qua re tanta indignatione commouebatur, vt in delirium et hydrophobiam incideret, et tertio die, omnibus remediis frustra tentatis periret.

Iam ad ipsos commentarios accedimus, ex quibus sequentes hic commemorandi sunt.

- Comm. Cl. BARBERET, *de natura et formatione grandinis.*
p. 1.
- P. 95. Cl. MARET Chir. *de utilitate extractionem calculi in lithotomia differendi.* Cum Cl. Auctori, in calculi per ferramenta curatione, aliquoties accideret, vt calculus, quem in sectione ipsa extrahere non posset, elapsis aliquot diebus, facillime eximeret, in causam huius phaenomeni inquirens, cognouit, saepius calculi extractionem aliquot dies differendam esse.

Iam PETRUS FRANCO, post ALBUCASEM et CYPRIANUM proposuerat, vt plaga facta, si cal-

calculus non in eam incideret, vulnus turunda immissa, per aliquot dies apertum seruetur, quo ex eo calculus vel sponte exeat, vel instrumento protrahatur. Haec vero methodus ab eo tempore penitus fere neglecta est; cum tamen ex Auctoris Cl. opinione saepe extractionis dilatio necessaria sit. Causae vero dilationis huius, quas Cl. Auctor vrget, sunt: difficultas extractionis calculi in ipsa operatione, et inflammationis periculum, quod ex frustra tentata extractione, vulneris labiis et vesica contusis oritur, cet. Si vero incisio simplex tantum instituitur, nec labia vulneris aut vesica forcipum immisione laeduntur, suppuratio bona oritur, et calculus vel sponte per vulnus exit, vel in illud incidit, et digito, vel cochleari paruo facillime extrahitur. Raro enim in operatione, hac methodo facta, forcipe opus est. Haec de omni lithotomia valent; repe- **p. 101.** riuntur vero singulares etiam casus, in quibus haec extractionis dilatio absolute necessaria est. Talis vero est in aegris, qui prostaticam scirrhosam, vel fistulas in perinaeo, vel vesicam vrinariam callosam, (*racornie*) vel irregulariter figuratam cet. habent: aut vbi calculus vesicae adhaeret (*pierre enkistée*); nec non in iis omnibus, qui dolorum vehementiam multum debilitati sunt, vel quorum vesica plures calculos continet, aut in quibus plaga nimis parva pro mole calculi facta est. His in vniuersum propositis, pluribusque argumentis illustratis, varias operationum historias Cl. Auctor addit, quae praestantiam methodi illius vberius probant.

Dissertatio de febribus epidemicis, cum historia **p. 125.**
febris malignae petechialis, quae anno huius seculi sexagesimo primo et secundo (in Burgundia et Divioni inprimis) grassata est. Auctore Cl. MARET D. Med.

Con-

Conuenit ea cum febre, quae a HOFFMANNO et medicis Wratislauiensibus a. 1699. a HUXHAMO vero a 1734. obseruata est. Ad febres malignas petechiales putridas, seu neruofas contagiosas HUXHAMI pertinebat, et post tempestatem pluuiosam et calidam oriebatur, atque vel putrida inflammatoria, vel neruosa erat. Cl. MARET obseruationes in suis aegris factas, cum obseruationibus Auctorum hic allegatorum in tabulis adiectis comparat, et exacte cum iis conuenire ostendit. Symptomata vero, ab aliis non annotata, sunt: immobilitas, nec non iactura odoratus et gustus, quam aegri Cl. Auctoris inter 4 et 14 diem saepius experiebantur. In nonnullis sola corporis superficies dolebat, ita, vt leuissimus attactus insignes cruciatus excitaret. Venaesectio in plethoricis tantum profuit: Vomitoria in inflammatoria et neruosa febre in initio semper vtilia erant, atque in neruosa etiam, sub reliquo decursu, repeti poterant, vbi purgantia aliena erant. Corticis quoque et camphorae insignes in hoc morbo virtutes expertus est Noster; in primis vero camphora in diarrhoeis putridis, quae post decimum quartum morbi diem accedebant, vtilis fuit. Vesicatoria raro, et tantum in neruosa febre, adhibuit.

p. 193. *Commentarius de lithotomia, in quo dilatatorium huic operationi aptum (dilatatoire-lithotome) describitur, et methodus illud in lithotomia mulierum, nec non virorum quoque adhibendi, indicatur, variaeque annotationes circa effectus eius communicantur.* Auctore Cl. HOIN. Cum in calculi curatione, in mulieribus administranda, saepe sola dilatatio vrethrae et colli vesicae sufficiat, nonnunquam vero incisione simplici vel duplici quoque opus sit, Cl. Auctor de instrumento cogitauit, quod vtrumque vsum praestare posset. Constat hoc ex duobus brachiis quorum

rum vnum conducens, alterum dilatatorium vocat, et lamina secante, quae ad ductum horum brachiorum immitti potest. In dilatatione lente versatur, eiusque ope calculos insignis magnitudinis protrahit. Si dilatatio incisioni iungitur plaga parua, qua collum vrethrae tantum diuiditur, iam sufficit. In calculo insignis magnitudinis, duplex parua simplici maiori incisioni praeferenda est. Hoc vero P. 254. instrumentum etiam in lithotomia virorum adhibere possumus, si scilicet incisione exteriori vrethram supra bulbum eius aperimus, et ita vrethram eorum similem feminarum vrethrae reddamus, quo facto reliqua Auctor Cl. vt in mulierum lithotomia peragit. Cum instrumentum, Cl. Auctoris quodammodo ad illud accedat, quod Cl. P O V T R E A U descripsit, *) monet Noster se iam anno 1760. hoc instrumento vsum esse.

EIUSDEM, *observatio de tumore carcinomatico in collo mulieris.* P. 295. Ambitus huius tumoris pedem vnum aequabat. Cl. Auctor, incisione circulari facta, pediculum ligauit, et deinde tumorem scalpelli ope penitus extirpauit. Quamquam per tredecim iam annos femina hoc malo laborauerat, tamen cicatricem perfectam, inprimis vsu emplastri de cicuta, obtinuit.

Commentarius de incremento ponderis metallorum calcinatorum, Auctore Cl. CHARDENON. P. 303. Inter omnes, quas de miri huius phaenomeni causis attulerunt celebres viri, opiniones, duae potissimum vero maxime consentaneae videntur: prima, qua putant, particulas igneas moleculis metallicis accrescere, et

*) *Memoir. sur la taille au niveau.* Lyon 1765. Conf. *Comm. nostr.* Vol. XVI. p. 490.

et fixas ab iis retineri ; altera, qua affirmant, sub calcinatione metallorum, varias heterogeneous moleculas ex atmosphaera ambiente in poros eorum intrare. Vtramque vero hanc opinionem multis quae fuse recenset Cl. CHARDENON, argumentis conuictus, dubiam existimat et reiiciendam, atque aliam huius phaenomeni causam commemorat, quam firmis rationibus roborare annisus est : qua solide comprobatur, vnam ac veram causam, per quam, vel calcis metallica, post inflammationem maius pondus, vel calcis eiusdem, post factam eius reductionem chemicam, minor grauitas efficiatur, in principii inflammabilis vel absentia, vel praesentia quaerendam esse.

P. 335. *Observationes de arte vasa porcellana spuria, (Fayence) parandi.* Auctore Cl. BOSC' D' ANTIC. Observationibus his declarat modum, quo in Gallia vasa haec parantur, inprimis curiosiore terrarum electione et praeparatione multum emendari posse.

P. 367. *De usu ex cultura apocyni syriaci (foyeuse) capiendo.* Ex pappo seminum asclepiadis Syriacae LINN, cum lana, gossypio vel serico mixto, panni varii hucusque in Gallia parati fuerunt. Cl. vero Auctor detexit filamenta quoque, in caule plantae huius reperiunda,

P. 375. cannabis loco adhiberi posse.

Commentarius de inoculatione variolarum. Auctore Cl. GVENAUD. Cl. Auctor eam in vnico filio instituit, et hic argumenta, quae illum ad hanc rem commouerunt, et successum insitionis ipsius describit.

P. 403.

Observationes de insecto, quod myrmeleon formicarium, (Formicaleo) dicitur. Auctore Cl. BOULLEMIER. Historiam singularis huius insecti, quod in fos-

fossa conica in arena excavata, habitat, insectisque in hanc fossam praecipitatis victitat, quam Cl. REAUMUR dedit, variis observationibus Noster auget. Eae potissimum ad exuviarum depositionem spectant, quam aliquoties fieri observavit. Reliqua omnia nota sunt, cum ea, quae Auctor Cl. addidit descriptioni REAUMURII, a ROESELIO iam longe accuratius observata et descripta sint.

Commentarius de phaenomenis, quae aer in corporum combustionem ostendit. p. 416. Auctore Cl. DE MORVEAU. Neminem physicorum et chemicorum fugit, plura adhuc in ignis theoria obscura esse, quamvis ea inter praecipuas chemicae artis doctrinas omnino referenda sit. Aerem ab igne pabuli loco consumi Cl. MACQUER in *Lexico chemico* (*), et ante eum iam Cl. HALES in *statica vegetabilium* docuerunt, illudque inprimis comprobarunt extinctione candelae accensae sub campana vitrea, quae aëre non renouato, aut, ut illi volunt, ex parte consumto et vacuo sub campana nato accidit. Experimenta vero Auctoris Cl. probant, aërem non consumi, et hanc extinctionem etiam aëre nouo admisso fieri, atque a rarefactione et condensatione aëris sub campana pendere. Combustio enim tantum in fluido, quod perpetuo cedit, et in focum suum reagit, fieri potest, quo, undulatorio aliquo motu excitato, euolutio phlogisti, adhuc cum corpore accenso combinati, facilitatur, applicatione et actione immediata phlogisti iam euoluti, i. e. fluidum neque minus neque magis elasticum iusto esse debet. Ex p. 432. eodem principio phaenomenon, quod carbo in vase clauso igni expositus praebet, qui, uti notum est, non consumitur, Auctor Cl. explicat. Cl. MEYERUS qui-

*) *Diction. de chymie.*

quidem in egregio suo *de calce* scripto asseruit, carbonem ideo non consumi, quia acidum pingue non interstitia paruae copiae aëris in clauso vase contenti, recipi possit. Auctor autem Cl variis argumentis contrarium probat, docetque acidum pingue, cum vasa intret, etiam ex iis exire posse, et cum semper aliqua aëris portio in vase reperiatur, etiam decrementum ponderis in hoc casu fieri debere.

X.

IOACHIM FRIDERICI BOLTEN, Med. Doct. et Physici Hamburgensis ad Illustrem Systematis Naturae Auctorem CAROLUM A LINNE. Equitem auratum, epistola de nouo quodam zoophytorum genere. Hamburgi sumptibus Viduae Cl. Heroldi 1771. in quarto mai. 1½. plag. tab. aen. viuis coloribus distincta I.

IOACHIM FRIEDRICH BOLTEN *der Arzeneugelahrtheit Doctors und Hamburgischen Physici Nachricht von einer neuen Thierpflanze. Hamburg in der Heroldischen Buchhandlung.*

Nouam zoophytorum speciem hic Cl. Auctor describit, quae structurae simplicitate a reliquis huius generis animalibus maxime differt. Tria vero huius plantae animatae specimina in fretor sic dicto Daudidis, sub gradu sexagesimo nono cum hasta, qua balaena vulnerata fuerat, e fundo maris protrahebantur. Extracta, varia vitae signa corpus suum contrahendo, et haustam aquam euomendo dedebant, mox tamen rigida facta vitaeque priuata sunt. Quamquam autem exsiccata tantum in Auctoris Cl. museum deferebantur, in aqua tamen macerata, in pristinam formam restituta sunt. Duo ex iis
lapi-

lapidi durissimo inhaerent, tertium vero, a lapide separatum, sed illaesum est. Externa forma maxime ad *Vorticellam oviferam* LINN. quam Cl. EDWARDS *) p. 5. depinxit, accedunt. Constant autem corpore coriaceo, colore lateritio, et caule cartilagineae duritiei, qui in duas partes commode diuiditur. Harum inferior caua est, et ex annulis minutissimis componitur; superior vero finditur, et in formam verae spathae mutatur, ex qua corpus originem suam sumit. Hoc in modo dicta spatha apice acuto incipit, vesicamque oblongam aemulatur, quae extremitate obtusa terminatur. Habet vero hocce corpus os prominens patulum, anum prominulum, sphinctere radiato clausum, nec non intestina ori, ano et extremitatibus superiori aequae ac inferiori adhaerentia. Diametri corporum vnum digitum vix excedunt, caules vero admodum tenues sunt, et duas lineas crassitiei suae non superant. Longitudo totius animalis in maiore 13, in minore 12 digitorum est. In maiore corpus $5\frac{1}{2}$ digitos, in minore 3 digitos habet, ex qua mensurarum et habitus quoque differentia, nec non diuersa ani orisque distantia, ad diuersitatem sexus forte concludi posse, Cl. Auctor suspicatur. Corpore inciso, Cl. Auctor p. 8. reperit, cutem e duabus laminis componi, visceraque in corpore contenta esse canales perpendiculares. albicantes, ab imo ad summum apicem extensos, cum intermedio corpore glanduloso flauescente fibris nerueis circumuoluto; cui plurimae fibrillae capillares adhaereant. Ex canalibus duo, qui primum par faciunt, (per paria enim disposita sunt,) acuminato et incuruo principio in ipsa oris vicinia incipiunt, descendunt anum extremitatemque inferiorem versus, adscendunt tunc ante corpus glandulosum, cui hi et reliqui omnes incumbunt, ad summum apicem usque, laterali-

Gg 2

ter

*) EIUDEM gleanings of natur. hist. Part. III. p. 303.
v. Comm. nostr. Vol. XIII. p. 124.

ter iterum descendunt, atque pone modo dictum corpus glandulosum recurrunt, et materia nigra repleti, in unum truncum intermedium descendentem, (qui intestinum rectum sine dubio est,) mutantur. Hi posteriores structura teneriores, illi ante corpus glandulosum positi compactiores, et ex hisce posteriores duo nodosi sunt, anteriorum autem extremitates, quae verae sunt proboscides, extra os producere animal potest, cibum capiendi et ingerendi causa. Viscera non totum cutis, vtrius instar formatae, cauum implent.

XI.

H. D. GAUBII aduersariorum varii argumenti liber vnus. Leid. apud S. et I. Luchtmanns 1771. 4. c. f. pag. 146. sine prooemio et tabulae figurarum explicatione. *

Constituit Cl. Auctor secum, vti ex inscriptione huius libri patet, varia e historia naturali, chemia, et medicina, in quibus considerandis adhuc Noster a quadraginta et ultra annis versatus est, deprompta, proponere. Atque hic initium fecit libro vno, qui decem capita complectitur, quorum summam hic cum Lectoribus communicemus.

P. I.

1) *De aqua maris septemtrionalis orae Belgicae.* Cl. RÜSSELIO**), qui iam diu vsum aquae marinae in morbis glandularum declarauit, Noster excitatus est, ad chemicam analyfin huius aquae instituendam. Ponderis ratio ad aquam pluuialem erat
men-

*) EIUSD. *Entwürfe von verschiedenen Innhalt. Aus den Lateinischen ins Deutsche übersetzt von D. A. M. SIEFFERT. Herausgegeben und mit Anmerckungen begleitet von D. WILLH. HEINR. SEBAST. BUCHOLTZ. Iena 1772. 8. mai m. K.*

**) v. Comm. nostr. Vol. XI. p. 670.

menſe maio, atmofphaera ad gradum 55. thermometri Fahrenheitiani calente, vt 1026. ad 1000. menſe octobri, calore aeris 56. vt 1021. Vtriusque aquae depuratae decem libris euaporatis, ſupererat materies ſalina ſicca, alba, pondere vnciarum quinque et aliquot granorum.

Quinquaginta libris huius aquae deſtillatis, in vafe excipiente collecta aqua cryſtallinae claritatis, nec vllius odoris erat atque ſaporis, nec non ſimplici et pluuiali plane ſimilis. Huius aquae viginti et quatuor libris exſtillatis, vidit Noſter in fundo cucurbitae puluiſculum, ex luteo albidum, quo abluto atque ſiccato, ſubſper ille erat, miculisque veluti ſalinis nitens, duas propemodum drachmas ponderabat. Atque hac aqua exſtillata, in aliam cucurbitam a Noſtro transfuſa, et quiete nec calide per aliquot dies ſepoſita, apparebant in fundo cryſtalluli diaphanae, ſubſaueſcentes, prismaticae, partim hexagonae, abſciſſis extremis, partim irregularis figurae, vix ſapidae, ex parte, aegre tamen, ſolubiles, ſub dentibus durae, ſcabrae, pondere drachmarum trium. p. 3.

Quae vltiore examine videbantur eſſe ſal ſelenites ex acido vitrioli, et terrae quadam ſpecie concretus, quocum tamen minime hoc ſal eſt confundendum. Etenim experimenta, a Noſtro inſtituta, edocent, ſalem hunc acido terreum eſſe, cuius terrea baſis vtrumque et vitrioli, et ſalis acidum in ſe contineat. Quapropter hoc ſal appellatur a Noſtro alumen muriaticum, ac videntur ei omnia omnino ſalia, quae ex acido et terra ſunt compoſita, aluminis nomine inſigniri, eaque, pro terrae et acidi diuerſitate, in genera ac ſpecies diſtingui poſſe. Atque ita hoc ſal a ſelenite differt. p. 4.

Eius cryſtalli cum borace pingui, quem Noſter ex Indiis accepit, ac paulo inferius conſiderat, quo- p. 7.

dammodo conueniunt, ideoque vtriusque cryſtallos in icone addita exhibet.

p. 13. Elicit itaque ex hac aqua marina, analyſi chemica diligenter inſtituta, ac aliquoties a Noſtro repetita, aquam puram; ſalem acido terreſtrem duplicem: vnum ſeleniticum, in quo acidum vitrioli erat, alterum et hoc, et aliquid acidi muriatici continebat; ſalem rurfus cibarium, maximam partem ſincerum et qualis eſſe debet, parte blandiorem, et adhaerente plure materie terrea obtuſum; tandem ſalis mirabilis GLAUBERI veri modicum, quibus et accedebat perparum materiae pinguis, quae non alio indicio, niſi poſtremi craſſamenti, fuſco colore, apparebat. Praeterea autem nec vllam pinguitudinem vel bitumen Noſter deprehendit. Cl. RUSSELLIUS enim aquae maris tribuit ſaporem falſum, amarorem, nitroſitatem et vinctuoſitatem; Noſter vero praeter falſum ſaporem, reliquas qualitates, a Cl. RUSSELIO commemoratas, vel plane non, vel admodum obſcure detegere potuit, in ſuo huius aquae examine chemico. Quapropter et putat Cl. GAUBIUS, huius aquae marinae vim medicam non cerni in reliquis qualitatibus, ſed ſolummodo in falſedine, quae comparari poteſt cum ſale communi, multa aqua ſoluto. Quod ideo, addito pauco ſale mirabili GLAUBERI aqua dilutum, aquae marinae ſubſtituit.

p. 16. Ex quinquaginta libris aquae marinae accipit ſalis cibarii, et meracioris, et terreſtris, vncias viginti, drachmas quatuor; ſalis ſelenitici et aluminis muriatici vnciam vnā, drachmam vnā; ſalis mirabilis GLAUBERI vncias duas; drachmas quatuor. Singula itaque libra in ſe continet ſalis cibarii drachmas tres, et propemodum grana ſeptemdecim, ſalis vtriusque ſelenitici grana decem, mirabilis GLAUBERI grana viginti quatuor. Atque ſalium acceſſoriorum quantitatem tam paruam, virtutes marinae

nae medicatas magnopere intendere, non putat Noster.

Quamquam Cl. Auctor fatetur, posse sibi obiici, P. 18.
hoc examen fortasse non cadere in aquam marinam
omnium orarum; tamen non adeo aquas marinas,
ratione salinae earum indolis, inter se differre posse
credit. Interea autem optat Noster, ne quis hoc
suum examen nimis extendat, Anglosque et Gallos;
inter quos praecipue Cl. POISSONNIER DESPERIE-
RES *) nominatur, cum Nostro consentire de in-
dole aquae marinae, asserit. Quod usum huius
aquae attinet, putat quidem posse eisdem morbis
conducere, quos Cl. RUSSEL **) vult; mauult tamen
praecipuos eius aquae effectus, a facultate septica de-
riuare. Pro vario igitur falsitudinis gradu aut
septicam exserit, aut antisepticam vim. Mentio-
nem hunc in finem iniecit Noster hic ex-
perimentorum Cl. PRINGLE cum sale communi,
atque arbitratur, diuturnum usum falsamentorum
posse scorbuti genesi seruire, licet ille non ab hac
re solum provenire Nostro videatur.

2) *Sal aromaticus, natiuus ex oleo corticum mali aurei Curassauici.* P. 27.
De oleo cinnamomi sponte,
et aromate suo immutato, in sal conuerso, iam in
philosophicis transactionibus dictum, et a Cl.
BOERHAAVIO repetitum est. Simile exemplum
hic Noster describit, quo ex cortice mali aurei
oleum posse elici, testatur, quod sponte nulloque
plane artis adminiculo, in genuinum salem abiit.

Est autem huius salis indoles plane singularis, P. 34.
nec cum villo profecto sale cognito comparari po-
test. Semiuolatilis quidem est, atque hac ex parte
cum sale ammoniaco videtur conferri posse; habet
praeterea tamen nullam, cum eo communionem.
Sed essentialis sui corticis, cuius aroma lingua sen-

Gg 4

tit,

*) vid. comm. nostr. Vol. XVII. p. 95.

**) vid. l. c.

tit, sali huic inesse videtur; caret tamen acrimonia, quae in oleo se prodit. Inde elucere Nostro videtur, igneum illud, quod olea aromatica plus minusve continent, non ad aroma ipsum, sed ad principium phlogiston, quo inuoluitur, pertinere. Admiratur profecto Cl. Auctor, in suo sale, ex merco oleo nato, tam parum phlogisti fuisse, ut alendo igni minus inferuiuerit, quam saccharum.

p. 35. Variis de salis huius origine sententiis allatis, hoc notat Cl. Auctor, oleum mali aurei recenter pressum, excolor et fluidissimum, vetus illud fuscum et balsami ad instar crassum fuisse, facile alcohole vini et aqua solui potuisse, nec aqua turbidum redditum fuisse.

p. 36. 3) *De nuce aromatica, vulgo moschata.* Nucibus his, aqua digestis, ac reiteratis vicibus destillatis, Noster elicuit oleum aethereum, bene olens, ac communi plus minus volatile. Oleum enim huius nucis expressum, rectius Nostro videtur butyrum appellari. Qua occasione succorum vegetantium pinguium, ut olea, fluida, balsama nativa, pices, butyra, cerae, concretiones camphoratae, et resinae sunt, reddit rationem.

p. 38. Inest huius nucis oleo destillato materies, camphoram referens tactu quidem, non tamen odore, quae separata butyri similitudinem prodit. Scatet haec materies aromate nucis, aqua non soluitur; alcohole autem vini facillime soluta, aquam affusam sine ulla turbatione fert. Prunis imposita primum quidem suauem nucistae odorem spirauit; denique tamen butyrum, sub cinere calido fumans, oluit. Butyrum igitur volatile nucis myristicae dici posse, Noster existimat, ac miratur Cl. HOFFMANNUM, in observationibus physico-chemicis, hoc non attendisse. Quapropter quoque in eum locum, ubi ille

de

de oleo destillato nucistae differit, breuiter est commentatus.

Hac a destillatione materie residua frigesacta, p. 39.
densa in summo liquoris membrana conspiciebatur,
griseo lutea, qua separata et ficcata, luteola quasi
adeps, friabilis, igne liquens, et instar seui animalis,
male olens, omni prorsus aromate, tam quoad gu-
stum, quam quoad olfactum destituta.

4) *De instrumento clysmatico, ad fumum nicotianae* p. 45.
in anum impellendum. Cum constat fumum nico-
tianae per anum immissum, colicis spasmodicis, her-
niosis et aliis atque aliis morbis neruosis, praecipue
autem aquae mersis, valdopere conducere, instru-
mentum simplicius minusque sumtuosum, quam Cll.
SCHAEFFERI et HAEN, hic describit. Constat
solle communi eoque duplici vel composito, qui
fortius, in et expirando fumum agit. Cum vero
sine icone, quam Noster addidit, vix perspicue
possit describi, praeterimus hoc instrumentum, ac
hoc vnicum addimus, nos simile, eidem vsui accom-
modatum, in Harlemonsibus commentariis *)
vidisse.

5) *Seminum piperis nigri examen.* Cum plera- p. 55.
que aromata non solum spiritu rectore, qui olfa-
ctum et gustum afficit, sed aliis etiam dosibus, inter
se multum differant, Nostro placuit inuestigare,
num grana piperis Indici prae cacteris singulare
quid contineant?

His feminibus itaque digestis primum, dein de- p. 56.
stillatis, oleum fere excolor recens, vetus tamen in
aureum vergens colorem, totum fluidum, nec in

Gg 5

cam-

*) VIII. Deel II. St. p. 252. v. nostr. Comm. vol. XVII.
p. 139.

camphoram, nec in butyrum concrefcens, forti piperis odore ac fapore quidem fimili, blandiore tamen, nec tam diu linguae inhaerente, ac fi piper masticatur. Ex vna piperis libra, non vltra drachmas duas olei accepit. Quod fi vero loco fimplicis aquae deftillatam huius olei adhibuit, tres ex libra drachmas olei naftus eft. Ad libram vnam piperis contufi, fapida materia priuandam, debuit vltra quingentas et quinquaginta aquae libras impendere in coftionibus, et cuiusque coftionis liquor ad quadragesimam ufque tanto erat acore, vt piperis faporem per plures horas lingua fentiret.

p. 60. Cineres piperis falem fixum alcalinum, qui a Nostro ficcus appellatur, et aliquid falis continere, Nostro videntur. Alkali fixum humens vegetabile certo non cognofcere potuit, ob materiae paucitatem.

p. 63. Id, quod piperi faporem conciliat, tum fpirituofe, cum aquofe foluitur menftruo. Hoc difficile, illud non folum facilius, fed et melius deprehenditur. Refina itaque inefle videtur piperi, gummosae ac infipidae materiae immixta, cuius interuentu aqua foluit piperis femina. Nec minus inde explicat Nofter, cur tanta aquae copia, et tam crebrae coftiones requirantur, ad piper omni fuo fapore priuandum.

p. 67. Piper differt a ceteris omnibus Indicis aromatibus. Horum vis ignea, fapida et fimiliter odorata, tota eft calore aquae ebullientis volatilis, huius e contrario fixa. Omnium horum olea effentialia particulas eas, quae guftum et olfactum afficiunt, concentratas produnt; piperis oleum leniffimum cernitur. Immerito igitur foli fpiritu rectori qui oleis effentialibus potiffimum inefl, odor faporque debetur.

Pipe-

Piperis oleum, ob eius lenitatem, non inter calefacientia et sanguinem exaestuante esse referendum, nec ventriculo aestum conciliare; sed potius inferre vim refrigerantem, quam et Indi piperi tribuunt, asserit Noster.

6) *Radix Indica, a IOANNE LOPEZ denominata, p. 78.*
praestantissimum ad alui profluuia remedium Haec appellatur *rais di* IUAN LOPEZ ac commendatur ab Indis in alui profluuiis. Cuius effectum Cl. Auctor quoque salutarem inuenit, in fluxibus ventris fere omnibus, imo in diarrhoea colliquatiua tabe pulmonali affecti, ac hic exemplis confirmat. Alio atque alio modo eam propinauit aegris, optime autem in puluere ad drachmas duas.

Eius arbor est incognita, item locus natalis. p. 88.
 Alii Goae indigenam esse perhibent, alii Malaccae insulae propriam hanc arborem volunt. Radix, quam Noster accepit, erat exsiccata, non vltra pollicem et minus crassa, aridaque. Lignum erat albidum, perquam leue in minoribus ramulis aequabiliter compactum, in maioribus mollius, qua proxime subest cortici, atque spongiosum et albidius, medullam complectitur duriores, densiores ex albo subrufam. Cortex rudis, rugosus, fuscus, mollis, quasi tomentosus, satis crassus, tenui cuticula pallidior extrinsecus obductus.

Balsamus resinae, nec in cortice, nec in ligno p. 90.
 erant. Odor nullus singularis neque sapor. Aqua eius erat flaua et quodammodo amara; oleum eius, nec saporem, nec odorem prodebat, et salis essentialis portio erat tam parca, vt vix examinari posset.

Alcohol vini fusco colore tangebatur, praeterea p. 91.
 nihil extrahebat. Aqua affusa turbabat liquorem, et materiam oleosam indicabat. Spiritu hoc, destil-

lan-

lando abstracto, supermanebat aliquid balsami simile, igne tumens, bulliens, ardens, saporis opio similis, leuiter amaricantis. Vnde et vim huius medicinali in ventris fluxibus, quaerit Noster in facultate torpefaciente. Nam aliam vim huic radici non adscribit.

p. 92. Cineres huius radicis erant albissimi, quibus elixatis, alcali fixum remanebat, cum pauxillo salis cibarii. Alcali fixum erat illius indolis, quod cum acido vitrioli salem mirabilem GLAUBERI exhiberet, natum forsan ex sale cibario, per vim ignis suo acido priuato. Simaroubae anteferendam putat Noster hanc radicem, eamque valentioorem iudicat. Praeterea ramulos radicis graciliores crassioribus praefert, quod minus spongiosi, nec carie obnoxii sunt.

p. 99. 7) *Camphora Europaea menthae piperitidis.* Non in omnibus plantis Europaeis, e quibus camphora elici fertur, camphoram inesse cum Cl. NEUMANNO asserit Noster. E mentha autem piperitide veram camphoram destillando Noster elicit, quae odore, sapore, volatilitate ad ignem, consistentia fragili potius, quam molli, butyracea, veram camphorae indolem prodebat. Quamobrem thymum et mentham piperitidem solummodo inter plantas camphoriferas refert.

p. 104. Mentha vero piperitis debet maturrima esse, riteque exsiccata. Destillatione enim recentis peracta, aqua erat valde aromatica, olei aetherei multum, concretae camphorae nihil. Cuius aqua et oleum, per annum conseruata, nihil camphorae ostenderunt. Atque hoc quaerit in viriditate recentis plantae, indeque euenisse putat Cl. Auctor, vt nemo chemicorum de hac menthae specie, cuius
vsus

vsus medicus per aliquot tempus inclaruit, assereret, camphoram ei inesse.

Plures in Indiae regionibus plantae camphoriferae crescunt, inter quas arbor cinnanomaea Ceylanensis principatum tenet, ex cuius radice vera camphora emanat, quae rarius ad vsum communem adhibetur, potius musaeis curiosorum inseruit. Duae autem sunt camphorae species, communi vsui ab Indis dicatae, quarum vna eaque praestantissima est *Sumatrana*, altera pretio longe inferior *Iaponica*. Haec Indico commercio in Europam defertur, camphoraque rudis vel bruta dicitur, hodieque Amstelaelami depurata, et in panes formata, venditur. Illa ad nos non peruenit, sed ad Iaponenses, et ab iis in vsum minime notum conuertitur.

Arbore, camphoram Sumatranam seu baros ferente, descripta, haec ei tribuitur indoles. Postquam nimirum per plures annos floruerit, in ramis sponte fissurae apparent, e quibus liquor stillat oleosus, qui appellatur camphora. Id quod indicat maturitatem, ideoque oleum hoc colligunt in vasculis, ex Bamboes paratis, quo collecto, ritibus quibusdam superstitiosis praemissis, rami finduntur, et id, quod non exstillare potuit, abraditur et colligitur. Tum hanc camphoram, in tres veluti species separatam, ad Belgas deferunt venalem. Prima species dicitur Malaice *Pikkol*, *Copalla*, Lusitanis *Cabessa*, quod caput quasi denotat; altera granis minoribus *Poeoret* Malaice, Lusitanis *Bariga*, quod ventrem significat, ramenta tandem tertiae speciei impura *Cacki* i. e. pedes, nominantur. Haec ad naturalem historiam camphorae pertinentia, ab amico Cl. Auctori sunt tradita, atque hic inserta.

8) *Luna fixata* LUDEMANNI. Qui erat su-
tor, dein medicus astrologus ac chemicus, apud
Amste-

Amstelaedāmenſes clarus, dum hoc arcāno multos ſanauit. Erat puluis, quem, poſtquam examinauerat, ac flores zinci eſſe viderat Noſter, aegro permīſit, qui Noſtrum ideo conſuluerat, ſumere. Licet enim Noſter, nec quidquā de uſu interno florum zinci audiuerat atque legerat; tamen ex chemicis fundamentis iam dudum cognouerat, hos non eſſe cum arſenico comparandos.

P. 118. In morbis ſpaſmodicis profuit hic puluis, ideoque ſingularis ei tribuitur antiſpaſmodica vis. Epilepticos autem non iuuat. Inter multa exempla, ex quibus huius pulueris vis antiſpaſmodica eluceſcit, a Noſtro hic tradita, puellae decem annorum, inſigni neruorum debilitate affectae, et multis morbis neruoſis vexatae, mentionem faciamus, quae, omnibus propemodum antiſpaſmodicis remediis fruſtra adhibitis, hoc puluere prorsus ſanata eſt. Poſſit floribus zinci ſubſtitui nihilum album. Vtrūque autem raro pharmacopaei habent genuinum. Noſter itaque confecit flores ipſe, ex Indico zinco potius, quam ex germanico ac methodum ſuam hic addit. Acidum infringunt flores zinci, ac de externo eorum uſu in ophtahmiis conſtat, eos adſtringere vaſa, indeque nimium affluxum humorum coercere. Quapropter infantibus, ob acidum primarum viarum conuulſis, vtilitatem attulit et, dentitione laborantibus plus flores praeſtiterunt, quam liquor cornu cerui ſuccinatus a SYDENHAMO laudatus. Granum integrum non ferebant, ſed vomitus excitabatur. Igitur per partes, et aliquoties de die, propinabat hoc remedium.

P. 124. 9) *Nonnulla de oleo vitrioli.* Oleum vitrioli vulgo venale peregrinis rebus inquinatum eſt, a quibus nullo modo, niſi deſtillatione liberari poteſt. Quapropter eam commendat, et hic deſcribit facilem, ac minus periculofam deſtillandi olei vitrioli methodum.

10) *De*

10) *De sale ammoniaco Indico et borace quaedam.* p. 138.
 Proprium habent Indi ammoniacum, ac quidem natium et factitium. In regione Napal, ad septentrionem Pattenae sita, locus est, cuius aquae spumam eructant, quae, in litore congesta, aere arefcit, ac induratur, natiumque exhibet boracem. Quod si vero haec spuma coquitur, sal ammoniacum obtinetur. Cl. Auctor, cui hoc amicus tradidit, non intelligit, quomodo ex vna eademque materia, hi duo inter se plane diuersi sales educi queant? Putat igitur, coctionem saltem hic sublimationem significare debere. Vtut vero haec res sese habeat, illud Nostro, teste amico, certum videtur, boracem ex illa regione ad Europam nauibus Indicae societatis deferri, ac huius iconem in figura decima dedit. Hoc est natium Indorum sal ammoniacum, iam de factitio videamus.

Hoc natiuo minus carum, ac facilius paratu, in p. 142.
 eodem imperio Indostano habetur. Nimirum ex stercore humano, cui admiscant vaccinum aliorumque animalium stercorea, paratur, ita, vt, straminibus interpositis, placentas in furno, lateribus coquendis destinato, vrant. Tum reperiuntur glebae salis ammoniaci (*Nousadder*) ab incolis dicti, ac praeter vsus rei metallicae, ad pertinaces capitis dolores compescendos illud adhibetur bono cum successu. Sumunt nimirum salis particulam pisi magnitudine, cum aequali pondere calcis viuae, quibus in tenuem puluisculum tritis, hunc naribus attrahunt, et, humoribus proleclis, promptum sentiunt leuamen.

Hae duae species salis ammoniaci, Nostro missae, p. 143.
 et ab eo examinatae, ostenderunt naturam salis ammoniaci veram, nec inter se differunt, nisi quod factitium natiuo minus transpareat, impurius ac minus compactum videatur. Addit tandem et
 Ger-

Germanicum sal ammoniacum, Aegyptiaco autem maiore pretio, ac putat Noster, fuliginem vbique materiam dare, ammoniaco sali parando idoneam.

XII.

Seltene und hoechstmerckwürdige Wahrnehmung von einer samt den Kinde ausgefallenen Gebärmutter, nach einer neun monathlichen Schwangerschaft, nebst gehörig angewandter Geburtshülfe, wodurch Mutter und Kind beym Leben erhalten worden von WOLFGANG IACOB MÜLLNER. Nurnberg bey George Peter Monath 1771. 8. m. K. Seiten 32.

i. e.

Rara atque notatu dignissima obseruatio de descensu vteri cum fetu etc. Auctore WOLFGANG IACOB MÜLLNER.

Auctoribus nominatis, qui partim prolapsum vteri affirmarunt, partim negarunt, Cl. Auctor exemplum commemorat, quod sibi differre videtur quodammodo ab iis, quae in Auctoribus reperit. Bis omnino Nostro data est occasio pro-cidentiam vteri obseruandi. Primam obseruationem inseruit actis nouis naturae curiosorum *), alteram hic tradit. Erat descensus vteri cum fetu, qui sequebatur post dolorem insolitum, in abdomine exortum tum, cum aegra ex profundo fonte hauriebat aquam. Repositio huius cum fieri nequiret, fomentationes suadebat, ac, doloribus ad partum apparentibus, et aquis sistentibus, manum tumido collo vteri descendenti immittebat subinde, ac manu

*) Tom. II. p. 538.

manu fetus, qui collo vteri inerat, reposita, versio-
neque facta, partum Agripparum feliciter instituit,
ita, vt vita fetus, licet brevis, et matris seruantur.
Fetus enim paulo post obiit. Secundinis ob adhaesio-
nem extractis, fomenta iterum applicabantur, ac re-
positio vteri ex voto Nostro succedebat, et adhibitis
dein remediis, aegra sanitati prorsus restituebatur.

Notatu dignum itaque Noster iudicat hoc p. 29.
exemplum, quod cum aliis similibus comparauit,
ideo, quoniam in tam prolongato ac tumente
vteri collo, vti ex addita figura patet, nulla opus
fuit incisione, sed manu hic partus praeternatura-
lis absolui potuit; dein, quoniam, situ fetus non na-
turali, versionis ope partus Agripparum ita feliciter
successit, vt infantis vita atque matris, licet illius
brevis erat, conseruantur; tandem, quod, secundi-
nis ob adhaesionem extractis, vterus reponeretur,
et aegra pristinam nanciscebatur sanitatem.

Vteri descensum ac polypum ita Noster distin- p. 30.
guit, vt polypi repositio prorsus fieri nequeat, cuius
et tentamen quoque aegrae valde est dolorificum,
vteri e contrario repositio facili negotio atque sine
vllis doloribus praestari potest. Polypo porro
antecedit haemorrhagia, interdum et fluor albus.

XIII.

Examen chemicum doctrinae Meyerianae de
acido pingui, et Blackianae de aere fixo re-
spectu calcis, auctore NICOLAO IOSEPHO
IACQUIN, I. C. R. et A. Mai. in re metallur-
gica et monetaria a consiliis etc. Vindobon.
1769. 8. pl. 6.

Ariter hoc libello impugnat Cl. IACQUIN, Bla-
ckianae causae industrius defensor, sententiam
Vol. XVIII. P. III. H h Cl. MEIER

Cl. MEIERI de acido pingui, quod sumptum ipsi potius, quam probatum videtur. Contendit nimirum, calcareum crudum mutari in calcem viuam neutiquam per ingressum acidi pinguis, sed per egressum aeris fixi, igne excussi; calcemque viuam recrudescere, reddito aere, quem auidissime ob affinitatem attrahat; omniaque, tum calcis crudae tum viuae phaenomena, interque haec causticorum quoque effectus, tum proprios viuae calci, tum salibus alcalinis mutuo datos, aeris absentiae tribuit.

P. 17. Deuenit vero in hanc sententiam suscepta calcarei destillatione, in vasis terreis valido igne peracta, haud bene, vt vult, a MEIERO neglecta. Viuidit de calcarei crudi vnciis triginta duabus surgere aquae insipidae, subodoratae, sale alcalino volatili pauco praegnantis vncias circiter duas; adaucto vero igne expelli materiam elasticam, quae, excepta lagenulis, excipulo rostrato appensis, solutiones in illis contentas acidas, alcalinas, metallicas non turbaret, purus igitur aer elasticus esse videtur.

P. 23. Residuae in retorta glebae, penitus in viuam calcem mutatae, pondus erat vnciarum septendecim, vt adeoque, si duae vnciae aquae egressae simul computentur, tredecim vnciae materiae istius elasticae supra dictae calcarei portioni inhaeserint.

P. 25. Quae quidem ingens aeris moles, volumen calcarei hospitis sexcenties et quadragies sexies superans, ne mira videatur nimis, vindicatur ab Auctore enarratione breui doctrinae de aere fixo et elastico, corporibus inhaerente, quam hic repetere non licet.

P. 40. In alia destillatione, neque tamen ad aeris usque eruptionem protracta, calcareus in retorta crudus remansit; post egressum vero aeris, neque tamen omnis, interrupta frustula calcarei extus veram calcem viuam, intus crudam obtulerunt. Vnde

con

concludit Auctor, aeris absentia fieri calcem viuam, minusque ponderosam; fassus, se non intelligere, cur acidum pingue, secundum MEIERUM largiter calcem ingrediens, pondus eius non augeat?

Uterius vero confirmare fatagit sententiam P. 43. suam Noster ex eo, quod, aere reddito, calx viua recrudescat, absque ullius heterogenei egredientis documento. Viua enim calx, in atmosphaera diu locata, rursus cum acidis feruet, et destillata elasticum vaporem dimittit, insimulque reuiuificatur. Hinc, quum aqua calcem nonnisi viuam, crudam nunquam soluat, patere dicit cremoris in aqua calcis aeri exposita genesin; nasci nimirum cremorem, qui eadem offert cum crudo calcareo phaenomena, ex redeunte per attractionem in affinem calcem aere.

Sub aqua detenta calx viua manet, quia aqua P. 51. arcet aerem atmosphaericum; causam vero, cur calx aerem aquae elasticum non in se trahat, reperire Cl. Auctor nullam potuit.

Si aer fixus, qui per efferuescentiam commixti P. 55. spiritus nitri et salis tartari cum restituta elasticitate purissimus excutitur, inque lagenulam, aquam calcis continentem, deriuatur: aut si in destillatione glebae calcareae fugiens in vasculum, aqua calcis plenum, et excipulo rostrato alligatum, ingreditur, aqua calcis turbatur, cremor nascitur, neque acidum pingue hic ullas edit praesentiae suae notas.

Causticam indolem conciliare calcem salibus al- P. 61. calinis contendit Cl. Auctor, non addendo illis acidum pingue, sed demendo illis aerem inhaerentem. Habet enim tum lapis causticus, tum spiritus salis ammoniaci causticus omnes alcalinorum dotes; vnica deest cum acidis efferuescentia, quae nimirum ob aeris, a calce attracti, defectum fieri non posse videtur. Reddito vero per superiores encheireses P. 71.

aere, sal vterque causticus mitior fit, cumque acidis
rursus feruet.

p. 75. Porro ostendit Cl. IACQUINUS calcareum
crudum ex sale ammoniaco abigere alcali volatile,
adeoque acidum pingue neutiquam esse illud, quod
salem ammoniacum in suas resoluat partes consti-
tuentes: aerem ad crySTALLISATIONEM facere plurimum,
rationemque, cur sal alcalinus, vrinae additus destil-
landae, expellat volatilem microcosmici salis partem
sub forma solida, causticus sub fluida, in eo latere,
quod causticus attrahat aerem, ad crySTALLOS neces-
sarium.

XIV.

HENR. IO. NEPOMUC. CRANZ, S. C. A. mai-
Consil. Instit. medd. et Mat. Med. P. P. O.
etc. examinis chemici doctrinae Meyerianae de acido pingui, et Blackianae de aere
fixo, respectu calcis rectificatio. Lips. impens.
Io. Paul Kraus. A. MDCCLXX. 8. pl. 13 $\frac{1}{4}$.

Retorquet Cel. CRANZIUS Cl. IACQUINI-
tela, MEIERO infensa in Auctorem, multoque
cum sale, facundia potenti, et numerosis experimen-
tis ostendit, falso postulari, MEIERUM negligentiae
et ignorationis elenchi; contra vero Blackium eius-
que affectas fingere, quae probari nequeant, male
cohaereant, mutuo se tollant, ridiculaque consecta-
ria inuoluunt; celare et negligere, quae in suas tra-
here non possint partes, loqui saepissime multa
alia, quam quae loquantur ipsorum experi-
menta; explicare facilia, et ne haec quidem recte;
relinquere inexplicita, quae sine MEIERI caustico
exponi nequeant; dissentire inter semetipsos, tueri
denique opinionem, cuius ne verbum quidem
verum

verum sit. Cuius quidem grauissimae reprehensionis argumenta, quandoquidem cuncta, integro nisi libro descripto, tradi haud possunt, pauca modo passim delibata afferamus.

In efferuescentia calcarei cum nitri acido, praeter fumum album aeremque, eiiciuntur quoque simul globuli acidi saporis, in faciem mordaces. Conclauē odore acidi repletur. p. 7.

MEIERUS non negauit aeris in calcareo multi praesentiam; destillationem omisit, ut nil noui docentem, ut fallentem magistrum. p. 9.

Ad mentem Cl. IACQUINII destillans Noster p. 11. obtinuit phlegma limpidum, cum alcalinis quidem non feruens, ad linguam tamen et syrupum violarum acidum. Materies elastica copiose erumpens, non habenda statim est pro aere calcareo fixo, quum possit etiam esse aer aquae lapidi inhaerentis: aer caustico exturbatus, aut, quod videtur inprimis Cl. Auctori, aqua in vapores resoluta; a vasis vero candentibus auide absumpta. Vacillant ergo Iacquiniani calculi.

Calcarei lapidis cum aere nulla est affinitas. p. 17. Nil trahit ex atmosphaera, nil ex mixturis efferuescentibus, nec aerem trahere visus est vnquam staltiti, ex aqua seposito, affatim inhaerens.

Calx viua sonora, et adspersa aqua crepitans, p. 19. aeris expers non videtur. Eius cum aqua affinitas, IACQUINIO neglecta, aerea euidentior est. Extincta in aere fatiscit in puluerem, quod ab aere affini, p. 24. conglutinante, vix expectares; cum aqua porro incalcescit, datque spiritum causticum, secus ac in aqua extincta et dein ficcata. Alcalina salia, multo aere referta, tamen edunt effectus causticos.

Ab aeris in calce viua absentia non repeti p. 29. potest explicatio sibili calcis viuae, in aquam proiectae, neque efferuescentiae cum bullulis, perperam

ab aduersariis negatae: neque inde pendere potest vis noxia, neruisque inimica fumi, emergentis, aut vaporis recentium murorum, neque ebullitio, ab aduersariis silentio praetermissa; omnium minime incalescentia, vicinarum rerum inflammabilium incendium et flamma. Neque patet exinde calcis viuae

p. 49. in aqua solubilitas, nec aquae calcis facultas soluendi sulphur, camphoram, gummirefinas.

p. 53. Calx in aqua extincta, quam aere orbam volunt, madida seu sicca, recens annosaue fuerit, cum nitri acido tamen feruet.

p. 61. Ponit Cl. IACQUINIUS acida aeque, ac lixiuium salis caustici fixi, aere expertia, concreescere tamen in salem medium. Is deberet idcirco itidem esse sine aere, et per hypothesein causticus. Est vero nec hoc, nec illud.

p. 78. Solutum in acido nitri calcareum, et lixiuium caustico fixo praecipitatum, in calcem viuam abire IACQUINIUS asseruerat, aere per effervescentiam expulso. Quum vero calx ista in aqua nec extinguatur, nec cum sibilo ferueat, neque ebulliat, neque incalescat, aut inflammabilia accendat iocoso nomine a Cl. Auctore dicitur calx viua frigida BLACKII, a calce viua caustica MEIERI probe distinguenda.

p. 109. Ad experimenta, quibus aer, effervescentia enatus, methodo Cl. MACBRIDII in causticos liquores intruditur, iisque causticam vim adimit, regerit Cl. Auctor: primo incertum esse, num isti liquores vere careant aere, quum, ex qua obtinentur, calx viua per experimenta aerem habeat: dein fermentatione, putrefactione, effervescentia non merum aerem, sed et alia expelli; dum calcareus cum acido nitri feruet, abripi vapores acidos, quos ostendat odor, sapor et nitrum regeneratum, quod adhaerebat vitro, oleo tartari illito, quum in cista biloculi

lari

lari vapores hos coerceret, et ex vno loculamento in alterum, istud vitrum continens, abire Cl. Auctor cogeret. Porro obiicit, latere adhuc aeris elasticum illud, et forte esse ex igne; male quoque supponi, nusquam probari, aerem salis tartari attrahi a calce, calcemque sic impraegnata praecipitari; denique non dici posse salia alcalina, aere a calce attracto priuata, propterea magis fieri caustica.

Enim vero experimentis euincit Cl. Auctor, calcem, alcalico sali iunctam, insidere lapidi caustico, lixivio caustico fixo, pulmento eius oleoque tartari supra calcem digesto: indeque esse vim causticam, non a transitu aeris in calcem, ut pote ne argumenti quidem simulacro, nedum experimento comprobato. p. 127.

Salis alcalini volatilis caustici prouentus itidem non potest repeti ab aere, qui ex salis ammoniaci alcalina parte demigret in calcem viuum, quum sal ammoniacus fixus, a destillatione residuus, nulla aeris attracti documenta in experimentis edat. p. 137.

Salia caustica neutra esse MEIERUS non dixit. Lapidem causticum scripsit in multis se gerere ut salem medium; salemque causticum volatilem iam ante MEIERI tempora BOERHAVIUS et alii ut neutrum considerarunt. p. 149.

Parum cohaeret BLACKII sententia, quod aer fixus salibus alcalinis insit et efferuescentia expellatur, cum illa Cl. IACQUINI, salem causticum volatilem esse alcalinum; carere tamen aere, et in vniuersum efferuescentiam esse alcalinorum minus necessariam notam. p. 157.

Ex HALESTII experimentis euincitur, aerem inter et calcem viuum affinitatem esse nullam. Nil enim sorpsit calx viua, per dies quadraginta quatuor aeri exposita; aqua vero aceto, acido vitrioli etc. p. 164.

remixta aeris plurimum recepit. Per eiusdem tentamina sal alcalinus fixus aerem non attrahit, sed generat potius.

p. 173. In crucibulo exacte clauso post octo horarum ignem validissimum calcareus non modo solus, sed etiam calci viuae instratus, sine vasis et operculi laesione, calce viua quoque non in calcareum mutata, in calcem viuam abiit. Cum ammoniaco sale calx ita cocta fuit durissima, in aqua non solubilis, sed, vt lapis causticus, flocculenta, violarum syrumpum reddidit viridem, ab oleo tartari mutata non est, cum vitrioli oleo feruens emisit fumos vrinosos acerrimos, cum nitri acido magis acidus halitus, cum sale ammoniaco odorem vrinosum causticum.

p. 189. Imminuitur in aere libero caustici lixiui vis caustica. Quod si ob aerem attractum fieret, redderetur ponderosius. Cl. CRANZIUS contrarium vidit. Non igitur accedit aer, sed secedit aliquid, quod, quum lixiuium, antea cum acidis non feruens, nunc efferuescat, efferuescentiam impedit.

p. 197. Idem comprobatur per experimenta de spiritu salis ammoniaci caustico, ad solitos effectus perfecte neutro, sublato autem quauis ratione principio

p. 211. ignis caustico, rursus mere alcalino. Odor certe eius acerrimus et volatilitas insignis ex aeris absentia explicari nullo modo possunt.

IOH. CHRISTIAN WIEGLEB, *Apothekers in Langensalza Vertheidigung der Meyerischen Lehre, vom acido pingui gegen verschiedene darwieder gemachte Einwürfe. Altenburg in der Richterischen Buchhandlung, 1770. 8. Seit. 115. mit Zueignungsschrift.*

h. e.

Doctrinae Meyerianae de acido pingui aduersus varia, quibus oppugnatur, argumenta defensio. Auctore Cl. WIEGLEB.

Viuientis adhuc Cl. MEIERI amicus mortuo iam eidem pie patrocinator, libellique huius bipartiti prima sectione Iacquinianis maxime; altera Cl. MICHAELIS FRID. BÖHMII reprehensionibus, in dissertatione *Examen acidi pinguis* inscripta, et Argentorati sub Cel. SPIELMANNO a 1769 defensa, propositis respondet. Primum ergo ostendere nititur, calcis viuae extinctionis phaenomena, solubilitatem in aqua, et deliquescentiam placidam in acidis: porro eiusdem ex aqua praecipitationem, per aerem et alcalina salia factam, vim sulphur soluendi, mercuriales solutiones praecipitandi, alcalinorum causticam indolem intendendi: dein de diuersitatem, qua caustica salia quaedam in acidis soluta ad fundum deiiciant, alia intacta et soluta relinquant: denique vaporum ex causticis salibus et spiritibus cum acidis mixtis egressum, nec non tenacitatem formae fluidae, quam spiritus causticus offerat, etiam cum Alcohole mixtus, felicius longe et certius per Meieriana dogmata explicare posse, quam per Blackianam hypothesein. Maximum argumentum in eo ponit, quod calcareus igni solari, aerem aquamque expellenti, expositus, tamen in calcem

p. 16.

- viuam non abeat, sed in merum fatiscat puluerem
- p. 17. insipidum. Tectum caustici ad calcem accessum exemplo phlogisti, non minus tecte, vere tamen metallicas calces intrantis, illustrat. Alia terrea, vt argilla, filices, vitrum cet. licet calcinatione priuentur aqua et aere, calcis tamen indolem causticam non acquirunt, quia sola calcarea terra in acidis solubilis est. Miratur, cur sexcentis aquae partibus soluta calx viua non recrudescat, quum his omnino plus aeris inesse debeat, quam quinque salis alcalini vnciis, curque placida calcis viuae solutio in acido nitri caleat adeo, simili calcarei solutione impetuosa non calente. In apparatu Magbri-
- p. 23. diano instituta calcis ex aqua praecipitatio contingit, acido pingui in aerem intermedium exeunte.
- p. 28. Monet, non patere, cur sulphur ab aqua calcis, aere carente et lixiuiis alcalinis, aere praegnantibus, aequae bene soluatur, neque cur vtraque solutum mercurium praecipitent, nisi MEIERUM sequaris.
- p. 31. Obtineri dicit salium alcalinorum crystallisationem, demto ipsis extus adhaerente acido pingui.
- p. 47.
- p. 48. Cl. BOEHMIO regerit Auctor, acidum pingue non ita dictum esse ob id, quod pinguedines inde nascantur: satis distinctum, nusquam confusum fuisse cum phlogisto: calcaream terram sine acidis in aqua non solui: nil valere exemplum aquarum, stalactitem seponentium, quippe quae vel acidum subtile habere possint, vel calcaream terram inquinantem quidem, sed nec immixtam, nec solutam
- p. 55. contineant: acidum volatile posse deferere solutam terram, quamuis fixa acida id non faciant: ad salis genesis non sufficere terrae et aquae laxius connubium, quale in aqua calcis viuae adesse videatur, accedere debere tertium tenuius principium: alcalina salia in praecipitatione aquae calcis non agere
- mecha-

mechanice, quum et ipsa mutantur in caustica, et
 salia pura media, nitrum, sal commune, de SEIG-
 NETTE et tartarus solubilis nil deiciant: alcali cau-
 sticum fixum possetamen esse sal, medio simile, licet
 acrius factum fuerit ab acido pingui, quum etiam
 boracis et tartari crySTALLORUM misturae sapor aci-
 dus eminentior sit: salinum calcis principium Cl.
 BOEHMIO alcalinum visum, ob facilem scilicet cum P. 71.
 alcalinis coniunctionem, tale esse non posse; nemi-
 nem enim, qui velit alcali cuidam corpori inhaerens
 separare, aliud alcali adiungere, cui prius adhae-
 reat: spiritum salis ammoniaci causticum recte pa-
 ratum, neque cum dilutis, neque cum concentratis
 acidis efferuescere: causticum calcis posse esse aci-
 dum, etsi saponem non in modum acidorum crassio-
 rum disiicit: vocabulum *pingue*, quo cognomine-
 tur, aliter accipi, ac MEYERUS adhibuit. Tandem
 sollicitatus caustici ad calcem accessus ex igne argu-
 mentis variis confirmatur. Adiunctae sunt dubita-
 tiones quaedam de acido pingui Cl. Auctori, ab igno-
 to quodam per litteras missae, ad quas, ut non adeo
 graues, breuiter respondet.

XVI.

IOH. IAC. WELLS, *Apothekers in Wien, Rechtfer-
tigung der Blackischen Lehre von der fixirten Luft
gegen die vom Herrn WIEGLEB, Apotheker in Lan-
gensalza darwieder gemachten Einwürfe. Wien
zu finden im Krausischen Buchladen 1771. 8vo
Seit. 164. ohne die Vorrede.*

h. e.

Vindiciae doctrinae Blackianae de aere fixo, ad-
versus Cl. WIEGLEBII argumenta contraria.
Auctore Cl. WELL.

Ad priorem tantum Wieglebiani libelli partem
Cl. Auctor respondet; eundem secutus doctri-
nae ordinem, quem ille offert.

- p. 3. Ac primum quidem tentaminibus institutis co-
gnovit, calcareum crudum non solum in foco speculi
caustici in calcem viuam conuerti, sed quoque glo-
bum vitreum cauum, aquae mensuris sex repletum,
speculoque et foco interpositum calcis viuae gene-
p. 16. sin non impediisse. Quum vnā libram calcarei
in retorta, furno reuerberatorio imposita, per octo
horas torqueret igne, interque receptaculum et re-
tortam quinque tubi intermedii, vesica humectata
muniti, positi essent, in altero tubo vix calente sede-
cim aquae scrupulos collectos inuenit, reliqui pa-
rum humiduli, receptaculum siccum fuere; calx
in retorta viua.
- p. 24. Ex lixiuio caustico, post saturationem, cum vitrio-
lico acido factam, destillato, meram aquam insipi-
dam obtinuit, quae nec post concentrationem per
frigus a MEIERO commendatum causticum sapiebat.
- p. 29. Phlogisti exemplum reiicitur, quatenus scilicet in
illo a probato ad nondum probatum perperam con-
clu-

cludatur. Terra aluminis et natri in acidis solubilis est; nec tamen in calcem mutari potest viam, quum calcareae non sit indolis.

Solutio perfecta calcis viae in aquae sexcentis p. 38.

partibus sumta tantum, sed non probata est. Dupla, immo quadrupla aquae copia calcem viam, purissimam tamen non penitus soluit. Aeris in aqua contenti, vt atmosphaerico aeri similis, pondus exacte definiri nequit; atmosphaericus aer vero tardius calcem viam in calcareum conuertit. Terrae calcareae medium forte tenent locum inter terras et salia.

Solutio calcis viae recentis in acido nitri p. 59.

vulgari calet vehementer cum ebullitione; extincta plus minus calet, pro copia aquae, per quam extincta fuit. Calor nascitur ab impetuoso motu partium spiritus nitri aquearum, quae in calcem irruunt. Spiritus nitri fumans sine calore exorto calci recenti affundi obseruatus est, adiuncta vero aqua mixtum incaluit.

Praecipitatio calceae aquae, per aerem ex secessu p. 77.
acidi pinguis in aerem tubi Macbridiani explicata, non satis ostendit, quorsum illud se conferat principium, quod adeo antea efficax nunc plane iners quiescit.

Etiam borax tum aquam calcis, tum solutionem p. 88.
terrae calcareae acidam saturatam praecipitat. Extincalo tam cum creta pura, quam cum bolo albo, in aquae copia sufficiente cocto, filtrato et euaporato obtinuit Cl. Auctor crysallos albas egregias, boraci similes.

Calcis viae aqua sulphur soluit, non quatenus p. 93.
calx viua aere orba est, sed quatenus cum salibus alcalinis praeter alias conuenientias etiam hanc virtutem communem habet.

Praecipitatio mercurialium solutionum non ab p. 98.
acido pingui, praecipitatum colorante, esse potest,
quum

quum, praeter alia, sodae cryſtalli puluerem ſpadi-
ceum, lixiuium cauſticum pallide flauum, et ſpiri-
tus ſalis ammoniaci cauſticus niueum deiiciat ex
mercurii ſublimati ſolutione aquoſa.

p. 138. Vapores, quos ſalia cauſtica, acidis mixta, eru-
ſtant mere aquoſi ſunt. Acidum pingue diſponere
ſalia ad fluiditatem, non ſatis probatum eſſe, a
WIEGLEBIO oſtenditur.

XVII.

*Chymische Verſuche über das Meyerſche acidum pingue
von D. WILLH. HEINR. SEBAST. BUCHOLZ, or-
dentlichen ausübenden Arzte zu Weimar, der Kay-
ſerl. Akademie der Naturforſcher, der Königl.
Preuſs. Geſellſchaft zum Nutzen der Wiſſen-
ſchaften zu Frankfurth an der Oder, und der
Churbayeriſchen Akademie der Wiſſenſchaften
zu München Mitgliede. Weimar bey Carl
Ludolf Hoffmann. 1771. 8vo Seit. 96 neſt
Vorrede.*

h. e.

Tentamina chémica circa acidum pingue Mey-
erianum. Auctore Cl. BUCHOLZ M. D. etc.

Adiungimus hucusque a nobis indicatis libris,
Cl. MEIERI hypotheſin cum propugnantibus,
tum oppugnantibus, ob affine argumentum, haec
Cl. BUCHOLZII tentamina, ex quibus quidem appa-
ret, Auctorem aliam longe de cauſtici natura fouere
ſententiam, quam vel Cl. MEIERUS, quem maximi
facit, humaniterque excuſat, vel eius aduerſarii,
quorum induſtriam haud quaquam reprobat. Con-
tendit nimirum, calcareas terras, dum calcinantur,
con-

contrahere indolem causticam, nec accessu peregrini principii ex igne vulgari, nec secessu solo materialium, quae inter vstulandum aufugiunt; sed facta potius, post earum abitum, intimiori materiae luminis, ob phlogiston, quod calcareis insit, certo praesentis, cum terreis moleculis coniunctione. Quam quidem sententiam profert, postquam enarravit varia sua cum calce tum cruda, tum viua, huiusque praeparatis experimenta.

p. 71.

Ex commixtione vnciarum duarum olei iuniperini et salis caustici Cl. MEIERI aliquamdiu digesta, dein destillata, obtinuit aquae dimidiam vnciam, olei subtilissimi gratioris vnam, residuum resinofum nucem myristicam redolens; camphorae vero ne tunc quidem quicquam, cum residuum illud resinofum oleumque, destillatione prolectum, super calce viua abstraheret. E contra, cum misceret rorisinari oleum cum sale caustico, destillando elicuit camphorae verae grana triginta quinque: plus ergo, quam MEIERUS impetrauerat. Plura de caustici relatione ad olea therebinthinae, rutae et anisi in proxime edendo libello propositurum se esse, spondet.

p. 27.

Calcareum lapidem, cretam, et ostracodermata ope speculi caustici aequae, ac Cl. WELLIIUS in calcem viuam perfectam commutauit, indeque aquas calcis confecit, vulgari exacte similes. Erat tamen cretaceae sapor subamarus.

p. 39.

Repetiit Cl. MARGGRAVII laborem circa lapides phosphorescentes; neque tamen, fidus licet vbique operationis imitator, phosphorescentiae phaenomenon obseruare potuit. Ex his vero tentaminibus cognouit, terras calcareas, phlogisto suo orbatas, aegre aut plane non causticas reddi posse.

p. 60.

Vltimo de mercurio praecipitato rubro disputat, cuius ruborem Cl. WIEGLEB tribuit acido pingui; ab acido nitri certe non est, cuius adhaerentis nulla

p. 84.

nulla obueniunt in vlllo examine vestigia. Auctori nostro contigit, hydrargyrum, acido nitri solutum, dein ad siccitatem euaporatum, ope speculi caustici in aequae rubentem massam commutare, quam est vulgari methodo paratus mercurius praecipitatus ruber.

XVIII.

De corpore nutritiuo et de nutritione, tentamen chymico medicum. Auctore PETRO THOUVENEL, L. A. magistro pro prima Apollinari laurea consequenda, in Augustissimo Luduvico medico Monspeliensi, mense aprili 1770 propugnatum. Piscenis ex typis I. Duret 1770. 4 mai. Alph. 1. pl. 8,

Libellum hunc, licet bono et eleganti stylo sese non commendet, ob rerum tamen, experimentorumque copiam ab viris doctis haud inique exceptum iri praeuidemus. In summam eius, ne longi-
 p. 2. simus, liceat nobis inquirere. De corpore itaque nutritiuo Noster acturus corporis nutrientis nutrientique compositionem haud dissimilem esse, a priore et posteriore probat, cuius tandem proxima, chemice considerata, principia in moleculis muci, per varios gradus mutati, integrantibus inuenies. Muci vero duas varietates Cl. Auctor attendit, vel eum non concrecere, vel certo caloris gradu coire: hunc albuminosum, illum gelatinosum appellat: illum in animalibus senioribus; hunc in iunioribus ut plurimum inueniri; sed praeterea tertiam in sanguine extra corpus concrecibilem partem inuenit, quam lympham dicit. Gelatinosi ad albuminosum transitum *animalisationem* vocat, quae vel vitalis est, vel putrescens,
 p. 5. dissolutiua. Albumen ouorum a sero animali
 (lymphæ)

(*lymp̃ha*) in eo differt, quod illud maiori coeundi virtute gaudeat, hoc minori. Ex variis experimentis, cum albumine et fero animali ope acidorum institutis, concludit Noster, mucum animale non concrescibilem a concrescibili, acidis, differre: animalisationis itaque conditionem esse, acidum ingestorum subigendi. Succī enim, dum animalisantur, aptiores ad organisationem fiunt, vt adeo albuminosa muci animalis conditio inter gelatinam, et partes, organisationem fuscipientes, vel iam susceptas, media videatur. Deriuat ex eiusmodi organisationis defectu, eam imperfectam in rhachiticis et scrophulosis, quam duplici modo ab acidis vitari demonstrat.

p. 6.

Iam in indolem sanguinis studiosius inquirens, basin mucosam, materiam colorantem rubram, volatile quoddam principium cum calente sensibili, eaque in copioso latice aquoso dissoluta vel confusa detexit. In sanguine, ex vena misso, et quidem parte eius serosa, praeter albumen coagulandum, maximam copiam aquae simplicis, et mucosi quid, filum ducens, nec tamen in albuminis modum coagulabile inuenit *). Proportio interim albuminosae partis ad aquosam varia est, prouti et ex muci huius varia quantitate consistentia varia; interdum enim serum per filtra potest traici, interdum non. Quod vel ex intima muci crasi, molecularumque constituentium peculiari miscela deriuandum; vel vario frigoris gradui attribuendum Nostro videtur. Salem in substantia, etsi falsedinem in sanguine degustauerit, nulla prorsus encheiresi producere potuit. Sanguis, in regimine temperato seruatus, aeri patens, vel recte coopertus, absque vlla sensibili

p. 8.

p. 13.

*) Conf. Ill. ab HALLER prim. lin. phys. p. 76.

bili differentia, temporis ratione, densitatis, coloris cet. coalescit: hinc coagulum sanguinis, omissis aliorum dissensu et experimentis, ex mucī concretionē, quae calore perficitur, deriuat, cuius productum scissile, album a menstruo, cui inhaesit, segregatum, nullo vero remedio solui contendit.

p. 14. Placenta, affusa aqua, reiteratis vicibus abluta, totam partem rubram auferri, nihilque, nisi massam albescentem, ab omnibus ferme fibrosam, a Nostro autem celluloso reticularem dictam, relinqui vidit, ideo fibrillosum sanguinis ad figmenta refert. Aquo-

p. 17. sa cruoris solutio, ex ficcata placenta proueniens, cum oleo terebinthinae commixta fundum petit: ab oleo segregata: haec post aliquot dies colorem rubicundum amittens, nunc in pulvem albidam, mucofo terream, sub qua oleum detinetur, mutata in aqua bulliente concrefcere incipit; nec in corpus firmum cohaerens, albuinis ad instar, sed mox in grumos, mucofo terreos, friabiles abiens. Martem ex coagulo non, nec ex lixiuio sanguinis nitrum, sed sal potius alcali fixum extricauit. Cru-

p. 19. stam pleuriticam, cum salibus mediis, aut alcalinis fixis coniunctam, per 40 dies nec dissolutam, nec

p. 23. putrefactam obseruauit. Cl. VENEEL assentitur, qui coagulum succorum albuminosorum ad gradum centesimum duodequadragesimum therm. Cl. FAREN-

p. 26. HEIT ponit. Coagulatio lactis, alcali adiecto, vulgo probata, non aequē manifesta videtur Nostro, quam quae acidis fit; aliquam tamen conspissationem, grumorum ad instar, a mixtura alcalina inductam

p. 31. vidit. Ex confectariis, quae de puris genesi inferit, apparet, eam mucosae animalium succorum indoli, in coagulum pronae, ortum debere; crustam vero pleuriticam, et basin placentae ex succo albuminoso constare; eius tamen in crustam et placentam immutationem, non coagulationem, vel congelatio-

lationem, sed veram concretionem spontaneam esse, uti in polypis cet. ut itaque id, quod partem albuminosam sanguinis, eiusque procliuuitatem ad spontaneam concretionem auget, vel imminuit, varietates crustae exhibeat.

Accedens ad alterum sanguinis colorans principium, rubrum sanguinis colorem, utpote accidentalem crasseos sanguineae habitum, seu globulorum sanguinis elementarium, variorum ordinum adunationis productum, non a marte, nec a bile tingente, sed a substantia mucosa, cui accreuerit phlogiston, ex materia phosphorica, caloris animalis principio destructa, Noster deriuat; martem vero ad colorem eius obscuriorem non parum adferre, ipsi probabile est. p. 44.

Volatile tandem principium, quod variis denominationibus insignitur, calido innato veterum non absimile videtur, idque omnes corporis viuentis partes penetrare, et in intimam animalium substantiam abire, ex observationibus multis constat; origo eius tamen atque indoles vix definiri poterunt. Adiungit quoque duo principia, quae ad sanguinis conformationem velint necessaria auctores, aerem nimirum, et acidum: illum omnino fixum assumit, diuersum tamen ab eo, qui aliis liquoribus admixtus est; hoc vero in statu sano non agnoscit. p. 51.

Iam ad succos secundarios perueniens in saponaceos, saliuam, succum pancreaticum, liquorem gastricum cet. eorumque usum commentatur. Bilem ex mixtione mucii cum oleo componi defendere videtur. Chylum non cum Boerhaauianis in varias figuras formasque decomponi, nec in varias vasorum sanguiferorum ramificationes deponi; sed re-

- Etius, vt nobis videtur, textus cellularis varii cum recentioribus rationem habet, quo varie mutatus, meliusque elaboratus secretionibus nutritiis copiam
- p. 70.** exhibeat. Inde sponte ad lactis secretionem ducitur, quam immediate ex chylo, varias secretiones depuratorias perpeſſo, meliusque praeparato, derivat, probatque hoc ex comparatione lactis cum chylo, cum lac, affuſione acidorum ſtatim coaguletur; in chylo vero materiae tantummodo cretaeae, a caſeoſa diuerſae, praecipitatio obſeruetur: vnde conſtet, lac ad naturam animaleſ magis, quam chylum accedere, eumque omnem ſubſtantiam lactis, particulis tamen peregrinis commixtam, in ſe continere. Lactis varietates ratione indolis et conſtitutionis cum Cl. RANG perſequitur; neque minus in eius in corpore humano corruptiones, acidas, mucosas ſeu glutinoſas, et rancidas inquiri, aquamque calcis, quae eius corruptionem emendet, ſuaſet. Lac, tanquam emulſio animalis ab emulſionibus vegetabilibus in eo differt, quod principio
- p. 80.** ſulphureo foetente praeditum ſit. Lacti analoga videtur oui vitelli compoſitio, quam lac gallinaceum, aqua dilutum, vtramque vero lactis ſpeciem, emulſionem animaleſ dicit; in quo vero oui vitellus a lacte diſcrepet, ulterius perſequitur.
- p. 84.** Nunc decocta carniſum pertractans, iuſcula nimirum et gelatinas, duplicem in carne mucum, conreſcibilem, et qui non coeat, Noſter defendit: Succus enim, ex carne expreſſus, in aqua bulliente immiſſus, diſſolvitur partim, partim coaleſcit, Piſces marini maiorem quantitatem eiſmodi extracti, valde viſcoſi et glutinoſi; minorem carnes animalium, et his minorem piſces fluuiatiles, quamvis ab animalibus ex indole parum diſcrepantes, exhibent:
- p. 86.** Exſanguia animalia gelatinae nihil habere aſſerit.
- Experi-

Experimenta, a Nostro instituta, testantur, iuscula alia aliis magis ad putredinem prona esse: pendere hoc a materia calcarea, plus minus in iis contenta; exinde concludit, calcem recentem, conchas, testas cet. iuste calcinatas, putredini succorum animalium resistere. Non possumus non Cl. Auctori in eo plaudere, quod, contra Gallorum consuetudinem, iuscula carniū, ad putredinem procliuia, fibrisque noxia declaret. p. 88.

Iam ad principium nutriens, ex regno vegetabili depromptum, ad mucilaginem, cum substantia saponacea coniunctam progreditur. Hoc vero principium ex triplici facie considerat 1) ex corpore mucoso dulci, 2) fatuo, et 3) farinaceo. Primum in plurimis plantis, et in omnibus earum partibus latens, nullibi perfecte purum et solum, sed semper a principio mucilaginei, vnguinoso saponacei, terrei vel etiam quandoque resinosi inuolutum deprehenditur, quod tandem, iusta encheiresi tractatum, sacchari nomine venit, in cuius virtutes iam fusius commentatur. P. 95.

Alterum ab eo ita differt, ut 1) sapore fatuo 2) insigni viscositate se prodat, 3) ut non in oleis pinguibus, nec in aethereis, vel accedente digestionē, gummi solvatur, sed induretur, et maiore ignis gradu nigrescat, 4) ut tandem spiritu vini, vel etiam digestionē dissolui nequeat; sed tantummodo coloris principium, in quibusdam gummi speciebus satis abundans, extrahatur. P. 106.

Tertium, etsi multa cum prioribus communia habeat, seorsim pertractat, 1) quod ab iisdem sub quibusdam conditionibus differat, 2) quia in quibusdam farinaceae indolis corporibus differentias

haud exiguas prodit. Principium huius nutriendi in mucoſo, ex ſubſtantia puluerulenta et aquae admixtione oriundo, poſitum eſt, quod deinde varias mutationes praeparationeſque ſubit. Refert huc cerealia, legumina, radices bulbosae, medullas arborum, caſtaneas, hippocaſtana, alioſque fruſtus pulpoſo farinaceos ; ſemina vero oleoſae indolis ex hac familia, contra Cel. BOERHAAVE prorſus proſcribit. Eminent inter ea triticum, hoc principio ditiffimum. Duplicem in eo inuenit Noſter ſubſtantiam, glutinoſam ſcilicet, et amylaceam, quarum proportio tamen ad ſe inuicem variat. Obſeruauit enim in hyberno tritico, et quidem Narbonnenſi, utpote optimo, tres fere partes glutinoſi, et vnā amy-lacei. Hoc glutinoſum principium cum ſuccis animalium concreſcibilibus ſeu albuminoſis conuenire, ſupra demonſtrauit, et hic vltcrius probat. Iam ad

p. 116. tritici reliquorumque cerealium, vel quae farinoſum plus minusue in ſe contineant principium, uſum et praeparationem, quibus iis veſci ſolemus,

p. 122. accedit. Tandem vegetabilium ſucculentorum, radicū pulpoſarū, fruſtuū horaeorum olerū-que examen inſtituit, eorumque principio nutriendi, vario in variis, detecto, iuſtum uſum ad nutritionem adplicat.

XIX.

Histoire naturelle générale et particulière, avec la description du cabinet du Roi. Tome XVI. ou histoire naturelle des oiseaux Tom. I. à Paris de l'imprimerie royale 1770. 4 mai. 2 Alph. 17 pl. tab. aen. 29 Tom. XVII. ou Tome II. 1771. 3 Alph. tab. aen. 28.

i. e.

Historia naturalis generalis et particularis vna cum descriptione musei regii Tom. XVI. et XVII, siue historiae avium Tom. I et II.

Si alio vlllo merito potest gloriari seculum nostrum, velut certissimo artis studiiue crescentis specimine insigni; illud certe in eorum numero habendum erit Ill. DE BUFFON opus, cuius continuationem nunc indicamus. Prodierunt autem inde ab anno 1749 quindecim eius volumina, de quibus fere singulis ad lectores nostros relatum a nobis est *): et quae omnia, excepta sola anatomia animalium et descriptione musei Regis Galliae speciali, quarum Auctor Cel. d' AUBENTON est, Ill. DE BUFFON debentur. Fuerat quidem primum Auctorum consilium tantum hoc, vt quindecim modo volumina prodirent, quibus omnium corporum naturalium historia comprehenderetur, et introductioni in totum opus, simul cum hominis et quadrupedum historia, quatuor tantum volumina destinata relinquerentur. Verum ita succreuerat inter elaborandum rerum dicendarum copia, vt, qui vniuerso operi destinatus fuerat, quindecim voluminum numerus, vix quadru-

I i 4

pedum

*) Vol. IV. vid. com. Vol. III. p. 316. etc.

pedum historiae, praemissa tamen introductione generali, sufficeret. Nemo non admirabitur nobis, cum regiam liberalitatem, qua ita suffulta est Ill. DE BUFFON et D' AUBENTON industria, ut zoologiae studium, immortalis hoc opere nunc egregie ornatum, videre liceat, et perfecta demum magni operis parte Ill. DE BUFFON iam ad avium historiam accedere potuerit. Qui progressus, uti iucundissimus non potest non esse omnibus, qui naturae studium amant, ita optandum quoque est, ut si non omnem corporum naturalium historiam, tamen zoologiam saltem, aut ornithologiam ad finem perducere Auctori Ill. et placeat et contingat.

Vt autem de ipsius huius historiae avium prioribus voluminibus dicamus, hoc praemonendum videtur, in ea explicanda Cel. BUFFON, qui omnem huius operis curam nunc solus suscepit, non omnino eandem rationem atque ordinem servasse, quem in quadrupedum historia conscribenda tenuerat. Si quidem primum in hac ornithologia avium dissectiones desiderantur, si ea excipias, quae passim ex aliis Auctoribus adducuntur, quum tamen in quadrupedum historia tales, studio Cl. D' AUBENTON factae, magno numero reperirentur. Deinde omissa quoque est in hac ornithologia eorum corporum naturalium, quae in regio museo asseruantur, enumeratio; qualem in priori opere singulorum animalium historiae annexam videmus. Atque in univsum avium historia non aequae completa atque omnibus numeris absoluta deprehenditur, quam quadrupedum historia antehac tradita erat. Cuius tamen consilii et instituti mutatio, ab Ill. Auctore excusatur sic, ut doceat, ornithologiam nullo modo eadem, qua in quadrupedum historia factum erat, ratione tradi posse. Causae sunt hae: primo, quia

nume-

numerus auium, longe maior est quadrupedum numero, quippe qui facile, ex Auctoris Ill. mente, ad 1500 vel 2000 species adscendat. Ad quod accedit specierum varietas, quae in auium generibus longe maior est, quam in quadrupedibus. Etenim non sexus modo atque aetas, verum etiam clima, libertas vel captiuitas etc. efficiunt, vt colores, a quibus fere semper specierum characteres petuntur, vehementer differant. His omnibus maior fere est difficultas verbis commodis exprimendi colorum differentiam, quod negotium tam arduum visum est ipsi Auctori Ill., vt ipse eam rem in hoc opere explicare non auderet. Quapropter illud vnum relictum est, vt auium figurae aeri incisae et viuis coloribus distinctae ederentur. Qua in re sculptore et delineatore vtitur egregio artifice Cl. MARTINET. Totius autem operis, in quo perficiendo octuaginta fere operarii per septem annos iam iam laborarunt, directionem Cl. D' AUBENTON iunior in se suscepit. Prodierunt iam aliquot dicti operis volumina, quae cum seorsim per se singulare quasi opus constituent, cuius forma seu magnitudo formam ornithologiae, de qua hic agimus, superat, alibi de illis dicendi erit locus *). Sufficiat interea hoc notasse, figurarum elegantiam EDWARDI operi nihil cedere, FRITSCHII figuras longe superare. Ex Cl. DE BUFFON consilio ad 700 tabulas comprehendet, in quibus 800 vel 900 aues delineatae conspicientur. Cum vero numerus exemplorum picturarum non tantus confici potuerit, quantus historiae auium forma quarta impressae, huic quoque tabulas aeneas Auctor addi curauit, in quibus singulorum generum aliquot saltem species delineatae cernuntur.

Ii 5

Sed

*) Ad 24 iam fasciculi prodierunt, qui 600 circiter tabulas comprehendunt.

Sed redeamus ad ipsam auium historiam. In qua recte scribenda difficultatem vehementer augeat ipsius ornithologiae, qualis adhuc est, conditio. Longe enim ista vel nunc ab eo remota est, quod perfectionem disciplinae dixeris, siue nomenclaturam, siue descriptiones, siue ea, quae de vitae morumque ratione in auibus nobis cognita sunt, spectes; quod, vel notissimum communis hirundinis exemplum probare potest, de qua, vtrum sub aquis hyemali tempore sopita iaceat, an ad calidiores regiones migret, ad hunc usque diem ignoratur. Interim experimenta a Cl. DE BUFFON instituta docent, *hirundinem urbicam* frigoris vi facile perire. Atque sunt plurimi, qui pro migratione pugnant, Auctores fide digni, inter quos testis oculatus commemoratur Cl. ADANSON, qui hirundines nostri hyemis tempore in istis calidioribus regionibus vidit. Nilominus tamen multi contra alii, ex aquis hyeme extractas se vidisse hirundines contendunt. Suspicitur itaque Ill. Auctor *hirundinem urbicam* ad calidiores regiones transire, *ripariam* vero (*le petit martinet*), vt varia alia animalia, hyemali tempore sopitam quasi sepultamque cubare*). Quae aliaque hic adducta sententiarum dissidia Cl. BUFFON mouerunt, vt in noua operis parte non singulas, vti in quadrupedibus factum est, species auium pertractaret atque recenseret, sed de generibus tantum in vniuersum ageret, addita tamen breui singularum specierum descriptione, vna cum nominum catalogo. Domesticae vero, quae dicuntur aues, atque species illae, in quibus peculiare aliquid notandum erat, seorsim describuntur.

Acce-

*) Conf. Phil. Transact. Vol. LIII. p. 101. Comment. nostr. Vol. XIII. p. 667.

Accedimus ad praemissum operi *sermonem de* p. I.
auium natura in vniuersum. In ea explicanda ita ver-
 satus est Ill. Auctor, vt sensus singulos, qui in au-
 ibus animaduerti possunt, pertractaret, deque eo-
 rum praestantia atque conditione iudicet, ex com-
 paratione sensuum eorundem in homine et quadru-
 pedibus. Visus primo, in vniuersum spectatus,
 viuidior, longius penetrans, clarior et distinctior in
 auibus est, quam in homine. Oculi structura, in
 auibus magis composita, deprehenditur. Habent
 enim *nictitantem membranam* et neruum opticum
 in nouam quandam membranam expansum, qualis
 in quadrupedibus non est *). Porro auget visus
 praestantiam etiam magnitudo oculorum; quae in
 auibus, si cum reliquo corpusculi modulo compa-
 raueris, fere nimia videtur, certe longe maior est,
 quam in reliquis animalibus. Praestat istud natu-
 rae beneficium vsum ipsis hunc, vt res quascunque
 quae obiciuntur oculis, maiore quamuis distantia
 positas, distinguere valeant. Quod vel ob velocita-
 tem volatus, vel ob altitudinem, qua in aere alis
 suis adscendunt necessarium est. Haec enim vola- p. 10.
 tus altitudo tanta est, vt aquila a planitie ad 17000
 vel 18000 pedum altitudinem eleuetur. Varieta-
 tes aeris et eius mutationes maiorem habent in
 auium corpora vim, ita vt tempestatum mutatio-
 nes quodammodo praedicere possint, cogantur-
 que et ipsae ob imminentes mutationes coeli, et
 quoniam cognitio ipsis data est de aliis terris et cli-
 matibus, de vno loco in alterum transvolare et mi-
 grare. Praestant quoque aues auditu, vnde vere vo-
 cis ista elegantia eiusdemque modulatio, qua aues
 canorae ipsae quasi delectari videntur. Ipsa vox
 fortior

*) Vide de his Cl. PETIT in *Mém. de Paris* 1735.
 p. 144. seq.

fortior est aliorum animalium clamoribus aut rugitu. Audiuntur enim vel mirabili maxime altitudine remotae, ita ut oculis conspici saepe amplius non possint. Quod eo magis mirandum est, quod certius compertum habemus, non modo distantiam loci, verum multo magis aeris raritatem maiorem longe in sono edendo vim requirere. Vnde collegit Noster, vim vocis in auibus, ad vim eiusdem in quadrupedibus sese habere, uti 4 ad 5. Hoc quoque praeterea notatu dignum est, aues calidiorum regionum plerasque, uti colorum elegantia nostrarum terrarum aues longe superant, ita iis suauitate vocis cedere et raucos, ut plurimum, atque ingratos sonos edere. Mutant vocem aues canorae, ut ceteras praetermittamus rationes, pro vario, quo agitantur, affectu: anni quouis tempore; si quidem ista auium vox ab instinctu et amore in alterum sexum aequae deprehenditur pendere, ac in hominibus pubertas solet mutationem vocis efficere. Superant item auiculae quadrupeda et hominem vi prolifica, quae inprimis in auibus ex gallinarum ordine et domesticis insignis est. Summa porro atque incredibilis fere est auium velocitas, quae forma totius corporis ad volatum fabrefacti et leuitate eius efficitur. Ossa in auibus leuissima sunt. A qua ossium leuitate et peculiari structura Cl. Auctor longaeuitatem auium deducit; licet enim celerius incrementi terminum attingant, quadrupeda tamen ceteris paribus vitae duratione longe superant. Sequitur de nutritione et viuendi ratione diuersorum ordinum, in quos auium classis distingui solet, disquisitio, ex qua patet, illos cum mammalium ordinibus ita conuenire ut v. c. accipitres feris, gallinae pectoribus similes sint. Aues quaeque vix ullam masticationem exercent, neque gustu pollent, cum saepius venenatas res cibi loco sumant. Saepissime
omni

omni ciborum genere promiscue vtuntur, ita vt graniferae v. c. etiam carne vescantur. Lapidibus simul cum cibus deglutitis, digestio in ventriculo per triturationem quasi peragitur. Quod de gustu auium diximus, idem de odoratus quoque sensu valet, qui longe minor in iis, quam in quadrupedibus est: quod vel ex organi odoratus comparatione declaratur. Ossa enim spongiosa et narium cauitas, nerui olfactorii, imo ipsae narium aperturae longe minores sunt. Saepe etiam narium foramina plane deficient, ita vt odoriferae particulae per os tantum ad nares penetrare possint. Tactus tandem praecipuam apud aues sedem in pedibus esse Cl. Auctor suspicatur, qui tamen admodum exiguus esse potest, cum interior pes callosa cute obductus sit. Auium aquaticarum corpus pennis crassioribus et mollioribus tegitur; eademque omnes circa caudam glandulas quasdam habent, quibus oleosus humor continetur, quem rostro solent exprimere, quo eo pennas quasi obducant et lubricas reddant, ne aqua penetret. In quibusdam glandulae hae vel minores sunt, vel plane deficient. Aues, quae altius per aerem adscendunt, velut accipitres, vt contra frigoris vim tutiores sint, pluribus pennis, quam reliquae donatae sunt. Singulis quotannis pennae novae succrescunt, prioribus delabentibus, quod in nostrarum regionum speciebus sub fine aestatis vel autumnii tempore accidit. Longe plures volatilium species, quam quadrupedum aquam inhabitant, veluti etiam facilius ob totius corporis formam eiusque leuitatem natant. In amoris denique sensu, quem Ill. DE BUFFON cum Cl. LECAT in sensuum numero habet, a quadrupedibus differunt eo modo, vt magis tener ille sit in auibus atque molliorem quandam sensumque delatorem spirare videatur. Docet id coniugii species, quae inter
femel-

femellam et marem existat, atque mutuus eorum labor in struendo nido, ovis incubandis et pullo-
rum educatione. Prolifica, de qua diximus paulo
ante, vis, imprimis in domesticis auibus, quae nidum
nullum struunt et pullos facile educare possunt,
magna est. Gallus gallinaceus vnicus quotidie ad
300 oua impraegnare potest, et gallina vnica ad
centum fere oua singulis annis ponit. Mares duos
penes aut penem bifidum habent, qui per anum
coitus tempore exit. In feminis orificium vulvae
supra anum est, ipsaeque non vterum, sed ouaria tan-
tum habent.

His in vniuersum de auibus disputatis, Ill. Au-
ctor ad *aves rapaces* transit. Quamquam enim
omnes fere aues aliis animalibus vescuntur, rapaces
tamen speciatim ac proprie eae dicuntur, quae aliis
auibus bellum quasi perpetuum minitantur, earum-
que carnes cibi loco vehementer appetunt. Nu-
mero pauciores, inter aues, rapaces, quam qua-
drupeda istius indolis reperiuntur. Plures tamen
ex aquaticis pisciuorae sunt. Rapaces vero proprie
sic dictae omnes praedam vnguibus arripiunt et
rostro breui et incuruato, digitis separatis non
membrana coniunctis, pedibus robustioribus, vt
plurimum plumosis, vnguibus magnis incuruisque
instructae sunt. In his omnibus mares minores
sunt feminis, cum in reliquis ordinibus mares femi-
nas magnitudine superent. Quatuor, vt plurimum,
oua eas ponere Ill. LINNAEUS in *Systemate na-
turae* quidem asserit. Sed aquilae duo, aliae mino-
res septem fere oua ponunt, quemadmodum in omni
animalium classe fere semper minores foecundiores
sunt maioribus speciebus. Color plumarum in iu-
nioribus valde differt ab adulatorum colore; quae
res fecit, vt quidam specierum numerum praeter ne-
cessita-

cessitatem auxerint. Sic quoque in auium rapacium diuerso sexu color admodum differt.

Aquilarum in Europa notarum sex tantum species Cl. Auctor constituit. Sunt eae ; 1) *Aquila crysaetos* s. *maior* s. *Falco crysaetos* Cl. LINN, cui ceram coerulescentem Auctor Ill. tribuit. Habitat ea non in Europa solum, sed et in Asia et Africa, atque quoad mores et viuendi rationem cum leone comparari potest. 2) *Aquila communis* quae *Falconem fuluum* LINN. cum eius varietate *Aquila canadensi* EDW. et *F. melanaetum* L. comprehendit. 3) *Aquila minor* s. *aquila naeuia* BRISSONII, quam *aquilam rupestrem* (Steinadler) Germanorum esse (FRITSCH Tab. LXXI.) Cl. Auctor suspicatur. Alii *aquilam clangam* vocant, eaque facilius reliquis mansuescit. Hae tres species proprie *aquilarum* genus constituunt, cum sequentes iam in nonnullis ab iis differant. Sunt vero eae: 4) *Pygargus*, sub quo tres species *Falconem* scilicet *leucocephalum* LINN. *F. pygargum* EIUDEM et *aquilam abicillam minorem* BRISSONII Noster comprehendit. Hic cera lutea, pedibus semilanatis et cauda alba ab *aquilis* differt, quae ceram coerulescentem pedesque lanatos habent. 5) *Aquila marina* siue *balbuzard* est *Falco haliaetus* LINN. Huic pedes coerulescentes vel viridescentes sunt, et vncus digiti postici, reliquorum digitorum vncis breuior est. 6) *Aquila marina maior* siue *Orfraie* vel *F. Ossifraga* LINN. Haec magnitudine ad aquilam maiorem accedit. Vncos nigrigantes, pedes semilanatos viridescentes et barbam plumosam habet. Vinea in hac aue singulari membrana ab ALDROVANDO descripta clauditur. Noctu quoque pisces venatur. Hanc cum praecedente, licet magnitudine differant, coitu misceri Cel. Auctor suspicatur. Hisce speciebus adnectit aliam, quam Galli-

p. 71.

p. 76.

p. 86.

p. 91.

p. 99.

p. 103.

p. 112.

p. 124.

Gallico nomine *Jean le blanc* vocat, et quae *Pygar-
gus* BRISSONII est. Haec in Gallia frequenter oc-
currit, licet in septentrionalibus regionibus non
p. 136. reperiat. In fine tandem *aquilarum*, quae in ex-
teris regionibus non reperiuntur, mentio fit, ut
aquilae pondicherianae BRISS., *aquilae cristatae* EIUSD.,
et *Brasiliensis* EIUSD. cet. ad quam ultimam speciem
Falco quoque *coronatus* LINN. pertinet. *Aquila*
alba non peculiaris species, sed omnium specierum
varietas tantum est.

p. 146. Sequuntur *vultures*, qui licet corporis vi et
magnitudine aquilas superent, minus tamen gene-
rosius sunt, cadaueribus ut plurimum victitant, nec
viva animalia nisi cadauerum inopia coacti aggre-
diuntur. Plures vultures sociantur inter se, quo
eo facilius praedam capere queant. Omnibus col-
lum impenne est, vel breuissimis tantum pennis,
quae pilos mentiuntur tectum, nec oculi profundi
in orbita, ut in aquila iacent. Ingluuiem habent, qua
aquilae carent, ita ut iam ad graniura quasi acce-
p. 149. dant. Species hic descriptae sunt : 1) *Pernopterus*
p. 151. *s. vultur pernopterus* LINN. 2) *Gryphus*, ad quam
speciem *Vultur fulvus* BRISSONII, quem LINNAEUS
etiam ad *pernopterus* refert, *aureus* BRISS. et *niger*
p. 158. BELLONII pertinent. 3) *Vultur* proprie sic dictus,
p. 159. seu *Vultur magnus* vel *cinereus* BRISSONII. 4) *Vultur*
p. 164. *cristatus* BRISS. *s. Vautour à aigrettes*. 5) *Vultur*
minor leucocephalus. Adduntur species exoticae v. c.
Vultur Papa L., *Vultur aura* EIUSD. qui gallopauo-
nem figura et colorum varietate refert, et *Condor*
s. Vultur gryphus LINN. qui inter aves volantes
maximus est, et quem non Americae meridionali
tantum proprium, sed et in Gallia repertum esse, ex
Cl. SALERNE alio loco adducto testimonio *) probat.
Suspi-

*) vid. comment. nostr. Vol. XVII. p. 46.

Susplicatur quoque hanc auem illam esse, quam in Heluetia (*der Lämmergeyer*) vocant.

His propositis ad *miluos*, *buteones* et aues iis p. 197. analogas Cl. Auctor transit. Earum numerus longe maior est quam vulturum et aquilarum. Vnica *Milui* species in Gallia occurrit, (*Falco miluus* LINN.) quae cauda forficata distinguitur. Accedit *Milvus niger* BELON. et *Falco furcatus* L. *Miluum* excipit p. 206. *Buteo* (*la Buse*) s. *Falco buteo* L. qui colore multum variat. Auis, quae hic *Bondrée* vocatur, est *F. apivorus* L. et ceram luteam habet. Hac occasione Cl. Auctor monet, cerae colorem in auibus pro varia earum aetate ita variare, vt v. c. in iunioribus alba, in adultis lutea et tandem in aetate prouectis coerulescens et nigricans fiat, quod demonstrat diuisionem *Falconum* a LINNAEO Ill. factam secundum cerae colorem, minus aptam esse. *Auis S. Martini* Auctoris p. 212. nostri est *Falco coeruleus* EDWARDI, vel *cinereus* BRISS. an *F. cyaneus* LINN.? Species, quae *la Soubuse* p. 215. vocatur est *Fallo torquatus* BRISS. an *Falco subbuteo* LINN? *La Harpaye* Auctoris est *Circus rufus* BRISSE- p. 217. ni; *le Busard* vero *F. aeruginosus* L. In fine descrip- p. 218. tiones auium exoticarum, quae cum *miluo*, *buteone* et *subbuteone* conueniunt, adduntur.

Sequuntur *Accipitres* proprie sic dicti. Inter p. 225. hos 1) species *Falco nisus* LINNAEI (*l'epervier*) est; 2) est *Falco palumbarius* EIUDEM, seu *Astur* (*l'autour*) Auctoris nostri. Aues exoticae, quae cum iis similitudinem habent, breuiter quoque solito more commemorantur.

Inter aues, quae proprie ad aucupia adhibentur, p. 239. maxime *Falco gyrfalco* L. (*le Gerfaut*) eminet, quae species inprimis ex Islandia et Russia affertur. *Falco*
Vol. XVIII. P. III, K k lana-

- p. 243. *lanarius* L. (*le Lanier*) iam in Gallia rarissime reperitur. *Le Sacre* Auctoris Nostri *Falco sacer* a LIN-
- p. 247. NAEO vocatur. Accedit tunc Noster ad *Falconem vulgarem*, sub quo varietates fere omnes a BRIS-
SONIO indicatas et *Falconem gentilem* LINN. comprehendit. Fusius hic modus describitur, quo man-
fuescit et ad artem aucupariam instruitur. Nidifi-
cat in rupibus. *Falco hornotinus* BRISS. (*faucon
sors*) iunior huius speciei, vt *Falco gibbosus* (*faucon
hagard*) iam ad senectutem prouectus est. *Gentilis*
vocatur, si in arte aucuparia bene instructus est.
Species, quae *peregrina* dicitur s. *nigra* a vulgari
specie pluribus differt, et non in Gallia nidificat, sed
in migratione tantum capitur, nec arti aucupariae
adeo vt praecedens apta est. Exoticas falconum
species omittimus.

- p. 277. Adduntur tandem in fine aliae aues rapaces
diurnae minores vt: *le Hobereau* (*Falco subbuteo* L.)
la Cresserelle (*F. tinnunculus* EIUSD.) cuius femina
accipiter alaudarius a variis Auctoribus vocatur;
le Rochier (*Lithofalco* BRISSONII,) *l'émerillon* aucu-
pariorum siue *aesalon*. Hic inter rapaces diurnas
minimus est, et hoc singulare habet, quod in hac
specie mas et femina magnitudine conueniant, cum
inter reliquas aues rapaces mas semper minor sit:
- p. 290. quod ex Auctoris Nostri obseruatione a diuersa
intestini coeci structura pendet, quod in maribus sim-
- p. 296. plex, in feminis vero duplex est. Agmen harum
auium *Laniorum* indigenae species claudunt: *La-
nius* scilicet *excubitor* L. (*Pie-grièsche grise* BRISSO-
NII); *Lanius rufus* (*Pie-grièsche rouffe* seu *Lanius
collurio femina* L.) et *Lanius* (*l'Ecorcheur*) quem LIN-
- p. 308. NAEUS pro mare *Collurionis* habet, qui vero secun-
dum Nostri Auctoris mentem peculiarem speciem
con-

constituit. Species huc pertinentes exoticas sicco pede transimus.

His de auibus rapacibus diurnis expositis *Cel.* p. 317. Auctor iam ad illas nocturnas accedit, quae rapinis aliorum animalium vitam sustentant. Earum omnium oculi tam acri et subtili sensu instructi sunt, ut a diei lumine obfuscentur. Interim tamen non in densa caligine, ut vulgo putatur, videre eae aues possunt, sed noctes, quibus luna splendet, aut primas noctis horas victui conquirendo impendunt. Diurno tempore vel homine appropinquante non longe auolant, et si ab aliis auiculis conspiciuntur, ab iis circumuolantibus impune laceffuntur et percutiuntur. Nocte vero appropinquante, omnes hae auiculae noctuam, quae videndi facultatem nunc acquirit, iterum fugiunt. Interim tamen *Bubo maior* et *Strix passerina* etiam diei lucem quodammodo perferunt. Omnes hae aues, si eam bubonis speciem, quae *scops* dicitur excipias, non migrant. Pupilla earum a lucis radiis, ut in felibus, constringitur, eo tamen discrimine, ut apertura, quae restat, non ut in illis longitudinalis sit, sed semper rotunda maneat. Auditu exquisitissimo pollent, quod vel concha auris internae, in hisce auibus longe maior quam in reliquis animalibus, indicat. Externam organi auditus aperturam pro lubitu claudere vel aperire possunt. Rostrum plumis in omnibus fere speciebus tegitur. Vtramque maxillam ut psittaci mobilem habent, ita ut rictus oris iis amplissimus sit. Unus ex digitis pedum anterioribus mobilis et versatilis quasi est, atque reflecti potest. Volatus ratio a modo, quo aliae aues volant, diuersa est, et sine omni fere strepitu et lateraliter quasi fit. Quae de nominibus variis auibus nocturnis ab ARISTOTELE tributis Ill. Auctor eleganter disputat, omittimus.

Ipsas vero avium harum species omnes, quae
 ab Ill. LINNAEO sub vnico genere, quod *Strix* vo-
 cat, comprehenduntur, Ill. DE BUFFON in duo ge-
 nera diuidit. Horum primum eas species compre-
 hendit, quae capite auriculato sunt, alterum vero
 eas, quae caput inauriculatum habent. Prius *Bubo*
 seu *Duc*; posterius *Noctua* vocatur. Prioris generis
 species sunt: 1) *Le Duc* siue *le grand Duc* (*Strix bu-*
bo LINN.) quem Germani a sono vocis *Vhu* vocant,
 cuius varietas non solum *Strix atheniensis* LINN. sed
 et *Strix scandiaca* EUSD. albido corpore est. Haec
 auis in omnibus fere climatibus reperitur. 2) *Le*
Hibou seu *le moyen Duc* (*Strix otus* L.) Haec in ni-
 dos aliarum avium oua sua ponit. *Strix asio* L. seu
cerolinensis huius tantum est varietas. 3) *Le petit*
Duc (*Strix scops* L.) cuius auriculae minimae tantum
 sunt, quae migrat et gregaria est. Ad posterius
 genus pertinent: 4) *La Hulotte* (*Strix aluco* L.) quae
 in syluis habitat. Huic iris atra est. 5) *Le Chat-huant*
 (*Strix stridula* L.) iridibus coeruleis, quae, etiam in-
 cola sylvarum est. 6) *l'Effrayé* seu *Fressaie* (*Strix flam-*
mea L.) iride lutea. Haec in turribus habitat, vt se-
 quens species 7) *la Chouette* seu *la grande Cheueche*
 (*Strix ulula* L.) in rupibus. Huic quoque irides
 luteae sunt. Vltima est 8) *la Cheueche* seu *la petite*
Chouette (*Strix passerina* L.) quae irides pallide luteas
 habet, et si defectum auricularum excipias cum vltima
 species bubonis 3. satis conuenit. Adduntur variae
 species exoticae, inter quas *Strix nyctea* seu *Har-*
fang et *funerea* s. *Canadensis* est.

p. 394. In fine huius voluminis aues, quae volare non
 possunt, sed tantum in terra currunt, indicantur.
 Inter has primum locum obtinet *Struthio*, qui pro-
 xime ad quadrupeda, tum pedum structura, et toto
 corporis habitu, tum etiam interna fabrica accedit.

Notif-

Notissima est haec avis et iam a primis temporibus cognita, cum eius in sacris scripturis aliquoties mentio fiat. Orificium meatus auditorii, ut in quadrupedibus, apertum est. Meatus ipse internus pilis tegitur. Palpebra superior mobilis est. Sceleti forma etiam ad quadrupeda accedit, quod et de lingua, pharynge, oesophago, ventriculo et intestinis, et cerebro valere, fusius hic demonstratur. Penem non reconditum, sed extus conspicuum et quasi spongiosum, femina vero clitoridem habet; ex quibus omnibus Noster struthionem partim ad quadrupeda, partim ad aves pertinere ostendit. Foecunda haec avis est et ova plura ponit. Struthionem ova sua non incubare, tantum de calidissimis Africae regionibus valet, nam circa Caput bonae spei ubi noctes frigidiores sunt, nocturno tempore hoc negotium, ut aliae aves peragit. Gustu et odoratu fere caret, et lapides, ferrum cet. ex sola necessitate ventriculum capacissimum implendi, deglutit. Antiqui orbis et Africae potissimum incola est.

Le Touyou est *Struthio Rhea* LINN. qui in Ame. P. 452. rica australi tantum reperitur. Ad sex pedum altitudinem increscit. Capite, collo et rostro cum Struthione tantum conuenit, reliquo corpore vero ad Casuarii formam accedit.

Casuarus s. *Struthio casuarus* LINN. in India p. 464. orientali tantum inuenitur. Unguis intermedius non maior est, ut LINNAEUS asserit, sed interior reliquos duos magnitudine superat. Intestina brevissima sunt, ita ut alimenta ore assumpta v. c. poma, saepe plane non digesta, iterum ex ano exeant. Quorum puncta non excavata sunt, sed pluribus tuberculis instructa, quae viridiscentem colorem habent, cum totum ouum griseum sit. Quae de singulari

gulari forma huius animalis et anatomica eius disquisitione ex aliis Auctoribus adducuntur, cum cognita iam sint, omittimus.

p. 480. *Le Dronte* f. *Didus ineptus* L. non modo cum struthione et reliquis iam descriptis auibus, in eo convenit, quod volatui non aptus sit, sed et tardigradus est; formaeque singularitate et quasi deformitate, reliquas aues omnes superat. In Insula tantum *S. Mauritii*, quae nunc *Isle de France* dicitur, et Insula *Bourbon* ac forte in vicina terra australi continente reperitur. Cum Dido conueniunt, magnitudine, alarum et corporis forma aues aliae duae, ex itinerariis tantum cognitae, quae etiam in Insulis modo dictis aliisque vicinis ad huc usque diem tantum inuentae sunt, et de quibus nondum perfecte constat, num ad Didi genus pertineant, vel ab eo differant. Sunt eae *Eremita* seu *le Solitaire* et *avis de Nazareth* (*l'oiseau de Nazareth*) quae nomen suum ab Insula *Nazare*, in qua habitat, accepit.

In tabulis aeneis huic volumini adnexis sequentes aues delineantur. 1) *Falco crysaetus* LINN. 2) *Falco haliaetus* L. (*le balbuzard*) 3) *Falco ossifraga* (*l'Orfraye*) 4) *Falco*, qui *Iean le Blanc* dicitur 5) *Vultur* (*le Vautour*). 6) *Vultur Papa* (*le Roi des Vautours*): 7) *F. Miluus* (*le Milan*). 8) *F. Buteo* L. (*la Buse*). 9) *F. Subbuteo* LINN? (*la Soubuse*) 10) *F. aeruginosus* (*le Busard*) 11) *F. Nisus* (*l'épervier*) 12) *F. palumbarius* (*l'Autour*). 13) *F. gyrfalco* (*le Gerfaut*). 14) *F. Sacer* (*le Sacre*). 15) *Falco gentilis iunior* (*Faucon sort*) 16) *Falco gentilis adultus* (*Faucon hagard*) 17) *F. subbuteo* L. (*le hobereau*;) 18) *F. tinnunculus* L. (*la creffernelle*) 19) *Aesalon*. (*l'émerillon*.) 20) *Lanius excubitor* L. (*Pie-grièche grise*;) 21) *L. collurio* L. (*le Lanier*) 22)

Strix

Strix bubo (le grand duc). 23) *Strix otus* (le hibou)
24) *Strix scops* (le petit duc). 25) *Strix stridula* (le
chat-huant. 26) *Strix flammea* (l'effraie). 27) *S.*
ulula (la grande Chouette). 28) *S. passerina* (la che-
veche f. la petite Chouette.) 29) *Struthio camelus*
(l'Autruche). *)

Initium secundi voluminis *Otis tarda* (l'outarde) Tom.
facit, cuius avis synonyma miro modo ab Auctori- II.
bus inter se et cum aliarum avium nominibus con- p. 1.
funduntur. Magnitudo et pondus eius insigniter
variant, vti in vniuersum plures in hac specie varie-
tates deprehenduntur. Lingua eorum ferrata est,
et acuta, non vero bifida. Ventriculum vnicum
habet, et intestina breuia. In Gallia rarius haec
avis occurrit, et num hyemali tempore migret, non-
dum satis constat. In America non reperitur.

Otis tetrax LINN. (*Canepetière*) maiore specie p. 40.
longe minor est. Non in omnibus Galliae prouin-
ciis occurrit, interim tamen in hoc regno longe fre-
K k 4 quen-

*) Vti praeter eam, quam Cel. KAESTNERUS curauit
Buffoniani historiae quadrupedum versionem germa-
nicam, quae in quarta forma impressa est, alia
versio germanica seu epitome quasi cura Cl. MAR-
TINI Berolini iam prodit, ita etiam idem Cl. MAR-
TINI ornithologiam hanc in germanicam linguam
translatam et egregiis observationibus auctam, octaua
forma edere coepit, cuius volumen primum iam pu-
blicatum est. Titulum habet sequentem: *Herrn von*
Buffons Naturgeschichte der Vögel aus dem Französi-
schen übersetzt, und mit Anmerkungen, Zusätzen und
vielen Kupfern vermehret, durch F. W. H. MARTINI.
I Band, Berlin 1772. 8. Continet hoc volumen aui-
las, vultures et miluos et 21 tabulis aeneis ornatur,
quae partim ex maiore opere BUFFONII, partim ex
CATESEYO, EDUARDO, FRITSCHIO desumptae
sunt.

quentior, quam in aliis Europae partibus est. Migrat.

p. 52. Adduntur 1) *Otis arabs* LINN., quam auem Ill. Auctor *Lohong* seu *Otidem cristatam arabicam* vocat. 2) *Otis afra* LINN., quae ab aliis *Struthio volans Senegallensis* et 3) *Churge* seu *Otis minor indica* quae a BRISSONIO *Pluvialis Bengalensis maior* dicitur. 4) *Houbara* s. *Otis minor cristata Africana*, 5) et alia *minor cristata Africana*, quae *Rhaad* ab incolis vocatur.

p. 63. Sequitur *Galli gallinacei* historia, cuius initium cum oui descriptione et oui incubati mutationibus Cl. Auctor facit, in quibus tamen exponendis accuratiora multo tradere potuisset, si iis, quae recentiores et Ill. HALLERUS imprimis de hac re exposuerunt, usus esset. Deinde methodum Cl. REAUMURI oua artificiali ratione excludendi fuse ex eius scriptis exponit; in qua re praecipue cura habenda est, ne aer iusto humidior fiat, sed semper renouetur et iustus caloris gradus feruetur. Tres quasi ventriculos habet gallus, *ingluuiem* scilicet (*le jabot*), *canalem intermedium* glandulis refertum, et *ventriculum ipsum* (*le gésier*), quatuor musculis instructum, in quo succus manifeste acidus continetur. Vti omnes aues cellulas quasdam aereas habent, quae cum pulmone et ramis bronchiorum communicant, ita quoque gallinis duae etiam similes cellulae in abdomine sunt, quarum motus cum motu pulmonum asynchronus est, ita vt in expiratione dilatentur et in inspiratione contrahantur. Gallinas etiam testiculos vt gallos habere Noster putat. Naturale gallorum clima Persia est, feros tamen gallos gallinaceos in variis Indiae orientalis locis quoque reperiri asserit. In Americam ex Europa alati demum sunt.

sunt. Ferae ex domesticis factae gallinae nidos, ut aliae similes aues struunt.

Alia contra auis domestica *Meleagris Gallopauo* p. 132.
LINN. (*Dindon*) non ex Indiae orientalis regione *Calecut*, uti nomen Germanicum eius indicat, sed ex America septentrionali in Europam introducta est. Barba pectoris in mare, si accurate loquendum est, non ex pectore, sed ex colli inferiore parte, atque in Gallia iam secundo aetatis anno excrescit. Fera maior est domesticae et magis nigrescentem colorem obtinet. Veteribus, uti fusius hic exponitur, haec auis plane incognita fuit.

Contrarium de *Numida meleagride* LINN. quam p. 163.
Galli *la Peintade* vocant, asseri potest, cum plurima testimonia existant, Romanos iam eam cognovisse et aluisse. Euanuit tamen postea eius notio, usque dum medio aevo iterum ex natali solo Africa in Europam allata fuit. Non sexu tantum eas, quae palearia et cristam coerulescentem habeant, ab iis, quibus hae partes rubeant differre, sed plane diuersas species, seu potius varietates esse, plurima probant. Atque in vniuersum hae aues multum variant. Habitant in paludibus et regionibus vliginosis, hinc etiam pedum digiti membrana coniuncti sunt. Difficulus in nostris regionibus pulli huius speciei educantur. Ex gallis gallinaceis et hisce auibz hybrida species nascitur, quae tamen non ulterius propagatur.

Tetrao urogalius L. in montosis et frigidis regio p. 191.
nibus habitat. Vocatur ab Ill. Auctore *Tetras* siue *le grand coq de Bruyere*. Vescitur gemmis et summitatibus arborum cet.

Tetrao tetrrix L. Nostro *le petit tetras* siue *le coq de bruyere* à queue fourchueau dicitur. Mas et femina tum magnitudine tum coloribus ita differunt, vt nonnulli Auctores pro diuersis auibus descripserint. Hyemali tempore alto quasi somno nonnumquam has aues sepeliri Noster asserit. An forte ex loco LINN. *System.* Ed, XII. p. 372 minus bene intellecto?

- P. 227. Sequuntur: *Tetrao tetrrix cauda integra*, quae
P. 230. forte prioris est varietas; *Tetrao tetrrix colore variabili* (à plumage variable). Haec aestate ex rufo brunescens est, hyemali vero tempore alba vel ex griseo-coerulea reperitur; *Tetrao bonasia* siue *la gélise* nocte, quam FRISCHIUS aliique cum alia aue, quae
P. 242. *attagen* vocatur, confundunt; *Bonasa scotica* BRIS-
SONII, quam nonnulli quidem ad *lagopum* referunt quae vero ex Nostri Auctoris opinione plane distincta species est. *Le Ganga* siue *bonasa pyrenaica* Ill. DE BUFFON est *Tetrao alchata* LINN. cuius speciei synonyma valde ab Auctoribus confundunt. Haec in calidioribus regionibus antiqui orbis satis frequenter occurrit. Duabus pennis rectricibus filiformibus instructa est. *L' Attagas* est *Attagen* seu *lagopus cristata* BRIS-
SONII vel *Francolinus* BELONII. In hac aue supra vtrumque oculum cutis nuda est et coccinea, figuram lunatam quasi efficiens, hinc etiam ab Anglis *Red Game* dicitur. Montosa amat et in omnibus fere regionibus reperitur. A FRISCHIO illam cum *Bonasia* confundi, iam supra monuimus. Celeriter currit, et mansuescit quoque. *Attagen alba*, an praecedentis varietas? *Tetrao lagopus* LINN. seu *Lagopus* BRISS. (*le Lagopede*). Hyeme tantum alba est. Pedum digiti inferius pilis brevissimis vt leporis planta teguntur. Solis radios fugit haec auis, a quibus obfuscatur. De reliquo satis stupida est. *Lagopus freti Hudsoni* s. *perdix alba*

EDWARDI male a BRISSONIO ad *lagopum vulgarem* p. 276. refertur. Perdix longe maior est, et magnitudine ad phasianum fere accedit. Cuniculos in niue haec species agit.

His adduntur *aves exoticæ, quæ cum tetraone*, p. 279. *bonasia* cet. conueniunt, vt *Bonasia Canadensis* BRISSONII seu *Tetrao togatus* LINN.: *Bonasia cristata Canadensis* BRISSONII et *Attagen Pensylvaniæ* EIUSD. quæ vnâ eandemque speciem, seu *Tetraonem umbellum* LINN. constituunt. etc.

Pauo cristatus pulcherrimus omnium auium in p. 288. India orientali proprie habitat. Vocem eorum non ingrati esse Auctor Cel. putat. *Pauo albus* præcedentis varietas est, quæ fera in Noruegia reperitur. p. 322. A frigoris vi pendet haec mutatio coloris, quæ vero non hyeme tantum durat, sed constans est. Quæ de moribus, educatione pauonum cet. adducuntur, nota sunt.

Phasianus Colchicus LINN. ab Argonautis primum p. 328. in Graeciam introductus est, iam vero in omnibus fere regionibus, reperitur. Nonnunquam cum *gallinis* coitu miscetur et hybrida species inde nascitur. Varietates eius *Phasianus albus* et *varius* sunt. Hybrida species ex gallinis et phasiano mare *Cocquar* p. 353. Nostro audit. Adduntur *aves exoticæ*, quæ ad genus Phasiani pertinent, inter quas pulcherrima illa p. 354. species est, quæ a Nostro *Phasianus auratus* seu *tricolor*, a LINNAEO vero *Phasianus pictus* vocatur, et quæ ex China in Europam introducta fuit. Porro huc pertinet *Phasianus nycthemerus* LINN; *Phasianus Argus* EIUSD; *Phasianus cornutus* s. *Napaal* Auctoris, qui a LINNAEO *Meleagris Satyra* vocatur, et *Katraca* siue *Phasianus Motmot* LINN. Minus cognitæ

tae sunt: *Chinguis* Auctoris Ill. siue *Pauo Tibetanus* BRISSONII aut *Pauonis bicalcarati* LIN. varietas: *Spicifer* Auctoris seu *Pauo Iaponensis* BRISS. vel *Pauo muticus* LINN.: *Calcaratus* (l'eperonnier) seu *Phasianus pauonicus chinensis* BRISS. aut *Pauo bicalcaratus* LINN.

P. 373. *Phasianorum* genus aliud, quod *Hocco* Noster, LINN. vero *Crax* vocat excipit, cuius species omnes Americae meridionalis incolae sunt. Sunt eae *Hocco* proprie sic dictus (*Crax alector* LINN.) quorsum et *Crax globicera* LINN. cet. refertur. Facile mansuescit; *Crax Pauxi* LINN; quae praecedente longe rarior est; l' *Hoazin*; l' *Yacou* seu *Meleagris cristata* LINN.; le *Marail* etc. Plures alias species, quae solis barbaris nominibus indicantur, indicasse tantum sufficiat.

P. 396. *Perdicum* genus amplissimum ex duabus tantum speciebus in Gallia vulgaribus constat: sunt eae: 1) *Perdix cinerea* s. *Tetrao perdix* LINN. cuius varietates *Perdix damascena* ALDROVANDI et *montana* sunt, 2) *Perdix rufa* s. *Tetrao rufus* LINN., quae etiam aliquas varietates comprehendit. Plures vero alias species, ut *Tetraonem orientalem* LINN. *T. bicalcaratum* EIUSD. ab iis seiungit, cum viuendi ratio iis longe diuersa sit. *Perdicem rufam* Noster in duas varietates distinguit, quarum primam *la Bartauelle* vocat, a qua *Perdix graeca* BELONII differt, quae in Graecia frequens est. Altera *rufa Europaea*, inter praecedentem et griseam quasi media est, et in Australi Europa potissimum reperitur.

P. 438. *Francolinus*, ab ea aue, quam *Attagen* (p. 522.) Noster vocat plane differt, et a LINNAEO *Tetrao Francolinus* vocatur. In calidioribus tantum Europae

paë prouinciis et rarius quidem, frequentius contra in Archipelagi insulis et Syria reperitur. Elegantes colores ostendunt plumae eius, et inprimis collari aurantii coloris ornatus deprehenditur. Alias exoticas et minus cognitatas species omittimus.

Vicinum perdici est *Coturnicis* genus, licet magnitudine aliisque proprietatibus insigniter differant. P. 449.
Coturnices migrant, ventorum vi in itinere suo adiuti. Exoticae species plures et hic quoque adduntur.

Finem huius voluminis facit amplissimum *Columbarum* genus, a quo tamen *Palumbus* et *Turtur* separantur. Duas tantum veras columbarum species P. 491.
Noster agnoscit, *Columbam* scilicet *liuiam* BRISS. et *domesticam*, quae tamen inter se proxime conueniunt, cum ex domesticis ferae iterum fiant. *Columba oenas liuiae* tantum varietas est, seu potius ex domestica fera facta oritur. *Domesticae* varietates, quae ab aliis ut totidem species considerantur, omittimus; inseruit vero Cel. Auctor amplissimum eorum stemma, uti olim de canibus in opere priore iam fecerat. *Columba Palumbus* longe maior vulgari est, et cum eo miscetur, quod difficilius a *Turture*, seu tertia specie fit. Varietates et species exoticas spatii angustia impediti sicco pede transimus. In tabulis aeneis huic volumini adnexis sequentes aues delineantur: 1) *Otis*. 2) *Gallus gallinaceus*. 3) *Gallopauo*. 4) *Numida meleagris* L. 5) *Tetrao urogallus* L. 6) *Tetrao tetrrix* L. 7) *Tetrao bonasia* L. 8) *Tetrao alchata* L. 9) *Tetrao lagopus* L. 10) *Pauo* 11) *Phasianus colchicus* L. 12) Phasiani species hybrida *Coquar* dicta 13) *Crax alector* L. mas. 14) *Eiusd.* femina. 15) *Tetrao rufus* LINN. 16) *Coturnix*. 17) *Columba gutturosa* L. 18) Eadem gutture inflato. 19) *Columba cucullata* L. (nonain). 20) *Columba polonica* Auctoris. 21) *Columba iamaicensis* EIUUSD. 22) *C. laticauda*

cauda L. 23) *C. turbita* L. 24) *Palumbus*. 25) *Turtur vulgaris* vel *C. Turtur* L. 26) *C. risoria* LINN. 27) *Turtur albus*.

XX.

Directions for bringing over seeds and plants, from the East Indies and other distant countries, in a state of vegetation: Together with a Catalogue of such foreign plants, as are worthy of being encouraged in our American colonies, for the purposes of Medicine, Agriculture and Commerce. To which is added, the figure and Botanical description of a new sensitive plant, called *Dionaea Muscipula*: or *Venus's Fly-Trap*. By JOHN ELLIS. F. R. S. London, printed and sold by L. Davis. 1770. 4. p. 41. Tab. aen. 2.

i. e.

Modi, quibus semina plantaeque, ex India orientali, aliisque remotis regionibus, salua vi vegetandi ad nos transferri queant; cum enumeratione praecipuarum in America colendarum plantarum. His accedunt figura et descriptio nouae plantae sensitiuae, dionaea muscipula dictae. Auctore IOHANNE ELLIS, Regiae societatis socio.

Cl. Auctor huius libelli, quem diligentem naturae obseruatorem esse ex variis ab eo editis libris constat, alia hic ad augendam et amplificandam rem herbariam proponit auxilia, quibus semina et ipsae plantae peregrinae, a Chinenfibus saepe adulterata, non solum recte examinari, sed etiam perlongissi-

longiffimam viam, falua vi vegetandi, in Europam, inprimis in Angliam vehi poffint. Chinenfium frau-
di, quae faepius, in magna feminum varietate em-
toribus oblata, fieri folet, occurrendum effe exifti-
mat, ita, vt grana maiora difcindantur, eorumque
folia feminalia microfcopio infpiciantur: quae, fi
fucci plena et alba fint, integra effe; fin corrugata
et nigri coloris, corrupta effe, cognofci. Minora et
imperfecta femina reiicienda effe. Generatim ne
ceffe effe, vt femina fint matura, in ficca tempe-
ftate collecta, et in loco aereo, non tamen radiis fo-
lis expofito, fuper charta difperfa ficcentur, ne in
itinere fitu et putredine corrumpantur. Tum du-
plicem rationem, vfu iam probatam, femina in alia
loca vehendi tradit: alteram, quam in Philofophicis
Transactionibus *) iam expofuit, hic breuiter repe-
tit, et quaedam de tractandis feminibus *Mangiferae*
Indicae, LINN. addit; alteram, cuius vfu in femi-
nibus Theae transuehendis cognitus fuerit, praeci-
pit effe hanc, vt femina, pericarpio inclufa, vasis
ftanneis, charta ferica vel Chinenfi intus veftitis, im-
mittantur, arcte compingantur, eademque charta
obtegantur, vasisque probe claufis, aereo loco expo-
nantur. Ne femina radices agant, fingula prius, quam
vasis includantur, charta inuoluenda effe. Deinde
fuadet, vt vel in infula Helenae, vel in alio loco,
qui propior fit Europae, femina dolio terra repleto
inferantur, et fata leuiter irrigentur. Varia vafa,
quibus femina inferantur, plantaeque iuniores trans-
ferantur, describit, eaque in tabula aenea delineata
fifit. Haec, praeter magnitudinem firmitatemque
conuenientem, ita exftruenda effe praecipit, vt et
libero aeri accessus pateat, et contenta ab infectis,
potiffimum gliribus defendantur; hinc foramina,
in lateribus vaforum excauata, filis metallinis effe
munien-

p. 2.

p. 3.

p. 5.

p. 7.

*) vid. comm. noftr. Vol. XVII. p. 389.

munienda; ipsa vasa radiis solaribus non exponenda, interdum aperienda, et diligenter custodienda. Deinde fundum vasis musco madido ad tres pollices esse replendum, cui terra recens limosa ad duodecim pollices immittatur, illiusque superficiem rursus strato musci tenui, subinde aqua irrigando, esse tegendam. In plantis ipsis transuehendis ad tempus anni maxime respici iubet, illudque vere vel ipsa hyeme, ita, vt calida anni tempestate ad nos veniant, optime fieri putat. Radices, solo nativo cinctas, musco arcte filis linteis esse ligandas, et ipsas plantas in vasis singularibus firmiter collocandas. Vasis ratio, in quo aptissime id fiat, ex figura addita patet. His plures semina conseruandi rationes subiungit, ex quibus, cum omnes a nobis commemorari nequeant, illam proponamus, quae Cl. Auctori ab Ill. LINNAEO communicata est. Semina, tenui sabulo mista, chartae inuolui iubet, et vasis vitrei, vel terreis immitti, eorumque orificia vesica occludi; haec vasa aliis maioribus ita imponi, vt spatium duorum pollicum, quod ea intercedat, repleatur salis communis et nitri partibus anaticis, et tantundem salis ammoniaci. Cl. Auctor his salibus sal commune solum substitui posse existimat. Caeterae rationes ad insecta potissimum a seminibus arcenda faciunt.

p. 22. Quae sequitur enumeratio plantarum, octoginta et duas continet, in variis calidis regionibus nascentes, quas, cum vel non satis recte colantur, vel medicamenta ex iis parata valde adulterentur, vel vis naturae ipsarum nondum satis sit cognita, in Americis Anglorum coloniis coli iubet, quo facilius et melius iis vti possimus. Recenset eas nominibus Linneanis: atque Anglicis, indicat deinde singularum patriam, denique quasdam de usu, quem

quem habeant, vel in medicina, vel oeconomia, observationes lectu dignissimas addit.

In litteris ad Ill. LINNAEUM datis*) plantam noviter repertam irritabilem describit, eamque icone depingit. Character eius est: CLASS. Decandria. ORDO, Monogynia. GEN. *Dionaea Muscipula*. CAL. *Perianthium* pentaphyllum, foliolis erectis, ovatis, concavis, acutis. COR. *Petala* quinque, obovata, concava, obtusa, margine convoluto, septem striis pellucidis lineata. STAM. *Filamenta* decem, aequalia, petalis breviora; *Antherae* subrotundae; *Pollen* sub microscopio maxime augente tricoccum apparet. PISTILL. *Germen* subrotundum, superum, paululum depressum, sulcatum; *Stylus* filiformis, filamentis brevior; *Stigma* patulum, margine fimbriatum. PERICARP. *Capsula* subrotunda, unilocularis. SEM. plura, parva, ovalia, fundo capsulae affixa. Irritabilitas eius in foliis conspicitur, quae duplicata sunt, inferius cordata, superius biloba. Lobi hi in margine setis ciliati, et in superficie superiori singularibus glandulis, eiusque media parte aculeis parvis, erectis, sunt praediti. Qui, si quacunque de causa irritentur, arctissime clauduntur, nec prius expanduntur, quam si, quod arreptum est, facile eximitur. Cl. Auctor opinatur, hanc plantam ex insectis ita necatis alimentum capere, atque nonnulla de eiusdem loco natali et cultura addit monita.

*) Huius epistolae versionem Latinam et Germanicam, adiuncta praefatione, curavit Cel. IOH. CHRIST. DANIEL SCHREBER. Erlangae. 1771. 4. pag. 18. In praefatione plantas reliquas, sensitivas dictas, breviter indicat, et hanc Oxalidi propinquam esse; Cl. ELLISII coniecturam vero de fine irritabilitatis eiusdem dubiam et incredibilem esse, arbitratur.

XXI.

ANTONII STOERCK libellus de usu medico pulsatillae nigricantis. Vindobonae. Typis Io. Thom. Nob. de Trattnern Caes. reg. aulae typogr. et bibliop. 1771. 8. mai. pagg. 61. cum praefatione et f.

Omnibus constat solertia Cl. Auctoris in disquirendis plantis efficacibus ac minus usitatissimae quae a nobis indicatae sunt in superioribus ; atque iam rursus apparet ex experimentis, cum pulsatilla nigricante ad usum eius medicum definiendum institutis, quae breuiter hic Lectoribus tradamus.

p. 7. Praemissa itaque pulsatillae nigricantis, cuius iconem Cl. STOERCK addidit, descriptione ac differentia huius a pulsatilla vulgari, qua deflorescente illa floret, ideoque secunda appellatur, usum medicum pulsatillae nigricantis officinalis *) definit, ac qualia inde parari queant remedia, docet.

p. 10. Tota planta, excepta eius radice, (nam omnes eius partes masticatae, acrem, vrentem et diu remanentem saporem linguae inprimunt, sola radix mitior est,) confissa cucurbitae vitreae imponatur, atque affundantur octo partes aquae fontanae et apposito capitello adiunctoque excipulo in balneo arenae ad medietatem abstrahatur. Haec est WELLI pharmacopei Vindobonensis aqua destillata pulsatillae nigricantis, maiorem in modum acris ac penetrans. Huius aquae residuum hic coxit, expressit, percolauit, atque ad extracti mollioris consistentiam euaporauit. Hoc extractum linguae impositum primum leniter adstringere videtur, dein pungentes dolores, ac tandem ardorem diu durantem excitat.

Ex

*) Anemone pratensis LINN. syst. natur. Tom. II. pag. 375. edit. vlt.

Ex hoc extracto confecit Noster duos pulveres, **p. 11.**
 quorum alter continebat extracti grana septem et
 drachmam vnam, alter grana quatuordecim cum ea-
 dem sacchari quantitate. Cl. STOERCK ipse primi
 huius pulveris grana quinque sumsit bis de die, ac
 dein grana decem sine omni incommodo, praeter
 lancinantem dolorem in oculo dextro, in quo ante
 biennium magnam passus fuerat contusionem. No-
 ster autem quotidie et viginti grana, sine vlla turba-
 tione functionum corporis, per quinque dies deglu-
 tiuit. Credidit itaque tuto et omni iure hunc pul-
 verem posse exhiberi aegris, iisque vnam, duas et tres
 drachmas quotidie cum fructu propinauit. Porro
 infusum ex herba sicca parauit, et drachmam vnam
 cum libra vna aquae in vase clauso digessit, ac grati sa-
 poris causa addidit saccharum. Atque huius infusi
 et fortioris, additis nonnullis drachmis, imo vncia
 dimidia herbae, tres et quatuor uncias ter de die, sine
 omni omnino incommodo tulerunt aegri.

Tentaui quoque infusum externe in foedis et **p. 13.**
 sordidis vlceribus cum optimo successu; in tinea
 capitis autem inueterata cutis inflammabatur, ca-
 put vehementer dolebat, ideoque desiit Noster illud
 applicare.

Rigiditatem brachii emaciati, post morbum rheu- **p. 14.**
 maticum relictam, in femina triginta et quinque an-
 norum interno et externo huius remedii usu iuuuit.
 Primis diebus ex usu eius vrina copiose mittebatur,
 et levis conatus vomendi aderat, caeterum nulla
 incommoda sensit aegra.

Paralyfi brachii et pedis dextri laborans, per de- **p. 17.**
 cem annos, sacerdos sexaginta et trium annorum, non
 potuit continuare cum hoc remedio ob vomitus, ex
 minima dosi abortos crebriores.

In doloribus acerbissimis, quotidie mane reuer- **p. 18.**
 tentibus, et post foeda vlcera venerea curata relictis,

utile erat hoc remedium. Gonorrhoea inueterata venerea, cum testiculo indurato, pariter hoc remedio curata est, minime autem testiculus induratus mutatus. Vidua quadraginta et duorum annorum, tophos venereos et dolores in omnibus artubus habens, praeterea ob pannum in tota cornea transparente dextri oculi a viginti annis coeca, et menstruo fluxu per tres propemodum annos destituta visum, dolorum imminutionem, atque tophorum in fronte aliquam, in reliquis partibus nullam mutationem ex pulsatillae usu obtinuit.

p. 22. Ancilla viginti et sex annorum, tophis venereis vexata, doloribus ac fluore albo penitus emaciabatur. Huic, nulla cum pulsatilla afferret commoda, praescripsit infusum flammulae iouis saturatum*), cuius usu per tres menses integre conualuit, corpore benè nutrito. Pariter flammula iouis in ulceribus foedis plus praestitit, quam pulsatilla in ancilla quatuordecim annorum.

p. 24. Aeger viginti et unius anni utroque oculo benè omnia videre potuit, et a parotide scirrhusa integre curatus est pulsatillae usu, quae in hoc exemplo, non solum dolores, ac si quis cultro aliquid in oculo abraderet, in oculis, qui copiosissime plorabant, sed et salivationem, diarrhoeam et urinae copiosorem fluxum produxit. Vtilis porro erat pulsatilla in crurum paralyti, atque ingenti ad os facrum dolore, in ulceribus venereis faucium totiusque linguae.

p. 29. Viro triginta annorum, ex apertis tumoribus lymphaticis ulcera habenti, magna ad scapulam et cubitum brachii, cum tumore genu eiusque immobilitate, indeque contabescenti, data est pulsatilla cum fructu, nec non ancillae profuit in ulcere foetidissimo.

diffimo linguae. Femina vlcere venereo carieque
offis frontis liberata est.

Ancilla viginti et quinque annorum, diu tumore P. 32.
lymphatico ad articulum genu dextri vexabatur, quo
aperto, lympa turbida emanabat, eaque ita cum
dolore genu effluere continuabat, vt contabesceret
aegra, quae ex vsu pulsatillae lymphae effluxum im-
minutum, dolores genu cessantes, atque somnum
experta est.

Porro pulsatillae efficacia exemplis confirma- P. 34.
tur in faucium vlceribus, oculi panno, tumore ad
maxillae inferioris articulum, amaurosi vtriusque
oculi, albugine, ophthalmia inflammatoria, in reli-
cta corneae cicatrice, in panno corneae post variolas,
atque in testiculis induratis.

Viro quadraginta annorum ex morbo acuto p. 48.
admodum graui in dextro orta est amaurosis,
in sinistro oculo glaucoma. Pulsatillae vsus
glaucoma minuit, iridem in oculo, amaurosi
laborante, mobilem reddit, et aeger candelam
lucentem distinguit.

Iuueni tredecim annorum ad angulum exter- p. 50.
num dextri oculi erat tumor rubro liuidus, cum cor-
nea opaca, eaque crassa albugine obducta. Decem
grana pulueris primi excitabant magnos dolores in
oculo et tumore. Paulo post, remedio continuato,
tumor abscedebat, quo sponte rupto, pus bonum
atque copiosum emanabat. Tegebatur tum tumor
emplastro diachylo simplici, et interne remedium ita
bonum praestabat effectum, vt spatio vnus mensis
tumor dissiparetur, et oculus pelluciditatem nancif-
ceretur. Porro in vlcere sordido, serpigine atque
cataracta pulsatilla commoda attulit.

Vetula vltra viginti annos oculo, ab ophthalmia P. 53.
inflammatoria destructo, sinistro nihil videbat, et
molem praeternaturalem habebat. Cui pulsatilla

exhibita, pureque postea per narem sinistram effluxo, atque ex partibus internis palpebrarum, earumque marginibus, moles oculi imminuebatur ac visus ita restituebatur, vt nunc queat obiecta distinguere. Pari modo cataracta septem annorum in sene, ope pulsatillae, per duodecim dies adhibitae, fugata est.

p. 54. Cum pulsatilla porro et in melancholia prodesset, putabat Noster eam quoque in morbo epileptico et mania posse adhiberi cum fructu. Sed vtrunque incassum est tentata pulsatilla.

p. 55. Ex his itaque pulsatillae effectibus concludit Noster, eam esse innocuam et efficacem, aegros facilius ferre extractum, quam aquam destillatam, quae largius data conatus vomendi et nauseam excitauit; extractum soluere potenter, nil tamen turbare in corpore, urinam ut plurimum copiose mouere, salutare esse iis plerumque, quibus tormina ventris excitet, et dein diarrhoeam leuiorem; sudorem ac menstrua promouere, suppressa restituere, eaque in ordinem redigere, pariter et haemorrhoides, saluationemque producere; chronicis oculorum affectibus maxime conuenire, indeque in oculis sentire aegros dolorem, qui est bonum signum; amauros in subinde curare, quandoque cataractam diminuire, pannos, vngues et albugines frequenter dissipare, sine vlllo externo remedio; infusum pulsatillae tuto interne posse exhiberi, atque externe in foedis vlceribus, carie et serpigine applicari.

p. 57. In appendice refert Noster de vsu in et externe flammulae iouis *) eiusque efficaciam, in capitis doloribus, in ossium nocturnis doloribus, in cachexia venerea, scabie, herpete, vlceribus ichorosis, fungosis, cancrofis, carie ossium, denuo confirmat, rursus in melancholia, et in cancro exulcerato mammae

Aconi

*) vid. supra p. 532.

Aconiti *) vires laudatas repetit Noster, quod parua dosi multum praestat, et, febre valida quoque praesente, datur a Nostro, addito tamen nitro. Extractum cicutae cum oxymelle colchici, in hydrope, a viscerum obstructionibus orto, saepe mirandum in modum utile fuisse narrat. Hyoscyamus epilepticis conducit ac convulsionibus infantum ortis a terrore, nec non tusses phthisicorum interdum citius meliusque mitigat, ac opium.

XXII.

ALEXANDRI MONRONIS DRUMMONDI de febribus arcendis discutiendisque commentarius, Amstelodami. Sumptibus Io. Schreuderi 1771. 8. pag. 90.

Non omnes omnino febres arcendas, imo interdum eas arcessendas esse putat Cl. DRUMMONDUS, qui, uti ex librarii monitione patet, hac de re dissertationem inauguralem, Edinburgi habitam scripsit, quam offert hic librarius singulari libello fideliter atque accurate, dedicatione iisque rebus, dissertationem inauguralem concernentibus, exceptis, ex desiderio aliorum recusam. Intelligit igitur has solummodo febres, quae vel in fanos saeuiunt, contagiosae et pestilenciales audiunt, easque arcendas esse putat causis vitandis.

Inter causas, quas euitare oportet fanos ad febres eiusmodi arcendas, refert omnia, quae maxime per se moueant. Atque haec in stagnorum halitibus corruptis, contagione, frigorisque et caloris varietatibus, posita Nostro videntur. Quapropter disputat Cl. Auctor de halitibus stagnorum ve-

Ll 4

nena-

*) v. comm. nostr. Vol. XI. p. 239. it. ib. Vol. XVIII. p. 669 et 673.

nenatis, contagioneque cauendis, de veneni originibus praecidendis, de veneno delendo, eiusque aditu intercludendo, de purgationibus aqua, aere et igne, ac Cl. viros LIND, SYDENHAMUM aliosque ac imprimis Cl. CHENOT *), qui hanc rem bene declarauit, atque aliorum exemplis illustrauit, secutus est.

p. 22. Nec minus expendit Noster, quo modo quis veneno infectus, periculo se subtrahere possit, porro venenum eludat, stagnorum halitus contagionemque caueat, quatenus Edinburgensibus vtile sit, rursus frigoris calorisque varietates.

p. 42. His consideratis de ingluuie crapulaque cauendis, aliisque, quae non nisi aliis iuncta moueant, disputatur.

p. 44. De corpore, contra euentium caussarum iniurias firmando, disserit Noster, idque vel victus ratio vel medicina et chirurgia praestat. Victus rationem, sub qua Noster fere omnes res sex non naturales intelligit, ponit potius in nocentibus cauendis, quam in selectu earum. Medicamenta potissimum sunt acida, Peruvianus cortex, cui forte et mars substitui potest, porro aqua frigida. Externe vlcera, quibus Noster non nimium fudit.

p. 61. Denique omnibus ea seruanda sunt, quae Cl. Auctor de arcendis febribus docuit. Causae enim violentissimae, a Nostro supra commemoratae, omnibus possunt officere, sint sani aegrotiue, debiles robustiue, iuniores aetateue prouectiores.

p. 62. De incipientibus febribus discutiendis ita Noster docet, vt victus rationem ordinet, sanguinis detractionem per venas expendat, de stibio per se dato, vel simul cum DOVERI puluere et balneo fomentoque, nec non de chalybe et cortice Peruviano agat, eorumque omnium vsum definiat.

*) EIUSD. de peste libr. comm. nostr. Vol. XVI. p. 683.

Noua physico medica.

Accepimus, Regem potentissimum Galliae collegium medico pharmaceutico chirurgicum constituisse, quod ex medicis, pharmaceutis et chirurgis, usu et fama celebribus constat. Quibus ex iussu regis cautio est adhibenda, ne medicamina et aquae minerales sine examine accurato diuenderentur, atque ut empyrici agyrtaeque impedirentur, quominus aegros in posterum bonis, sanitate, quid quod ipsa vita impune priuarent.

Praemium quingentarum librarum Gallicarum, ex liberalitate ciuitatis Tolosanae ab anno 1745 iam fundatum, ab Academia scientiarum, inscriptionum et elegantiorum literarum *Tolosana* distributum esse Cl. PETRO CAMPER, variolarum inprimis insitio-
ne claro *), ob elaborationem de inoculationis optima methodo, nuper retulimus **).

Insimulque *Eadem* ad praemium 1775 reportandum nouum cum eruditis viris communicauit problema. Cupit nimirum, ut *definiantur effectus aeris fixi in corpore humano, alimentis medicamentisque, quatenus oeconomiam animalem attineant.* (de *determiner les effets de l'air fixe du corps humain, des alimens et des medicaments, relativement à l'économie animale.*)

Quae praeterea in commentariis, aequae conscribendis, ac mittendis cautio sit adhibenda, in antecedentibus enarrata a nobis ***), hic nolumus repetere.

*) v. comment. nostr. Vol. hoc p. 59.

**) v. ib. Vol. XVI. p. 707. it. ib. Vol. hoc p. 357.

***) v. l. c.

Academiam scientiarum elegantiorum literarum et artium *Lugdunensem* distulisse quaestiones de lymphâ ac carcinomate ad annum 1773, iam antea *) narrauimus.

Iam vero *Eadem* nouum praemium, quod constat moneta aurea trecentarum librarum Gallicarum et argentea viginti quinque, in commodum historiae naturalis et agriculturae a P. M. ADAMOLLIACIUE Lugdunensi constitutum, illi distribuet, qui ad hoc problema respondebit ex voto academiae: *Inueniantur plantae indigenae, quae substitui recte possint ipecacuanhae, quinquinae et sennae.* (*Trouver des plantes indigènes, qui puissent remplacer exactement l'ipecacuanha, le quinquina et le séné.*) Pertinet hoc problema ad annum 1774 atque ante primum diem aprilis eiusdem anni commentarii a Cl. DE LA TOURETTE, siue Cl. BOULLIoud MERMET, siue Cl. AIME DE LA ROCHE, qui academiae ab epistolis sunt eiusque mandata curant, non admittuntur. Qua praeterea circumspectione opus sit in mittendis et scribendis commentariis vide superius **).

Seelandina societas Vlissingensis artium et scientiarum, quae nuper fundata est, et a nobis in superioribus, ubi instituti huius rationem reddidimus, commemorata ***) adiudicauit praemium Cl. IOSEPHO PAP DE FAYARAS, cuius elaboratio quaestionis: *potestne naturae scrutator ex cognitis iam observationibus et experimentis consuetaria ad disquisitionem caussarum hactenus incognitorum phaenomenorum colligere? si possit, qua ratione hoc fiat?* ****) Societatis expectationi non penitus quidem respondit, attamen

*) v. comm. nostr. Vol. XVI. p. 545.

**) v. comm. nostr. Vol. XV. p. 172.

***) v. comm. nostr. Vol. XVII. p. 533.

****) v. ib. p. 535.

men Cl. IOSEPHO DE IPEREN, cuius elaboratio inter omnes eminebat, secundum leges societatis, cum sodalis eiusdem sit, non potuit praemium distribui.

Repetitis iis quaestionibus, quae ad annum 1773 pertinent, et quarum vna a nobis quoque iam est proposita *), nouam addidit 1774 anno dicatam.

Haec ita se habet: *Quaenam ex natura soli provinciae Seelandiae eiusque insularum proportio possit inveniri inter arbores, viridaria, prata, agrosque? Estne ea, quam iam inter quatuor harum rerum usum constitutam dicunt, proportio tam iusta, quam possimus sequi? Si non, quaenam mutatio in commodum salutis publicae possit optari et quaenam sit optima via eiusdem mutationis? Quaenam producta, praeter arbores et fructus, ut plurimum in Seelandia iam cultos, possint exspectari, quae vel eandem vel forte maiorem commodo publico et agricolis afferant utilitatem? Quaenam porro eorum principatum tenent, ut maior cura iis possit dicari, et quinam sint optimi modi eadem culturae communi committendi? (De la manière, dont les terres sont employées dans la province de Zeelande et dans chacune des ses Isles en particulier, quelle proportion y trouve-t-on entre le bois, les vergers, les paturages et les terres de labour? La proportion, qui s'y a actuellement entre ces quatre différens usages des terres est elle la plus avantageuse, qu'on y puisse suivre? Si elle ne l'est pas, quel changement est-il à souhaiter, qu'on y fasse pour l'intérêt public et quels sont les meilleurs moyens d'un tel changement? Outre les arbres et les fruits, qu'on cultive ordinairement le plus en Zeelande quels autres peut-on y cultiver avec autant ou plus d'avantage pour le public et pour les agriculteurs? Quelles de ces productions meritent le plus*

*) vid. ib.

plus d'etre encouragées et quels sont les moyens le plus propres à en rendre la culture commune.)

Praemia, leges, et quae sint praeterea obseruanda iis, quibus placebit in hanc rem inquirere, quoniamiam eorum mentio facta est *), mittimus.

Conueniebat societas regia scientiarum *Gotttingensis* die 14 nouembris 1772, quo ante viginti et duos annos primum celebrauit conuentum eadem, **) et, huius diei solemnitate finita, elaborationes quaestionum propositarum diiudicabat. Ac, quamquam quatuor commentarios de vaporum letiferorum natura ***) acceperat, tamen, cum nullus expectationi societatis omnino responderet, non potuit non eandem quaestionem denuo repetere et ad annum usque 1775 differre.

Quaestio sic se habet: *quaenam est vaporum letiferorum in cauernis nonnullis prope acidulas naturarum, subducta aeri elastica vi, respirationem intercludunt: an illi acidam naturam habent et vesiculis pulmonalibus contractis mortem inferunt? an ad cerebrum tendunt et facultates subito supprimunt?*

Optat societas, vt haec res, omissis omnibus hypothesebus, obseruationibus et experimentis demonstretur, et imprimis Cl. Auctorem illius elaborationis, cuius dictum erat: *non experientia rationi, sed ratio experientiae adoptanda est*; adit, tentamina, quae in thermis sunt ab Eo instituta, in vna vel pluribus cauernis, et acidulis vicinis denuo instituere, eaque accurate cum societate communicare. Porro petit, vt ea animalia, quibuscum pericula sint facta, nominentur, et vt cum maioribus quoque animalibus tentamina similia Cl. Auctor moliatur.

Com.

*) v. ib.

**) v. comm. nostr. Vol. I. p. 50.

***) v. comm. nostr. Vol. XVI. p. 544.

Commentarii sunt mittendi ante octobrem 1775 Ill. HEYNE, qui societati ab epistolis est. Ceteras leges societatis supra commemorauimus *).

Regia societas scientiarum *Noruegica*, quae Nidrosii florebat **), trecentis numis aureis, ex munificentia FRIDERICI Principis, Regis Daniae fratris, huius societatis praesidis, acceptis ad eos eruditis viris tribuendos, qui respondebunt ad septem propositas a societate quaestiones, quinquaginta numos eidem attribuet, qui *causam probabilem morbi, in oris maritimis Noruegiae frequentis, sub nomine leprae scorbuticae nominus, quam remedia optima huic malo obuenientia, recte reddiderit* (de trouver la cause probable d'une maladie fréquente sur les côtes de Norwege, et connue sous le nom de lepre scorbutique ainsi, que les remèdes les plus efficaces pour la prevenir).

Reliquas quaestiones, quae oeconomiam, agriculturam, artem piscatoriam cet. attinent, omittimus. Hoc praemium etiam societatis sodales, nisi qui Nidrosii viuunt, ambiant. Commentaria lingua latina vel danica ante finem nouembris 1773 mittantur.

A societate *Amstelodamensi*, ad submersos vitae restituendos constituta ***) ab anno huius decimi septimi seculi sexagesimo septimo usque ad annum septuagesimum, centum atque triginta et quod excurrit, merfi seruati sunt. Omnia hi signa mortis, praeter putredinem prodiderunt. Per horam et ultra sub aqua atque glacie detenti fuerunt. Venaesectio, bronchotomia, aliaque adhibita sunt remedia, a nobis iam iam indicata ****). Signum pathognomoni-

*) v. comm. nostr. Vol. XVI. p. 544.

**) v. ib. p. 666.

***) v. comm. nostr. Vol. XV. p. 177.

****) v. comm. nostr. Vol. hoc p. 147.

monicum mortis, putrescentiam esse, ex his observationibus apparuit, quarum accuratiorem relationem societas publici iuris proxime faciet.

Die 20 maii 1772. b. MORGAGNIO *) successit Cl. DE LA GRANGE in academia Regia scientiarum *Parisi*.

Cl. IOANNES ANDREAS MURRAY, medicinae doctor ac professor, in Academia Gottingensi die 5 aug. 1772 societatis oeconomicae, quae Bernae floret, socius est nominatus ac confirmatus.

Ingolstadii b. IOANNI ANTONIO OBERMEIER, anatomiae et chirurgiae professori, successit Cl. LEBELIUS.

Amstelodami b. TALCARDI SNIP **) locum Cl. ANDREAS BONN, elegantis dissertationis de continuationibus membranarum Auctor, obtinuit ***).

B. SCHROEDERO ****) in Academia *Gottingensi* successit Cl. ERNESTUS GODOFREDUS BALDINGER, medicinae professor ordinarius in academia Ienensi, ac ordinis medici Gottingensis tertius assessor est factus.

IDEM societati principali Hassio Darmstadiensi literarum per diploma adiunctus est.

Relatum legimus Celeberrimum HILL, botanices studio clarum, a Potentissimo Borussiae rege Berolini vocatum fuisse ad botanicam ibi docendam, cum annuis redditibus, qui mille thalerorum constent.

Magna

*) vid. comm. nostr. Vol. XVII. p. 719.

**) v. ib. Vol. XVII. p. 719.

***) v. ib. Vol. XIII. p. 113.

****) v. ib. Vol. hoc. p. 159.

Magna Augustissimae Imperatricis MARIAE THERESIAE in b. GERARDUM VAN SWIETEN gratia, multoties Ei viro ab ea monstrata *), iam, mortuo Eo, vel in monumento, honoris ac memoriae causa, pro magna EIUS versus Eum clementia, posito, cernitur.

Exstructum est hoc monumentum Viennae in aede aulica w. w. e. e. patrum augustinorum iuxta sepulchrum b. SWIETENII atque a Cl. Abbate MARCY inuentum.

In parietis recessu duodecim pedum alto e marmore nigro, laureis ramis, chartis, aliisque doctrinam literasque b. viri praedicantibus signis ornatae basi impositum est simulacrum Ill. VAN SWIETEN e marmore candido, quod Carrasae reperitur. Ad partem dextram illius recessus medicina, genii speciem referens, AESCULAPII baculum manu tenentis, in conspectum venit, ad sinistram autem botanica eodem habitu. In apice recessus collocata est vrna, e qua stella lucet. Ad fundamentum denique huius monumenti marmoreum, tabula porphyretica, eaque atra spectatur, litteris aureis ita inscripta :

MARIA THERESIA *Aug.*
memoriae

GERARD. L. B. VAN SWIETEN *Ord. S. Steph.*
Commend. Consil. Aul. Archiatrorum
Comitis

Studii Restauratoris
Rei Med. Biblioth. Palat. Ac librorum Cens.
Praesid. Paris Petropol. Variarumque
Academ. Membri

Nat. VII. mai. MDCC. Christiane et Heroicae
Vita Funct. XVIII. iun. MDCCLXXII.

ob

Laborem Indefessum Eminentem doctrinam
Integritatem sinceritatem constantiam poni iussit.

*) v. c. n. Vol. XV. p. 364.

Rigae

Rigae Cl. IOAN. BERNH. DE FISCHER medicinae doctor et quondam Russorum Imperatricis ANNAE gloriosae memoriae personae medicus, et per Russiarum res medicas dirigens quondam archiater, academiae imperialis naturae curiosorum sodalis, ac multis scriptis clarus *) die 8. iulii 1772 octuagesimo septimo aetatis anno e rebus humanis exemptus est.

Londini Cl. GUILIELMUS BORLASE Al. M. H. R. S. ob historiam naturalem Cornubiae, quam divulgavit **) clarus, die 1 septembris 1772 ex hac vita discessit.

Frankofurti ad Moenum die 15. nouembri 1772 Cl. IOANNES CHRISTIANUS SENKENBERG medicinae Doctor, Principi Hasso Casseliensi a consiliis et polyater, tristi casu ab alto in ipso a se fundato xenodochio, vitam cum morte commutauit. Memoria enim eius ibi admodum viget, quoniam suis sumptibus xenodochium, cum summa pecuniae ad id conseruandum, in salutem ciuium pauperum exstruendum, anatomicique instituti fundamenta iacienda curauit. Cuius cadauer quoque primum erat, quod disquireretur in hoc nouo theatro anatomico.

Berolini d. 8 nouembris 1772 Experientissimus GEORGIUS ERNESTUS STAHL Regi a consiliis, Cl. GEOR. ERNEST. STAHLII filius vnicus, mortuus est. Attingit annum aetatis sexagesimum ac medicum liberalem atque erga pauperes benignum fuisse de eo praedicatur.

Madriti vernali 1772 tempore, Cl. MIGNEL BARNADES, professor regius botanices, anno aetatis quinquagesimo quarto obiit.

Ibi-

*) v. comm. nostr. Vol. XVII. p. 154.

**) v. comm. nostr. prim. decad. suppl. IV p. 722.

Ibidem, eodem eiusdem anni tempore, aetate paulo prouectiore Cl. IUAN MINUART, professor regius bonatices, placide exspirauit.

Celebris regius mathematicorum instrumentorum artifex ADAMS, qui de globis terrestribus et microscopiis scripsit, exeunte nouembri 1772, Londini desit rebus humanis interesse.

Cl. CRANZ Consil. Caes. initia operis de aquis mineralibus prelo commisit. In cuius parte prima omnes aquae in regionibus Austriacis reperiundae, inter quas multae nouae, nec hactenus cognitae sunt, continentur. Altera pars reliquas omnes aquas notas complectetur.

Pari modo, Cl. ZÜCKERT nouam editionem operis *) de fontibus medicatis ac thermis Germaniae noli, relatum legimus.

Relatum legimus de noua editione libri perutis, qui inscriptus est: *Histoire de la Société Royale de Montpellier avec les mémoires de mathématique et de physique*, quae Lugduni 1766 prodiit. In hac autem noua editione, praeter nouum titulum; ne libera quidem mutata deprehenditur, qui ita sese habet: *Choix des meilleurs mémoires de mathématique et de physique de la Société Royale de Montpellier*. b. 1771.

Gottingae hortum botanicum ex munificentia gratiosa Clementissimi Regis Angliae ita constitutum legimus, ut plantae, quibus ille destituitur, ex horto Keweriano in eum inferantur. Atque hoc iam autumno

*) v. comm. nostr. Vol. XVII. p. 78.

Vol. XVIII. P. III. M m

tumno 1772 insignis copia plantarum perennium, radicumque Americae borealis, in hortum Gottin-
genssem missa est.

Vidimus nuper aliquam partem operis Anglici, cuius Latinam et Germanicam translationem, a CHRISTOPHORO GOTTLIEB DE MURR factam insuper-
que annotationibus ditatam, curavit *Iohannes Haide* et filius. Opus hoc ita inscriptum est :

The british zoology. Class. I. Quadrupeds. II. Birds: Published under the inspection of the cymmrodorian society, instituted for the promoting useful charities and the knowledge of nature among the descendants of the ancient britons, illustrated with hundred and seven Copper-plates. London 1766 in folio imperiali.

Postea 1767 accedebant viginti et quinque tabulae aeneae, quae reperiuntur in noua huius libri editione, in octauo edita *), secundum quam, cum ab Auctore Cl. ipso curata et aucta sit, haec versio est facta et ita inscripta :

Zoologia Britannica tabulis aeneis CXXXII illustrata. Classis Ima, Quadrupeda. Ilda, Aues. Auctore THOMA PENNANT Armigero. Latinitate donavit CHRIST. THEOPH. DE MURR.

Brittische Thiergeschichte. Erste Hauptabtheilung vierfüßige Thiere. Zwote Hauptabtheilung, Vögel. Nach der neuen englischen Ausgabe des Herrn THOMAS PENNANT Esq. in das Lateinische und Deutsche übersetzt und mit einigen Anmerckungen begleitet von CHRIST. GOTTL. VON MURR. Nebst hundert und zwey und dreyßig illuminirten Kupfertafeln.

Totum hoc opus per partes ita vulgabitur, vt accedat ad splendorem editionis primae, et per sex menses decem tabulae aeneae cum explicatione prodibunt,

*) v. comm. nostr. Vol. XVI, p. 408.

dibunt, et vltimo loco vndecim tabulae. Totum opus constabit septuaginta florenis, atque ita prope dimidio minoris quam Anglicum, quod centum triginta et trium florenorum pretio venit.

Caeterum de hoc opere, cum iam a nobis dictum sit *), nihil amplius addimus, quam vt, si placeat hoc institutum, amphibia Britannica et pisces eodem modo vulgari apud se constituissent.

Ex consilio collegii sanitatis Berolinensis adiectaque historia constat, acetum pomorum syluestrium, vel eadem poma in substantia, contagio bouino egregie mederi.

Duo Medolanenses auctoritate Principis et sumtibus publicis in Galliam aliasque prouincias profecturi dicuntur, qui in arte veterinaria erudiantur, vt reduces morbis equorum atque armentorum consulant.

XXIV.

Continuatio indicis scripto physicornum medicorum, quae anno 1770 prodierunt.

MARC. CARACCIOLI *practische Landoeconomie der Alten, nebſt einem Entwurfe derſelben aufzuheſen. Augsb. 8.*

IO. ANT. CARLS *medicinisch botaniſcher Garten, worinnen die Kräuter in nahrhafte, heilsame und in giftige eingetheilet ſind. München und Ingolſtadt. 8.*

IOSEPH. FRANC. CARRERE *diſſ. inaug. de reuulſione Reſp. Ioſeph. Franc. Bartholom. Anglade. Peripignani 8.*

IO. FRID. CARTHEUSER *pharmacologia theoretico-practica praelectionibus academicis accommodata.*

Mm 2

Ed.

*) v. loc. ſupra cit.

Ed. secunda priori auctior et emendatior. Berolin.
8. mai.

Experiments on the cause of heat in living animals
and velocity of the nervous fluid. By JOHN
CAUERHILL M. D. Lond. 8.

Traité de la culture des pêcheurs. Par M. de COM-
BES, à Paris 12.

Maladies des enfans. Traduit de l' Anglois du Doct.
JEAN COOKE, Yverd. 8.

Eiusd. a treatise of poisons vegetable animal and mi-
neral, with their cure, Lond. 8.

Eiusd. natural history of lac, amber and murrh. ib. 8.

LUDWIG CORNARI *Vorstellung von dem Nutzen eines
nüchtern und mäßigen Lebens, Halle. 8.*

RICHARD CORTIS *Abhandlung von dem Baue und der Bil-
dung der Zähne und andern damit verbundenen Theilen,
nebst den verschiedenen Krankheiten, denen sie unter-
worfen sind und einer Untersuchung, wie sie am zu-
verlässigsten bis zu einem hohen Alter können gesund
erhalten werden. Aus dem Englischen, Altenburg. 8.*

LUDOV. MICH. COSTAE disquisitiones anatomicae.
Perpigniani. 4 (latine et gallice)

DOMINICI COTTUNNI de ischiade neruosa commen-
tarius. Vien. 8. min. c. f.

HENR. IO. NEPOMUC. CRANZ examinis chemici do-
ctrinae Meyerianae de acido pingui et Blackianae
de aere fixo respectu calcis rectificatio, Lips. 8.

An essay towards a system of mineralogy. By A. F.
CRONSTAEDT translated from the swedisch origi-
nal by G. VON ENGESTROM revised and corre-
cted by EMANUEL MENDES DA COSTA, Lond. 8.

Eiusd. *Versuch einer Mineralogie, vermehrt durch
BRÜNNICH, Copenhagen und Leipzig. 8.*

RICHARD CURTIS V. CORTIS.

PETR. SUR. IO. COSMUS DANGERVILLE diss. inaug.
de coccygis luxatione. Resp. ** Patet, Paris. 4.

Traité

Traité de la nutrition et de l' accroissement, précédé d' une dissertation sur l' usage des eaux de l' amnios par M. JEAN PIERRE DAVID, à Rouen. 8.

HEINR. FRIEDR. DELIUS *Untersuchungen und Nachrichten von den Gesundbrunnen und Bädern zu Kissingen und Boblet im Fürstenthum Würzburg, Erlangen* 8. m. K.

Traité des accouchemens en faveur des élèves, dans lequel sont traitées les maladies des femmes grosses et accouchées et celles des petits enfans, par M. F. A. DELEURYE, à Paris. 8. mai.

L' art de faire l' Indienne à l' instar d' Angleterre et de composer toutes les couleurs bon teint, propres à l' Indienne par M. DELORMOIS, ib. 12.

L' art de s' enrichir promptement par l' agriculture, prouvé par des expériences par M. DE POMMIERS. Nouvelle édition augmentée de découvertes de l' Auteur depuis qu' il est employé par le Gouvernement à l' amélioration de l' agriculture en France, ib. 12. mai. c. f.

Instruction pour les sages femmes, ou methode assurée pour aider les femmes dans les accouchemens naturels et laborieux. Par M. DIDELOT, à Nancy. 8.

CARL FRIDER. DIETRICH'S *Pflantzenreich, nach dem neuesten Natursystem des Königl. Schwedischen Ritters und Leibartztes CARL. VON LINNÉ. Erster Theil, Erfurt.* 8.

Brief van W. VAN DOEVEREN aan den wel edelen zeer geleerden Heere EDUARD SANDIFORT behelzende een berigt van den gelukkigen uitslag der inenting der Kinderpockies onlangs te Groningen ondervonden. In's Gravenhage. 8. mai.

Eiusd. sermo academicus de sanitatis Groningano-
rum praesidiis, ex vrbis naturali historia deriuandis, dictus in choro templi academici cum d.

III. septembris 1770 iterum fasces academicas poneret, ex decreto senatus vrbani editus. Groning. 4.

An essay on spirituous liquors with regard to their effects on health, in which the comparative wholesomeness of Rum and Brandy are particularly considered. By ROBERT DOSSIE, Lond. 8.

Illustrations of natural history, wherein are exhibited upwards of two hundred and forty figures of exotic insects, according to their different genera, very few of which have hitherto been figured by any author, being engraved and coloured from nature, with the greatest accuracy and under the Authors own inspection on fifty Copper plates. With a particular description of each insect interspersed with remarks and reflections on the nature and properties of many of them. By D. DRURY. To which is added a translation into French. ib. 4.

La muriométrie, instruction nouvelle sur le ver à soie sur les plantations des muriers blancs, les filatures et le moulinage des soies. Ouvrage mêlé des réflexions neuves et qui paroissent dignes de l'attention du l'administrateur du bien public, du physicien, du cultivateur et du negociant. Par M. A. DUBET, à Lausanne. 8.

MICHAEL DUCRESTS *kleine Schriften von den Thermometern und Barometern, vermehrte Auflage. Augsburg. 8. m. K.*

Traité des lésions de la tête par contrecoup et des conséquences pratiques, par M. DUPRE DE LISLE, à Paris. 12.

GEORG. DAVID. DUVERNOI diss. inaug. de lathyri quadam venenata specie in comitatu Montbell-gardenfi culta, Basil. 4.

10. PETR. EBERHARD diff. inaug. de nucis vomicae et corticis hippocastani virtute medica. Resp. *Philipp Caspar Junghans*. Hal. ad Sal. 4.

Essay upon natural history and other miscellaneous subjects. By GEORG. EDWARDS. London 8.

10. THEOD. ELLERS physiologia et pathologia medica, seu philosophia corporis humani sani et aegroti. Altenb. 8.

Directions for bringing over seeds and plants from the East Indies and other distant countries in a state of vegetation: together with a catalogue of such foreign plants as are worthy of being encouraged in our American colonies for the purposes of medicine agriculture and commerce. To which is added the figure and botanical description of a new sensitive plant, called *Dionaea muscipula*: or Venus's fly trap. By JOHN ELLIS, F. R. S. Lond. 4. c. f.

An essay on the cure of the hydrocele of the tunica vaginalis testis, By JOSEPH ELSE. Lond. 8.

Officium medici coram aegris, seu vera et genuina methodus de colligenda morborum coram aegris historia iisque cognoscendis et curandis atque adeo solidissimas iuxta artis regulas describendis aptissima. Auctore IO. LUCA ELTZMANN, M.D. Lond. 12.

ALEXAND. VAN EMBDEN diff. inaug. de vrinae incontinentia seu mictione inuoluntaria. Duisb. ad Rhen. 4.

E. E. ENDTERS *Nachklang in die Arztneschule wegen falscher und zum Theil giftartiger Mittel, welche die Pfücher bisher ausgegeben haben. Altona und Hamburg 8.*

10. CHRIST. POLYCARP. ERXLEBEN, *practischer Unterricht in der Vieharztneskunst. Göttingen 8.*

Eiusd. Inleiding tot de Geneeskunde van het vee. Te Haarlem. 8. mai.

Mm 4

M. 10. FRID.

M. IO. FRIDER. ESPERS *Anweisung den Lauf des Cometen und andrer Gestirne ohne astronomische Instrumente und mathematische Rechnungen zu beobachten.* Erlangen. 8. mai. c. f.

GERH. EYTING diss. inaug. de consolidatione vulnorum cum deperditione substantiae, Argentor. 4.

Essais sur differens points de physiologie, de pathologie et de therapeutique. Par M. FABRE, à Paris 8. mai.

An essay on the Bathwaters: in four parts. Containing an praefatory introduction on the study of mineral waters in general. By WILLIAM FALCONER. Lond. 12.

Encyclopedique ou dictionnaire universel raisonné des connoissances humaines, mis en ordre, par M. DE FELICE, Tom. I. II. à Yverdon. 4.

An introduction to electricity. By JAMES FERGUSON, Lond. 8. c. fig.

P. FERRANT, diss. de laesionibus capitis per ictus re-percussos, quos resonitus vocant. Resp. Franc. Choppart, Paris. 4.

D. FISCHERI assertiones de venenis, Prag 8. (f. anno).

Elements of agriculture and vegetation. By GEORGE FORDYCE, M. D. Lond. 8.

Eiusd. elements of the practice of physic: part the first. Containing the natural history of the human body. ib. 8. mai. (*Volumen secundum iam prodit 1769*).

Mémoire sur l'insuffisance et le danger des lavemens antivénériens par I. I. GARDANE, à Paris 8. mai.

Eiusd. Recherches pratiques sur les différentes manières de traiter les maladies vénériennes ib. 8. mai.

Herrn von GARSALT, *Unterricht für Liebhaber der Pferde und Reiten.* Aus dem französischen übersetzt von I. G. KRINITZ. Berlin. 8. m. K.

Patho.

Pathologie de M. GAUBIUS. Traduite du latin en françois par M. SUE le ieune, maitre en chirurgie. à Paris. 12.

Traité des maladies des yeux et des moyens et opérations propres à leur guérison par LOVIS FLORENT DESHAIS GENDRON, Tom. I. II. à Paris 12.

Pont de bois de charpente horizontal sans piles ni chevalets ou autres appuis que ses deux culées. Par M. GENNETE' premier physicien de feu le Mai. Imperial. à Nancy. 8. c. f.

Table générale alphabetique de dix volumes de la matière médicale de M. GEOFFROY. Suivie d'une autre table alphabetique de six volumes servants de suite à la matière médicale de M. GEOFFROY et contenant le regne animal. à Paris 12.

F. GLEDITSCHENS *gründliche Anleitung zur Seidenzucht und Anlegung der weißen Maulbeerbäume und Hecken.* Jena 8. m. K.

WILLH. FRIDR. FREYHERRN VON GLEICHEN RUSTWORM genannt, *Versuch einer Geschichte der Blattlausfresser des Ulmenbaumes nebst vielen mit Farben erleuchteten Kupfertafeln. Nebst einer Vorrede des Herrn Hofraths und Prof.. DELIUS.* Nürnberg. 4. mai.

Eiusd. decouvertes le plus nouvelles dans le règne végétal, ou observations microscopiques sur les parties de la génération des plantes renformées dans leurs fleurs et sur les insectes, qui s'y trouvent, avec quelques essais sur le germe, un supplément d'observations mêlées et plusieurs figures en taille douce, gravées et enluminées, le tout décrit et peint exactement d'après nature. Traduit de l'Allemand par IAQ. FRED. ISENFLAMM au depens de IEAN CHPH. KELLER. ib. fol.

IO. FRIDER. GOTTL. GOLDHAGEN, *diff. inaug. de tensione neruorum in genere, Resp. Io. Fried. Car. Jexke.* Hal. ad Sal. 4.

Mm 5

ANTON.

ANTON GOUAN, historia piscium, sistens ipforum anatomen externam, internam atque genera, in classes et ordines redacta. Accedunt vocabularium locupletissimum, indices Latini ac Gallici, experimenta circa motum natatorium et muscularem, respirationis mechanismum, auditus ac generationis organa. Cum iconibus, genera noua ac praecipuas partes anatomicas exhibentibus. Argentorat. 4. c. f. (*latine et gallice.*)

IACOB. GRAINGERI, historia febris anomalae Batavae annorum 1746. 1747. 1748. Accedunt monita syphilitica. Altenb. 8.

BERNARD. GRANT praelectiones encyclopedicae in physicam experimentalem et historiam naturalem. Erford. 8.

IO. FRID. CAROL. GRIMMS *Gothaischen Raths und Leibarztes Abhandlung von den Mineralwassern zu Ronneburg*, Altenb. 8. mai.

HENR. GROSSER fulcrum Hippocraticum senectutis humanae, Würzburg. 4.

Mémoires sur différentes parties des sciences et arts. Tom. II. et III. Par M. GUETTARD, à Paris 4. c. f.

IOSEPH. IGNAT. GUILLOTIN, diss. inaug. Ergo praeter genitalia sexus inter se discrepant. Resp. Franc. Maria Bosquillon. ib. 4. (*Quae iam a Cl. FRANC. THIERRY 1750. defensa est.*)

Manuel forestier et portatif, contenant les descriptions, qualités, usages et cultures particulières des différentes essences de bois, qui composent le massif général des forêts du Royaume, les semis et plantations, l'aménagement général des bois etc. extrait du traité des forêts de M. DU HAMEL DU MONCEAU, par M. GUYOT, ib. 12.

ERNEST GODOFRED GYSER diss. inaug. de fame lethali ex callosa oesophagi angustia, cum dete-

detectis in quibusdam abdominis visceribus
attentione dignis phaenomenis. Argent. 4.

ANTON. DE HAEN rationis medendi in nosocomio
practico. Pars XIV. Vien. 8. (*quo tomo hoc huc
usque continuatum opus finitur.*)

A letter to CAESAR HAWKINS, Esq. containing new
thoughts and observations on the cure of the ve-
nerereal disease etc. By CHARLES HALES. Lond. 8.

ALBERT VON HALLER, *erster Umriss der Geschäfte
des körperlichen Lebens für die Vorlesungen einge-
richtet. Aus den Lateinischen unter der Aufsicht
des Herrn Verfassers übersetzt. Berlin 8. mai.*

GEORG. ERHARD HAMBERGERS *semiotische Vorlesun-
gen über LOMMIUS medicinische Wahrnehmungen,
herausgegeben von IO. DAV. GRAU, 4ter und letzter
Band. Lemgo 8.*

*Eiusd. elementa physiologiae medicae, edidit CHRIST.
THEOPHIL. MAYER, Iena 8.*

DU HAMEL DV MONCEAU V. GUYOT.

A compleat body of planting and gardening, con-
taining the natural history culture and manage-
ment of deciduous and evergreen forest-
trees ; with practical directions for raising and
improving woods , nurseries , seminaries and
plantations ; and the method of propagating and
improving the various kinds of deciduous and
evergreen shrubs and trees, proper for ornament
and shade. Also instructions for laying-out and
disposing of pleasure and flower gardens, inclu-
ding the culture of prizeflowers, perennials, an-
nuals, biennials etc. likewise plain and familiar
rules for the management of a kitchen-garden ;
comprehending the newest and best methods of
raising all its different productions ; to which is
added the manner of planting and cultivating
fruit gardens and orchards. The whole forming a
com-

complete history of timber-trees whether raised in forests, plantations or nurseries; as well as a general system of the present practice of the flower-fruit-and-kitchen gardens. By WILLIAM HANBURY, A. M. In two volumes. Lond. fol.

CHRIST. RUDOLPH HANNES, *Wundarzte in Wesel, Brief an den Herrn Prof. BALDINGER über den Friesel und andern Beobachtungen. Zweyte und vermehrte Auflage. Wesel und Leipzig 8.*

IO. FRIED. HARTMANN, *angewandte Electricität bey Krankheiten des menschlichen Körpers. Hannover 8. m. K.*

FRANC. XAVER. HARTMANN *formulae remediorum in materiam medicam et chirurgicam clarissimae ac celeberrimi viri CRANZ. Lips. 8.*

IOSEPH. HAWRANEK *diss. inaug. de vomitu. Vien. 8.*
Herr Baron VON HEINS entdeckter Vortheil die Ziegeldächer ohne Kalck und Moos so zu verwahren, daß weder Regen noch Schnee durch den Wind auf die Böden gedrehet werden kann; nebst einem Mittel brennende Schorsteine geschwinde zu löschen. Franckf. 8.

LAURENTII HEISTER, *medicinischer, chirurgischer und anatomischer Wahrnehmungen zweyter Band von WILLH. FRID. CAPPEL. Rostock 4. m. K.*

Eiusd. compendium anatomicum. Vienn. 8. mai. c. f.
Idem liber Germanice, ibid. 8. mai. c. f.

FRANC. IOSEPH. HELUS, *diss. inaug. de botanices systematicae in medicina vtilitate. Argentorat. 4.*

IOACH. FRIED. HENCKELS *Abhandlung von der Geburtshülfe. Zweyte und vermehrte Auflage. Berlin 8. m. K.*

Anzeige der hauptsächlichsten Rettungsmittel, derer, die durch plötzliche Unglücksfälle leblos geworden sind, oder in naher Lebensgefahr schweben, aufgesetzt von D. PHILIPP. GABR. HENSLER. Altona 8.

ANTON MICHAEL HIEFINGER diff. inaug. sistens historiam hydropis pectoris cum aneurysmate. Vienn. 8.

The construction of timber: from its early growth explained by the microscope and from experiments in a great variety of kinds in five books; on the parts of tree; their vessels and their encrease by growth. And on the different disposition of those parts in various kinds and the particularities in their vessels. With figures of their various appearances of the microscope through which they were viewed. By JOHN HILL. Lond. 8. mai. c. f.

Eiusd. the vegetable system or the internal structure and the life of plants, their parts and nourishment explained, their classes, orders, genera and species ascertained and described in a method altogether new comprehending an artificial index and a natural system: with figures of all the plants designed and engraved by the Author; the whole from nature only. Vol. XVI. et XVII. ib. fol. c. f.

Der fränckische Bienenmeister von IO. EPHR. HIRSCH. Nürnberg. 8.

Abhandlung von den Vorbaungs- und Vorbereitungs-Mitteln bey den Pocken, nebst einem Anhang von der vorzüglichen Würcksamkeit, und den ausgebreiteten Nutzen des Brechweinsteins von D. LEONH. ELIAS HIRSCHEL. Berlin 8.

E. E. HOFFMANN'S Abhandlung von den Pocken. Erster Theil, worinnen die Erzeugung der Pockenmaterie und ansteckenden Kranckheiten vor Augen gelegt wird. Münster und Hamm. 8. mai.

Dissertation sur les parties sensibles du corps animal, suivie d'un mémoire sur les avantages, que procurent les frictions mercurielles dans le traitement

- ment de quelques épilepsies idiopathiques avec des consultations et lettres, qui y ont rapport, terminé par deux observations sur l'usage du mercure pour la guérison du scorbut et des dartres. Par M. E. I. P. HOUSSET, à Lausanne. 8.
- I. I. HYBER de æere oeconomiae animali famulante. Casellis. 4.
- MARC. HUGVENIN, diss. inaug. de atonia uteri post partum, eiusque sequela haemorrhagia. Argentorat. 4.
- IO. BERNH. HVLLESHEIM gemellarum infantum, ab dominibus connatarum, brevis historia cum animaduersionibus theoreticis et practicis, et adiuncta de duobus monstris appendice, nec non rarissima morbi historia. Zwolliae. 12.
- Practische Anleitung zum Deich-Siel-und Schlengengbau. Erster Theil von Deichen und Sielen, durch* I. W. A. HUNRICHS. Bremen 8. m. K.
- IO. HVXHAMI obseruationes de aere et morbis epidemicis ab anno 1749. ad exitum anni 1752. per IO. CAR. HVXHAMVM. Lond. 8.
- NICOL. IOSEPH. IACQVIN examen chemicum doctrinae Meyerianae de acido pingui, et Blackianae de aere fixo respectu calcis. Vindob. 8.
- Eiusd. chymische Untersuchung der Meyerischen Lehre von der fetten Säure und der Blackischen Meinung von der fixen Luft. Aus den Lateinischen übersetzt.* ib. 8.
- Eiusd. index regni vegetabilis, qui continet plantas omnes, quae habentur in Linnaei systematis editione XII. ib. 4.*
- Eiusd. hortus botanicus Vindobonensis seu plantarum rariorum, quae in horto Vindobonensi coluntur, icones coloratae et descriptiones succinctae.* ib. 4.

CHRIST. FRIDER. IAEGER, diss. inaug. de metastasi lactis. Resp. M. Williard. Tubing. 4.

Les bêtes mieux connûes; ou entretiens sur le principes du mouvement dans les bêtes. Par Mr. l'Abbé IOANNET. à Paris 12.

Ledictionnaire interprète de matière médicale etc. Par M. IULLIOT, ib. 8. Vol. II.

FRIED. CHRIST. IVNCKER, diss. inaug. de aëtiuitate antimonii diaphoretici. Resp. Ephr. Gottl. Leder. Hal. 4.

Eiusd. diss. inaug. de indicatione vitali generatim. Resp. I. R. Deimann. ib. 4.

Eiusd. diss. inaug. de explicando consensu partium, qui neruis debetur, Resp. C. L. CVRTIVS. ib. 4.

Eiusd. diss. inaug. de stupore dextri lateris absque motus laesione. Resp. Io. Georg. Friedr. Büchner. ib. 4.

Eiusd. diss. inaug. de caussa proxima februm intermittentium, naturae horroris, doloris, caloris ex rationibus physico chemicis deductae superstructa. Resp. Christ. Gottlob Berger. ib. 4.

IO. HEINR. GOTTL. VON IVSTI. *Geschichte des Erdkörpers aus seinen äußerlichen und unterirrdischen Beschaffenheiten hergeleitet und erwiesen.* Berlin. 8.

L'art de conserver les grains par M. BARTHELEMY INTIERI. Ouvrage traduit de l'Italien par le Sieur de N. E. à Paris 8.

Jrrthümer, Warnungen und Lehren, welche das Publicum in Ansehung der praktischen Arztneykunst betreffen. Erstes und zweytes Buch. Entworfen von D. F. S. K. Dresden. 8.

IGNAT. GODOFRED. KAIM. diss. inaug. de metallis dubiis. Vienn. 8.

IO. EBERHARD KAYSER, *erste Linien der Naturkunde des Ackerbaues, in einer kurzgefaßten Bauernphysic durch Fragen und Antworten mit einem Versuche,*

*suche zwölf praktischer Abhandlungen zur Aufmun-
terung des Landmanns, in zwey Büchern. Fuld. 88*
10. PHILIPP. KEES. diss. inaug. sistens observationes
binas de laesionibus capitis, earumque epicrisi
Argentorat. 4.

Histoire naturelle des glaciers suisses. Traduction
libre de l' allemand de M. GRUNER par M. DE
KERALIO. à Paris. 4. mai.

ADRIAN KEMTER veterum disciplina de re rustica
Mediolan. 4.

Observations upon M. POTT's general remarks on
fractures etc. in three lettres to a young sur-
geon intending to settle in the country. With
a postscript, concerning the cure of compound
dislocations, in which the usual method of trea-
ting wounds of the tendons and ligaments is
briefly considered. By THOMAS KIRKLAND.
Lond. 8. mai.

IAC. THEODOR. KLEIN, specimen descriptionis pe-
trefactorum Gedanensium cum syllabo tabularum.
Norimb. fol. min. 4. c. f. (latine et germanice.)

10. IAC. KOBER. spec. inaug. osteologicum de denti-
bus. Basileae. 4.

ISAAC KOCH, diss. inaug. de convulsionibus, iuue-
nem decussatim distorquentibus. Argentorat. 4.

Tractatus de dysenteria. Auctore 10. KOOYSTR.

By WILLIAM KOWLEY, Surgeon. Lond. 8.

Manuel antivénérien, ou methode abrégée et fa-
cile pour connoitre et guérir radicalement tou-
tes sortes de maladies vénériennes. Par M. D. E.
L. F. D. M. à Paris. 12.

Dissertation sur la cause de l' élévation des li-
queurs dans les tubes capillaires par M. DE LA
LANDE. à Paris. 8.

IOANN.

- IOANN. BAPTIST. LALANGUE, diff. inaug. neurologiam sistens. Vienn. 8.
- GEORG. AVG. LANGGVTH, diff. inaug. de modo regenerationis vasorum, Pars I. generalis. Resp. Petr. Madacs. Viteb. 4.
- Eiusd.* progr. inaug. de plantarum venenatarum arcendo scelere. ib. 4.
- Eiusd.* diff. inaug. de minuenda mortium subitarum formidine. Resp. Carol. Siegf. Jenichenio. ib. 4.
- Von den Krankheiten des Hofes und der Weltleute von* DANIEL LANGHANS. Bern. 8.
- Essai sur de nouvelles découvertes intéressantes pour les arts, l'agriculture et le commerce, par M. LAROUVIERE, bonnetier ordinaire du Roi. à Liege. 12.
- Obseruationum medicarum fasciculus II. Auctore LEBRECHT FRID. BENIAM. LENTIN. Cellis Luneburg. 8.
- Observations sur les causses et les accidens de plusieurs accouchemens laborieux. Edit. IV. Par M. LEVRET. à Paris 8. mai.
- Synopsis vniuersae praxeos medicae, in binas partes diuisae, noua editio multo amplior et accuratior. Auctore IOSEPHO LIEUTAUD. Paris. 4.
- Eiusd.* précis de la matière médicale. Vol. I. II. ib. 8.
- MARTIN. LISTER, historiae siue synopsis methodicae conchyliorum et tabularum anatomicarum Edit. altera. Recensuit et indicibus auxit GUILLIELM. HVDDERSFORT. Oxon. fol. c. f.
- CHRIST. LÖBERS *Anfangsgründe der Wundarzneykunst nebst einer Vorrede von den Vortheilen des Aderlassens bey Kindern.* Langensalz. 8.
- ADAMI LONICERI *vollständiges Kräuterbuch und künstliche Contrefeyungen der Bäume, Stauden, Heckenkräuter, Getreyde, Gewürze etc. mit eigentlicher* Vol. XVIII. P. III. Nn

licher Beschreibung derselben Namen in deutsch, griechisch, lateinisch, französich, italiänisch und hispanischer Sprache, wie auch deren Gestalt, natürlicher Kraft und Würckung; samt ausführlichen Bericht von der Kunst zu destilliren, wie auch Bauung der Gärten und Pflanzung der Bäume. Ingleichen von den fürnehmsten Thieren der Erde, Vögeln, Fischen und Gewürmen. Und denn auch von Metallen, Erz, Edelgesteinen, Gummi und gestandenen Säften; allen Aerzten, Wundärzten, Apothekern, Gärtnern, Hausvätern, Kranken und preßhaften Personen in Stadt und Land höchst nützlich und dienlich. Ehedem von Herrn PETRO VFFENBACHIO Med. Doct. und Physico ord. zu Frankf. am Mayn auf das fleißigste übersehen, an vielen Orten vermehrt, in acht sonderbare Theile unterschieden und mit drey vollkommenen Registern versehen. Anjetzo aber mit einer Zugabe begleitet, darinnen die allerneuesten und nützlichsten obseruationen von Kräuter- und Gewächs- Wirkungen und Gebrauch sowohl aus eigener Erfahrung und geschriebenen Urkunden, als auch aus denen heutiges Tages berühmten scriptoribus, sonderlich aus den iournalen der miscellan. nat. curios. academ. Paris. Berlinischen Sammlungen, Berlinischen actis und Nürnbergischen commercio litterario mit besondern Fleiß gesammelt worden, von BALTHASAR ERHARDT. Ulm. fol. m. K.

ANNAEUS CARL LORRY von. der Melancholie und denen melancholischen Krankheiten. Aus dem lateinischen übersetzt von M. E. A. W. nebst Vorrede von D. CARL CHRIST. KRAUSE. Erster und zweyter Band. Franckf. und Leipzig. 8.

JOHANN ADAM IACOB LUDWIG Abhandlung von den Erdäpfeln. Bern. 8. mai.

L'art de se traiter soi même dans les maladies vénériennes, et de se guérir de leurs différens symptomes. Ouvrage fondé sur une nouvelle théorie de ces maladies, et dans lequel on explique d'une manière plus vraisemblable l'opération des remèdes employés a leur traitement. Par M * * à Paris. 12.

Abrégé de matière médicale. Ou l'on expose la nature, les vertus et les doses des drogues, tant simples que composées, qui entrent dans la confection des coffres des médicamens destinés au service des vaisseaux, frégates et autres bâtimens du Roi. A l'usage des chirurgiens de la marine. Par M. MAISTRAL, Médecin du Roi et de la Marine à Brest. Tom. I. II. à Brest. 12.

Essais sur neuf maladies également dangereuses, l'apoplexie, la paralysie, l'asthme, la pulmonie, le catharre, le rhumatisme, la verôle, la goutte et la pierre: avec un préservatif assuré des maladies vénériennes, par M. DE MALON. ib. 12.

Les présages de la santé, de maladies et du sort des malades, ou histoire universelle des signes prognostics, par M. MALRIEU. ib. 12.

HENR. MATTH. MARCARD Specimen inaug. examinis rigorosioris malignitatis febrilis. Gotting. 4.

GIOV. MARITI *Reisen nach Cypern, Syrien und Palästina, dritter Theil. Florenz. 8 mai.*

Traité pratique de l'hydropisie et de la jaunisse développé par l'expérience; auquel on a joint quelques observations anatomiques et pratiques, de quelques médecins sur d'autres maladies, par M. MARQUET, revu par M. BUCHOZ. ib. 8.

Traité de l'apoplexie, paralysie et autres affections soporeuses, développé par l'expérience. Auquel on a joint deux discours latins sur le premier aphorisme d'HIPPOCRATE et sur le vingt-troisième de la seconde section du même Auteur.

Par feu M. MARQUET, à Paris. 12.

Traité historique et pratique des bains d'eau simple, d'eau de mer; avec un mémoire sur la douche. Par M. PIERRE ANTOINE MARTEAU. D.M. Inspecteur des eaux minérales etc. à Amiens. 12.

Rémarques sur la critique d'un Anonyme contre le discours de M. RANNOU tenu à l'académie royale des sciences, faites par ordre du collège royal de médecine de Stockholm. Par ROLAND MARTIN. à Stockholm. 8.

FERDINAND MARTINI *Untersuchung der Frage, ob ausgetretenes Blut wieder aufgenommen, und den Trieben des Hertzens unterwürfig gemacht werden könne.* Copenhagen. 8.

Eiusd. Versuche und Erfahrungen über die Empfindlichkeit der Sehnen. ib. 8.

A short account of the waters of resource near Valdagna in the Venetian state. In a letter from ANTONIO MASSINI M. D. to Sir C. BUNBURG Baron. Translated from the Italian. London. 8.

Catechismus des Feldbaues, worinnen in Fragen und Antworten die Acker- und Wiesenbaukunst zum Besten des Landmannes faßlich und deutlich nach den Grundsätzen der Naturlehre und Erfahrung vorgetragen ist, von IOHANN FRIEDRICH MAYER. Franckf. am Mayn. 8.

Eiusd. Fortsetzung der Beytraege und Abhandlungen zur Aufnahme der Land- und Hauswirthschaft, nach

nach den Grundsätzen der Naturlehre und der Erfahrung entworfen. ib. 8.

IACOB DE MEILLEUR *diff. inaug. de scorbuto. Monspel. 4.*

CHPH. IACOB MELLIN *von den Keichhusten der Kinder, welcher in den Jahren 1768 und 1769 in Langensalza herrschte. Franckfurt und Leipz. 8.*

Dissertation latine et françoise sur la génération et transformation des insectes de Surinam, des Indes, de l'Amérique et de l'Europe, dans laquelle on traite des vers, des chenilles de ce pays, des plantes, fleurs et fruits dont ils vivent etc. par M. MARIE SIBILLE MERIAN. Nouvelle édition beaucoup plus complète que la précédente. Ouvrage qui peut faire suite à tout ce qui a paru sur l'histoire naturelle, en 4 grands volumes. à Paris. fol. c. f.

*Avis aux meres sur la petite vérole et la rougeole, ou lettres a Madame de * * * sur la manière de traiter et de gouverner ses enfants dans ces maladies : suivies d'une question proposée à M. M. de la société royale des sciences de Montpellier, relativement à l'inoculation, par M. I. I. MENURET. à Lyon. 8.*

IO. IACOB MEYER *Pfarrers in Vorpommern. Auflösung der Preißfrage: Wie kömmt es, daß die Oeconomie bisher so wenig Vorthelle von der Physic und Mathematic gewonnen hat? Berlin. 4.*

IO. FRIEDR. MEYERS *chymische Versuche zur nähern Erkenntniß des ungelöschten Kalchs, der elastischen und electrischen Materie des allerreinsten Feuerwesens, und der ursprünglich allgemeinen Saeure. Nebst einem Anhang von den Elementen. Neue verbesserte Auflage. Hannover. 8.*

Mémoire sur l' épidémie, qui a regné aux environs de saint Quentin. Par M. VON MITTAYMIDI Doct. en médecine. à Paris. 8.

Observations on the prevailing diseases of great Britain, together with a review of those of former periods and in other countries. By JOHN MILLAR. M. D. Lond. 4. mai.

An essay on the weather, with remarks on the shepherds of Banburg rules for iudging of its changes ; and directions for preserving lives and buildings from the fatal effects of lightening. Intended chiefly for the use of husbandmen. By JOHN MILL. ib. 8.

A botanical dictionary ; or elements of systematic and philosophical botany containing descriptions of the parts of plants, and explanation of the scientific terms used by MORISON, RAI, TOURNEFORT, LINNAEUS, and other eminent Botanists ; a Brief analysis of the principal systems in botany, a critical enquiry into the merits and defects of the Linnaean method of arrangement and distribution of the Genera, descriptions of the various tribes, or natural families, of plants, their habit and structure, virtues, sensible qualities and oeconomical uses. An impartial examination of the doctrine of the sex of plants, with a discussion of several curious questions in the vegetable oeconomy connected with Gardening. The whole forming a complete system of botanical knowledge, calculated for the use of students in that science. By COLIN MILNE Reader on botany and natural history in London. Lond. 12.

Remarks

Remarks upon the mortality of the horned cattle,
translated from the Low - Dutch, of SAL. DE
MONCHY. M. D. ib. 8.

A treatise on mineral waters By DONALD MON-
RO M. D. ib. 8. Vol. I. II.

Mémoires sur la nature, les effets, propriétés et
avantages du feu de charbon de terres, apprêté
pour être employé commodément, économique-
ment et sans inconvénient, au chauffage et à
tous les usages domestiques; avec figures en taille
douce, par M. MORAND. à Paris. 12.

10. GOTTF. MORGENBESSERS *zweytes Schrei-
ben an seine Zuhörer, nebst einer Anzeige seiner
Vorlesungen.* Breslau. 4.

PETR. MOSCATI delle corporée differenze essen-
tiali che passano fra la struttura de bruti e la
umana. In Milano. 8. mai.

10. ANDR. MURRAY prodromus designationis
stirpium Gottingensium, cum figuris aeneis.
Gotting. 8.

LEONARD. MUS diff. inaug. sistens rationalem
methodum curandi et praecauendi quosdam
mammarum muliebrium laesam lactationem con-
cernentes morbos. Duisburg. ad Rhen. 4.

Mémoire sur la culture des pommes de terre par
M. le Chevalier M U S T E L ; faisant suite au
mémoire sur les pommes de terre. à Paris et à
Rouen. 8.

Dissertatio de qualitate noxia aeris in nosocomiis et
carceribus eiusque remediis, quae duplum prae-
mium academiae regiae scientiarum et artium
Lugdunensis reportauit. Auctore ALEXANDRO
PETRO NAHUY, Harlem. 8. mai.

Verhandeling over de schaadelyke hoedanigheid
der lugt in de Gasthuizen en gevangenissen, be-
nevens derzelvs hulpmiddelen, welke de dub-

belde prys van de koniglyke academie der weetenſchappen te Lyons behaald heeft, door
ALEXANDER PETR. NAHUYſ. te Haarlem.
8. mai.

FRANC. XAVIER NATTERER *Befchreibung des Heilbrunnens über Leuck, durch D. FRIEDRICH SALOMO SCHOLL. Aus dem frantzöfiſchen überſetzt.*
Sit. 12.

IO. ERN. NEUBAUER diff. de epiploooſcheocele, cuius receptaculum peritonaei mentiebatur proceſſum, teſtem et epididymidem ſimul continen-
tem. c. fig. aeneis. Ien. 4.

ANT. NICOLAI *Pathologie oder Wiſſenſchaft von Krankheiten. Zweyter Band. Halle. 8.*

ADAM. NIETZKI diff. inaug. de vomitu periodo a cephalaea periodica orto, caſu quodam illuſtrato. Reſp. J. J. Warburg. ib. 4.

L'art des expériences, ou avis aux amateurs de la phyſique ſur le choix, la conſtruction et l'ufages des inſtruments; ſur la préparation et l'emploi des drogues, qui ſervent aux experiences, par M. l'Abbé NOLLET. à Paris. 8. Vol. I. II. III.

The marine practice of phyſic and ſurgery particularly uſefull to all who viſit the Eaſt and Weſtindies and the coaſt of Africa. Vol. I et II. By WILLIAM NORTHCOTE. Lond. 8. mai.

Icones plantarum ſponte naſcentium in regnis Daniae et Noruegiae, in ducatibus Sleſuici et Holſtiae et in comitatibus Oldenburgi et Delmenhorſtiae: ad illuſtrandum opus de iisdem plantis, regio iuſſu exarandum, floriae Danicae nomine inſcriptum. Editae ab eius operis auctore GEORGIO CHRIST. OEDER, Volumen tertium continens fasciculos VII. VIII et IX. ſeu tabulas CCCLXI. - DXL. Hafn. fol. c. f.

G. C. OEDER

G. C. OEDER enumeratio plantarum florae Danicae,
i. e. sponte nascentium in regnis Daniae et Norue-
giae, ducatibus Slesuici et Holfatiae, comitati-
bus Oldenburgi et Delmenhorstiae. ib. 8.

Two dissertations defended in the public schools
at Cambridge. I) The knowledge of anatomy is
not principally necessary to the practice of me-
dicine. II) The deformities of the fetus do not
arise from the imagination of the mother. To
which is added a Florilegium medicum: or ex-
tracts from the greek of HIPPOCRATES with
a new latin translation, notes, and emendations.
By THOMAS OKES, M. D. Cambridge, 8.

Eiusd. duae dissertationes in publicis scholis Can-
tabrigiae habitae 1) praxi medicinae non est ap-
prime necessaria scientia anatomica. 2) fetuum
deformitates non oriuntur ab imaginatione prae-
gnantis. ib. 8. mai.

Mélanges historiques et critiques de physique de lit-
térature et de poésie. Par M. le Marquis d'OR-
BESAN. à Paris. 4. Vol. I-IV.

SAAC OTMANN, diss. inaug. de morbis virgi-
num. Argentorat. 4.

Recréations mathématiques et physiques, par M.
OZANAM. Nouvelle édition. à Paris. 8. Vol.
I-IV.

P. S. PALLAS *Naturgeschichte merkwürdiger
Thiere, in welcher vornehmlich neue und unbekannte
Thierarten, durch Kupferstiche, Beschreibungen und
Erklaerungen erlaeutert werden. Aus dem lateini-
schen übersetzt von D. ERNST GOTTFRIED
BALDINGER. Zwote Sammlung. Berlin und
Stralsund. 4. mai.*

Nn 5

P. S. PALLAS

P. S. PALLAS dierkundig mengelwerk, in het welke de nieuwe of nog duistere zoorten van dieren door naauwkeurige afbeeldingen, beschryvingen en verhandelingen opgehelderd worden. In het Latyn beschreven. Vertaald en met aanmerkingen voorzien door P. BODDAERT. Medic. Doct. Oudraad der Stad Vlissingen. VI. Stukken. Te Vterecht. 4.

Eiusd. spicilegia zoologica, quibus nouae imprimis et obscurae animalium species iconibus, descriptionibus atque commentariis illustrantur. Fasciculus VIIIus. Berolin. 4. c. fig. aen.

SIM. PALLAS *practische Anleitung die Knochenkrankheiten zu heilen zum Gebrauch seiner Zuhörer.* Berlin und Stralsund. 8.

Continuazione del saggio di nuoue osservazioni e scoperte di NATALE GUIS. PALLUCCI. In Fiorenze. 8. i. v.

Traité méthodique et dogmatique de la goutte. Par M. PAULMIER, à Paris. 12.

Idea natri Hungariae veterum nitro analogi. Aureore GABRIEL. PAZMANDI. Vindobon. 8.

DAV. PERELLET, diss. sistens casum de carie ossium cum epierisi subiuncta. Argentorat. 4.

The rational farmer or a treatise on agriculture and tillage. By MATTH. PET. NEWPORT. Lond. 8.

Briefe über verschiedene Gegenstände der Staatswirthschafts-Polizey und Moral von IOHANN ALBRECHT PHILIPPI. Berlin. 8.

* * PICARDS *Abhandlung vom Wasserwägen mit neuen Beyträgen*, von I. H. LAMBERT. ib. 8. m. K.

Briefe eines Arztes an seinen Freund, über den menschlichen Körper, von D. ERNST PLATNERN. Erster Band. Leipzig. 8.

ERNEST. PLATNER progr. invit. historia literario
chirurgica lithotomiae mulierum. ib. 4.

JOSEPH. IACOB. FLENCK, *Sammlung von Beobachtungen über einige Gegenstände der Wundarztneykunst. Zweyter Theil. Wien. 8.*

CHRISTOPH POLHEMS, *Commerciénraths, Ritters und Commandeurs des Nordsternordens patriotisches Testament; oder Unterricht von Eisen, Stahl, Kupfer, Messing, Zinn und Bley für diejenigen, welche von diesen Materien Manufacturen anlegen wollen. Nebst einem Verzeichnisse aller seiner mechanischen Erfindungen. Aus dem Schwedischen übersetzt. Grätz. 4. mai. (s. a.) (Haec versio facta est a DAN. GOTT. SCHREBER.)*

Traité méthodique de la goutte et du rhumatisme, ou l' on enseigne d' après l' expérience, les vrais moyens de se délivrer et de se préserver de ces maladies; Par M. PONSART, Docteur en médecine, à Paris. 12.

Histoire de l' anatomie et de la chirurgie, contenant l' origine et les progrès des ces sciences; avec un tableau chronologique des principales découvertes, et un catalogue des ouvrages, d' anatomie et de chirurgie, des mémoires académiques, des dissertations insérées dans les journaux et de la pluspart des theses, qui on été soutenues dans les Facultés de médecine de l' Europe. Par M. PORTAL, Lecteur du Roi et Professeur de médecine au collège Royal de France. Tom. I. II. III. IV. V. à Paris. 12. mai.

PERCIVALL POTT, *Abhandlungen von dem Wasserbruche und andern Kranckheiten der Hoden, seiner Häute und seiner Gefäße. Mit vielen Fällen erläutert. Nach der zwoten verbesserten und viel vermehrten Ausgabe übersetzt, von IOHANN CLEMENS TODE. Copenhagen. 8.*

Histoi-

Histoire des maladies de S. Domingue par M.
POUPPE DESPORTES, Médecin du Roi.
Tom. I et II. a Paris. 12.

Eiusd. traité ou abrégé de plantes usuelles de St.
Domingue. Tom. III. ib. 12. (*Est continuatio
praecedentis libri.*)

Nouveau traité des vapeurs, ou traité des maladies
des nerfs, dans lequel on développe les vrais
principes des vapeurs. Par M. PRESSAVIN,
à Lyon. 12.

A familiar introduction to the theory and practice
of perspective. By JOSEPH PRIESTLEY.
L. L. D. F. R. S. Lond. 4. c. f.

An account and method of the cure of the bron-
chocele or Derby-neck; to which are subjoined
Remarks on some parts of Mr. ALEXANDER'S
experimental essays. By THOMAS PROSSER.
ib. 8.

*Frrthümer, Warnungen, und Lehren, welche das Pu-
blicum in Ansehung der practischen Arztneykunst be-
treffen. Zweytes Buch. Entworfen von F. R.
R * * Dessau. 8.*

Avis aux meres, qui veulent nourrir leurs enfans.
Par Mme LE R * * Seconde édition augmen-
tée. à Paris. 12.

*Meteorologische Beobachtungen vor das Jahr 1770.
worinnen so wohl die Barometer als Thermometer-
höhen, ingleichen die Wind-und Wetterveränderun-
gen, nebst der Höhe des gefallenen Regenwassers
täglich zu drey verschiedenen malen aufgezeichnet
worden, durch IOH. GEORGE RABE, Rath und
Professor der Mathematik und Naturlehre bey dem
Gymnasio Carolino zu Anspach. Anspach. 4.*

*Von Erhaltung der Kinder von dem ersten Augenblick
ihres Entstehens an, bis zu ihrer Mannbarkeit.
Aus*

*Aus dem Französischen des Herrn D. RAULIN.
Zweyter Band. Leipzig. 8. mai.*

L'art de convertir le fer forgé en acier. Par M. de
REAUMUR. à Paris. 4.

CAROL. FRIDERIC. REHFELD diff. inaug. de
lentarum pulmonum obstructionum genesi ac dia-
gnosi, Rsp. Chr. Stanislaw. Grömbke. Gryphiswald. 4.

Avis important au sexe, ou essai sur le corps balei-
nes. Par M. REISSER. à Paris. 12.

Istruzione sulla cultura e preparazione della garanzia
dal Sign. IOS. MARIA PIO REVELLI.
Turin. 8.

Histoire naturelle de l'air et des météores. Par M.
l'Abbé RICHARD. Tom. VI. à Paris. 12. mai.

CHRIST. RICKMANN von der Unwahrheit des
Versehens und der Hervorbringung der Muttermah-
le durch die Einbildungskraft. Jena. 8.

CHRIST. FRIEDR. RICHTER, Beantwortung der
in Wittenberger Intelligenzbogen eingerückten
wahren Prüfung und Beschreibung der Richterischen
Arztneymittel. Halle. 8.

AUGUST. GOTTL. RICHTER observationum
chirurgicarum fasciculus primus, continens de
cataractae extractione observationes, Regiae scien-
tiarum societati Gottingensi exhibitae. Gotting.
8. c. f.

IO. BAPTIST. ROBERT. diff. inaug. de ventricul
vulneribus. L. B. 4.

ISAAC ROCH, diff. inaug. de convulsionibus iuue-
nem decussatim distorquentibus. Argent. 4.

FRANC. IGNAT. ROETTEL diff. inaug. de vitis
cultura Molsaemensi et Mutzigensi. ib. 4.

A philosophical inquiry into the nature and pro-
perties of water, with elegans copper - plates
figures of the several salts. By JOHN ROH-
TERAM. Newcastle. 8. mai. c. f.

four.

Journal de médecine, chirurgie, pharmacie. Par
M. A. ROUX. Tom. XXXII-XXXIV. à Paris. 8.

An essay on the cure of ulcerated legs without rest
By WILLIAM ROWLEY. Lond. 8.

Manuel de pulmoniques, ou traité complet des ma-
ladies de la poitrine, ou l'on trouve la théorie
la plus naturelle, les regles de pratique le plus
simples et le plus sûres pour combattre les ma-
ladies de cette cavité. On y a joint une nouvelle
méthode de reconnoître ces mêmes maladies par
la percussion du thorax. Traduit du latin de M.
LEOPOLD AVENBRUGGER. Par M. de RO-
ZIERE DE LA CHASSAGNE. Doct. en mé-
decine. à Paris. 12.

Les abeilles, traité de JEAN RUCCELLAI avec
des notes et suivi d'un traité de l'éducation de
ces insectes. Par M. PINGERON. ib. 12.

10. PHILIPP. IULIUS RUDOLPH, progr. de
tumore cancroso singulari amputatione feliciter
sanato. Erlang. 4.

A dissertation on the spasmodic asthma of Children
in a letter to Dr. MILLAR. By BENJAMIN
RUSH Med. Doct. and Professor of Chemistry in
the college of Philadelphia. Lond. 8.

A chronogical history of the weather and seasons
and of the prevailing diseases in Dublin. By
JOHN RUTTY. M. D. ib. 8. mai.

Reliqua proxime.

Con-

Contenta in hac parte.

	Pag.
I Medical obseruations and inquiries by a society of physicians in London. Vol. IV.	387
II COTTUNNIUS de sedibus variolarum	411
III Traité des accouchemens par M. DE- LEURYE	420
IV An enquiry into the nature, rise and progress. of the fevers most common in London. By GRANT.	424
V SCHREBERI de phasco obseruationes	440
VI EIUDEM spicilegium florae Lipsicae	444
VII SAGAR systema morborum systemati- cum etc.	448
VIII RAHN diss. inaug. de miro inter caput et viscera abdominis commercio	451
IX Mémoires de l'academie de Dijon. Tom. I.	457
X BOLTEN epist. de nouo quodam zoophy- torum genere	466
XI GAUBII aduersariorum varii argumenti liber vnus	468
XII MÜLLNERS <i>seltne und höchstmerckwürdige Wahrnehmung von einer samt dem Kinde ausgefallenen Gebärmutter etc.</i>	480
XIII IACQUIN examen chemicum de acido pingui et de aere fixo respectu calcis.	481
XIV CRANZ de acido pingui et de aere fixo	484
XV WIEGLEBS <i>Vertheidigung der Meyerischen Lehre vom acido pingui etc.</i>	489

XVI WELLS

	Pag.
XVI WELLS <i>Rechtfertigung der Blackischen Lehre von der figirten Luft etc.</i>	492
XVII BUCHOLZ <i>chymische Versuche über das Meyerische acidum pingue</i>	494
XVIII THOUVENEL <i>de corpore nutritiuo et de nutritione</i>	496
XIX <i>Histoire naturelle générale et particulière Tom. XVI et XVII. ou histoire naturelle des oiseaux. Tom. I et II.</i>	503
XX <i>Directions for bringing over seeds and plants etc. it de Dionaea muscipula. By ELLIS</i>	526
XXI STOERK <i>de pulsatilla nigricante</i>	530
XXII DRUMMONDI <i>de febribus arcendis discutiendisque commentarius</i>	535
XXIII <i>Noua physico medica</i>	537
XXIV <i>Continuatio indicis scriptorum physico medicorum, quae anno 1770 prodierunt.</i>	547

